

Mô Hình Hóa Thống Kê

Chủ đề 3: Các Giả Định Quan Trọng Của Mô Hình Hồi Quy Bội

Môn học: Mô hình hóa thống kê

Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc

Nhóm thực hiện: NHÓM 1

Thành viên thực hiện:

Họ và tên	Mã học viên
NGUYỄN NHẬT QUANG	25C23002
PHẠM ĐOÀN VỊNH NGHI	25C23012
LÊ HOÀNG NHƯ	25C23014

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ ĐÁNH GIÁ

Họ và tên	Mã học viên	Nhiệm vụ thực hiện	Đánh giá
NGUYỄN NHẬT QUANG	25C23002	Tính tuyến tính; Tính chuẩn & Tổng hợp file báo cáo; Thuyết trình	100%
PHẠM ĐOÀN VỊNH NGHI	25C23012	Tính độc lập & Phân công nhiệm vụ; Soạn câu hỏi thảo luận; Thuyết trình	100%
LÊ HOÀNG NHƯ	25C23014	Tính đồng nhất phương sai & Lập dàn ý công việc; Tổng hợp, kết luận; Thuyết trình	100%

Mục lục

1	Tổng Quan	6
1.1	Hồi quy	6
1.2	Mô hình hồi quy và Tính chất cốt lõi	6
1.3	Hồi quy bội	6
1.4	Mô hình hồi quy bội dạng ma trận	7
1.5	Ước lượng OLS và Định lý Gauss - Markov	7
1.5.1	Mục đích và sự cần thiết của Ước lượng OLS	7
1.5.2	Chứng minh toán học nghiệm OLS dạng đóng	7
1.5.3	Định lý Gauss - Markov và Mối quan hệ với OLS	8
1.5.4	Chứng minh Định lý Gauss - Markov (Tính BLUE của OLS)	8
1.6	Các giả định cốt lõi và Đánh giá mức độ quan trọng	8
2	Giả Định Tính Tuyến Tính	9
2.1	Nguồn Gốc Lịch Sử	9
2.2	Cơ Sở Lý Thuyết	10
2.2.1	Ý nghĩa cốt lõi 1: Cấu trúc đại số của các tham số β	10
2.2.2	Ba nghĩa khác nhau của tuyến tính	11
2.2.3	Ý nghĩa cốt lõi 2: Sự tự do của các biến x	11
2.2.4	Vì sao phi tuyến theo X được phép, nhưng phi tuyến theo β thì không?	11
2.2.5	Dạng Ma Trận: Biểu Diễn Gọn Cho n Quan Sát	13
2.2.6	Liên hệ với giả định $E(\varepsilon X) = 0$	13
2.3	Tại Sao Tuyến Tính Mang Lại Lợi Thế	14
2.4	Hậu Quả Khi Vi Phạm Tuyến Tính	16
2.4.1	Tứ Giác Anscombe	16
2.4.2	Ví Dụ Thực Tế	18
2.5	Phát Hiện Vi Phạm	23
2.5.1	Ma Trận Đồ Thị Phân Tán	24
2.5.2	Phần Dư Theo Giá Trị Khớp (Công Cụ Chính)	26
2.5.3	Phần Dư Theo Từng Biến Dự Báo	27
2.5.4	Đồ Thị Hồi Quy Riêng Phần	28
2.5.5	Kiểm Định Tukey Cho Tính Không Cộng Tính	29
2.5.6	Đồ Thị Nền và Giao Thúc Xếp Hàng	30
2.5.7	Phần Dư Chuẩn Hóa	31
2.6	Khắc Phục Vi Phạm	32

2.6.1	Biến Đổi Biến Số	32
2.6.2	Hồi Quy Đa Thức	33
2.6.3	Splines	34
2.6.4	Hồi Quy Phi Tuyến	35
2.6.5	Mô Hình Tuyến Tính Tổng Quát (GLMs)	35
2.6.6	So Sánh Mô Hình	36
2.6.7	Đánh Giá Mô Hình Sau Khi Khắc Phục	36
2.7	Ví Dụ R: Dataset <code>mtcars</code>	39
2.8	Tính Chất Nâng Cao	41
2.8.1	Chiều Trục Giao Lên Không Gian Dự Báo	41
2.8.2	Tuyến Tính Không Luôn Được Bảo Toàn Khi Bỏ Biến	42
2.8.3	Phân Phối Chuẩn Đa Biến Đảm Bảo Tuyến Tính	43
2.8.4	Định Lý Li-Duan: Bền Vững Trước Phi Tuyến Ẩn	43
2.8.5	Bất Biến Trước Biến Đổi Tuyến Tính Toàn Hạng	45
3	Giả Định Tính Chuẩn Của Phần Dư	46
3.1	Cơ Sở Lý Thuyết	46
3.1.1	Sai Số Thật và Phần Dư Không Phải Là Một	46
3.1.2	Không Bắt Buộc Đối Với Phương Pháp Bình Phương Tối Thiểu	47
3.1.3	Khi Thêm Giả Định Chuẩn: OLS Tương Đương MLE và Suy Diễn Chính Xác Hơn	47
3.1.4	Cơ Sở Bắt Buộc Cho Suy Diễn Mẫu Nhỏ	47
3.1.5	Ma Trận Mũ: Vì Sao Phần Dư Bị Biến Dạng	48
3.1.6	Sự Siêu Chuẩn Của Phần Dư	49
3.1.7	Điểm Dễ Nhầm: Tính Chuẩn Của Y Không Phải Tính Chuẩn Của Sai Số	49
3.2	Công Cụ Trực Quan	50
3.2.1	Biểu Đồ Tần Suất Của Phần Dư	50
3.2.2	Q-Q Plot: Công Cụ Chính Để Đọc Tính Chuẩn	50
3.2.3	Đọc Đồ Thị Cùng Leverage và Ngoại Lai	52
3.2.4	Kết Luận Thực Hành	53
3.3	Kiểm Định Hình Thức	53
3.3.1	Shapiro-Wilk Test	53
3.3.2	Jarque-Bera Test	54
3.3.3	Sự Khác Biệt Bản Chất Giữa Hai Kiểm Định	55
3.3.4	Đọc p-value Theo Cỡ Mẫu và Mục Tiêu Suy Diễn	55
3.4	Hậu Quả Khi Vi Phạm	56
3.4.1	Suy Diễn Mẫu Nhỏ Mất Phân Phối Chính Xác	56

3.4.2	Đuôi Nặng và Ngoại Lai Làm Suy Diễn Kém Ổn Định	57
3.4.3	Không Chuẩn Có Thể Là Triệu Chứng Của Sai Mô Hình	57
3.4.4	Mẫu Lớn Giảm Rủi Ro Nhưng Không Xóa Mọi Vấn Đề	58
3.4.5	Bảng Tổng Hợp Cách Phản Ứng	59
3.5	Giải Pháp Thay Thế	59
3.5.1	Bản Đồ Chọn Phương Pháp	60
3.5.2	Sai Số Chuẩn Vững HC3 / Sandwich	60
3.5.3	Bootstrap	61
3.5.4	Biến Đổi Biến Phản Hồi	61
3.5.5	Mô Hình Tuyến Tính Tổng Quát (GLM)	62
3.5.6	Robust Regression	63
3.5.7	Quantile Regression	63
3.6	Ví Dụ R: Dataset Boston	64
4	Giả Định Đồng Nhất Phương Sai	67
4.1	Khái niệm và Hệ quả	67
4.2	Kiểm định Breusch–Pagan (1979)	68
4.3	Kiểm định White (1980)	68
4.4	Cơ sở toán học của Sai số chuẩn vững (Robust Standard Errors)	69
4.5	So sánh, Đánh giá và Thực hành R	70
4.5.1	Kết quả ước lượng OLS mẫu (Chưa hiệu chỉnh)	71
4.5.2	Kết quả thực nghiệm các kiểm định phương sai thay đổi	74
4.5.3	Hiệu chỉnh bằng Sai số chuẩn vững HC3	75
4.5.4	Trực quan hóa kết quả	78
5	Giả Định Tính Độc Lập Của Sai Số	82
5.1	1. Khái niệm và cơ sở lý thuyết của tự tương quan	82
5.1.1	1.1. Mô hình hồi quy tuyến tính bội và sai số ngẫu nhiên	82
5.1.2	1.2. Giả định không tự tương quan	83
5.1.3	1.3. Khái niệm tự tương quan	83
5.1.4	1.4. Sai số và thặng dư sau ước lượng	85
5.2	2. Nguyên nhân dẫn đến tự tương quan	86
5.2.1	2.1. Nguyên nhân do cấu trúc phụ thuộc của dữ liệu	86
5.2.2	2.2. Nguyên nhân do mô hình chưa được đặc tả phù hợp	87
5.3	3. Hậu quả thống kê của tự tương quan	87
5.3.1	3.1. Tự tương quan làm sai cấu trúc phương sai của vector sai số	87
5.3.2	3.2. Sai số chuẩn sai làm kiểm định t và p-value không đáng tin cậy	91

5.3.3	3.3. Ước lượng phương sai sai số và hệ số R^2 cần được diễn giải thận trọng	91
5.3.4	3.4. Kiểm định F, khoảng tin cậy và khoảng dự báo bị ảnh hưởng	92
5.4	4. Phát hiện tự tương quan	94
5.4.1	4.1. Phương pháp đồ thị	94
5.4.2	4.2. Kiểm định Durbin-Watson	96
5.4.3	Cách đọc kết quả bằng bảng Durbin-Watson	97
5.4.4	Hạn chế của kiểm định Durbin-Watson	98
5.4.5	4.3. Kiểm định Breusch-Godfrey	98
5.4.6	4.4. Kiểm định tự tương quan trên R	99
5.5	Tài liệu tham khảo	103
Tổng Kết		103

1 Tổng Quan

1.1 Hồi quy

Dựa vào nghiên cứu của Weisberg trong tài liệu *Applied Linear Regression* [12], hồi quy là một phương pháp thống kê nền tảng được dùng để mô hình hóa và định lượng mối quan hệ giữa biến phản ứng (Y) và một hoặc nhiều biến tiên đoán ($\mathbf{X}$). Nền tảng toán học của hồi quy dựa trên Hàm kỳ vọng có điều kiện (Conditional Expectation Function - CEF), ký hiệu là $E(Y|\mathbf{X})$, biểu thị giá trị trung bình của Y tại các mức giá trị cố định của $\mathbf{X}$. Khái niệm hồi quy bắt nguồn từ công trình của Sir Francis Galton vào cuối thế kỷ 19, khi ông quan sát hiện tượng chiều cao của các thế hệ "hồi quy về mức trung bình" [4]. Ngày nay, mục đích chính của hồi quy bao gồm:

- Mô tả và định lượng mối quan hệ thống kê giữa các biến số.
- Dự báo giá trị của biến phản ứng dựa trên tập hợp biến giải thích.
- Kiểm soát các biến gây nhiễu theo nguyên lý *ceteris paribus* (giữ các yếu tố khác không đổi).

1.2 Mô hình hồi quy và Tính chất cốt lõi

Dựa vào nghiên cứu của James và cộng sự [6], mô hình hồi quy là biểu diễn toán học chính thức cho hàm $f(X)$. Dạng cơ bản nhất là Hồi quy tuyến tính đơn (SLR):

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i \quad (1)$$

Trong đó: β_0 và β_1 là các tham số dân số cần ước lượng, và ε_i là sai số ngẫu nhiên biểu diễn những biến thiên không giải thích được. Các tính chất cốt lõi bao gồm:

- **Phần dư ($\hat{\varepsilon}_i$):** Sự chênh lệch giữa giá trị quan sát thực tế và giá trị dự báo mẫu ($\hat{\varepsilon}_i = y_i - \hat{y}_i$).
- **Hệ số xác định (R^2):** Đo lường tỷ lệ phương sai của biến phản ứng Y được giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình.

1.3 Hồi quy bội

Dựa vào tài liệu *Linear Models with R* [3], hồi quy bội mở rộng cấu trúc tuyến tính đơn cho trường hợp có nhiều hơn hai biến tiên đoán ($p \geq 2$) nhằm kiểm soát tác động đồng thời của nhiều yếu tố và hạn chế thiên lệch do bỏ sót biến. Khi làm việc với mô

hình hồi quy bội, cần đặc biệt lưu ý:

- **Kiểm định F toàn cục:** Dùng để đánh giá xem có ít nhất một biến giải thích tác động có ý nghĩa lên Y hay không.
- **Kiểm định t từng phần:** Đánh giá đóng góp biên của từng hệ số.
- **Đa cộng tuyến (Multicollinearity):** Hiện tượng các biến độc lập có tương quan mạnh với nhau, làm hệ số ước lượng kém ổn định.

1.4 Mô hình hồi quy bội dạng ma trận

Dựa vào nghiên cứu của Rencher và Schaafje [10], mô hình hồi quy tuyến tính đa biến được biểu diễn thành lịch dưới dạng đại số tuyến tính:

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{e}, \quad E(\mathbf{e}) = \mathbf{0}, \quad \text{Cov}(\mathbf{e}) = \sigma^2 \mathbf{I}_n \quad (2)$$

Trong đó: $\mathbf{X}$ là ma trận thiết kế có kích thước $n \times (k + 1)$ với cột đầu tiên là vectơ cột 1, $\mathbf{y}$ là vectơ cột của biến phản ứng, và $\boldsymbol{\beta}$ là vectơ các tham số hệ số. Để hệ phương trình chuẩn có nghiệm duy nhất, ma trận $\mathbf{X}$ phải có hạng cột đầy đủ.

1.5 Ước lượng OLS và Định lý Gauss - Markov

1.5.1 Mục đích và sự cần thiết của Ước lượng OLS

Mục đích chính của phương pháp Bình phương Tối thiểu Thông thường (OLS) là tìm ra đường thẳng (hoặc siêu phẳng) phù hợp nhất với tập dữ liệu mẫu. Việc ước lượng OLS là vô cùng cần thiết vì trong thực tế, chúng ta không thể thu thập dữ liệu của toàn bộ tổng thể để tính toán các tham số thực $\boldsymbol{\beta}$. OLS cung cấp một cơ chế toán học tối ưu để xấp xỉ các tham số này bằng cách cực tiểu hóa tổng bình phương các sai số dự báo (Residual Sum of Squares - RSS).

1.5.2 Chứng minh toán học nghiệm OLS dạng đóng

Phương pháp OLS tìm nghiệm $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ nhằm tối thiểu hóa hàm mục tiêu $S(\boldsymbol{\beta})$:

$$S(\boldsymbol{\beta}) = \mathbf{e}^\top \mathbf{e} = (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})^\top (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}) \quad (3)$$

Khai triển và lấy đạo hàm bậc nhất của $S(\boldsymbol{\beta})$ theo vectơ $\boldsymbol{\beta}$, sau đó cho bằng $\mathbf{0}$ để thiết lập hệ phương trình chuẩn:

$$\frac{\partial S}{\partial \boldsymbol{\beta}} = -2\mathbf{X}^\top \mathbf{y} + 2\mathbf{X}^\top \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} = \mathbf{0} \implies \mathbf{X}^\top \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} = \mathbf{X}^\top \mathbf{y} \quad (4)$$

Nhân hai vế với ma trận nghịch đảo $(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1}$, ta thu được nghiệm OLS dạng đóng duy nhất:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}^{OLS} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y} \quad (5)$$

1.5.3 Định lý Gauss - Markov và Mối quan hệ với OLS

Định lý Gauss-Markov [9] là nền tảng lý thuyết quan trọng nhất biện minh cho sự vĩ đại của phương pháp OLS. Định lý phát biểu rằng: *Dưới các giả định cốt lõi của mô hình tuyến tính cổ điển, ước lượng OLS là ước lượng Tuyến tính Không chệch Tốt nhất (Best Linear Unbiased Estimator - BLUE).* **Mối quan hệ:** OLS là "công cụ" tính toán, còn Định lý Gauss-Markov là "giấy chứng nhận" khẳng định rằng: Trong toàn bộ vũ trụ các phương pháp ước lượng tuyến tính và không chệch, không tồn tại phương pháp nào có phương sai nhỏ hơn OLS.

1.5.4 Chứng minh Định lý Gauss - Markov (Tính BLUE của OLS)

Giả sử có một ước lượng tuyến tính bất kỳ khác $\tilde{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{C}\mathbf{y}$, với $\mathbf{C} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top + \mathbf{D}$. Để $\tilde{\boldsymbol{\beta}}$ không chệch:

$$E(\tilde{\boldsymbol{\beta}}) = E(\mathbf{C}\mathbf{y}) = \mathbf{C}\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\beta} \implies \mathbf{C}\mathbf{X} = \mathbf{I} \implies \mathbf{D}\mathbf{X} = \mathbf{0} \quad (6)$$

Xét ma trận hiệp phương sai của $\tilde{\boldsymbol{\beta}}$:

$$\begin{aligned} \text{Var}(\tilde{\boldsymbol{\beta}}) &= \sigma^2 \mathbf{C}\mathbf{C}^\top = \sigma^2 [(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top + \mathbf{D}] [(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top + \mathbf{D}]^\top \\ &= \sigma^2 (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} + \sigma^2 \mathbf{D}\mathbf{D}^\top = \text{Var}(\hat{\boldsymbol{\beta}}^{OLS}) + \sigma^2 \mathbf{D}\mathbf{D}^\top \end{aligned} \quad (7)$$

Vì $\sigma^2 \mathbf{D}\mathbf{D}^\top$ là ma trận nửa xác định dương, nên $\text{Var}(\tilde{\boldsymbol{\beta}}) \geq \text{Var}(\hat{\boldsymbol{\beta}}^{OLS})$. Vậy OLS là "Tốt nhất" (Best).

1.6 Các giả định cốt lõi và Đánh giá mức độ quan trọng

Dựa vào nghiên cứu của Sheather [11]. Theo Định lý Giới hạn Trung tâm (CLT), giả định về tính chuẩn của sai số sẽ trở nên bất khả khi cỡ mẫu lớn [14].

Bảng 1: Bốn giả định của mô hình hồi quy bội và hệ quả

Giả định	Chi tiết	Phát biểu toán học	Hệ quả khi vi phạm
A1	Tính tuyến tính	$E[\varepsilon_i \mathbf{X}] = 0$	Ước lượng OLS bị chệch nghiêm trọng
A2	Tính chuẩn	$\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$	Kiểm định t, F sai ở mẫu nhỏ
A3	Đồng nhất phương sai	$\text{Var}(\varepsilon_i \mathbf{X}) = \sigma^2$	OLS mất hiệu quả (không còn BLUE)
A4	Tính độc lập	$\text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0, i \neq j$	SE ước lượng bị chệch, kiểm định sai

2 Giả Định Tính Tuyến Tính

2.1 Nguồn Gốc Lịch Sử

Giả định về tính tuyến tính gắn liền với sự ra đời của phân tích hồi quy, bắt nguồn từ ba dòng nghiên cứu độc lập ở nửa cuối thế kỷ 19.

Ứng dụng đầu tiên từ lý thuyết vật lý: James D. Forbes (1857). Nhà nghiên cứu Forbes có một lý thuyết cho rằng logarit của áp suất khí quyển $\log(\text{pres})$ có *mối quan hệ tuyến tính* với điểm sôi của nước; quan hệ này có nền tảng vật lý từ phương trình Clausius-Clapeyron. Tài liệu của Forbes được xem là một trong những ví dụ sớm nhất về việc dùng biểu đồ tóm tắt để minh họa hàm trung bình tuyến tính dựa trên mô hình vật lý.

Nguồn gốc thuật ngữ “Hồi quy”: Sir Francis Galton (1877–1886). Nhiều ý tưởng nền tảng của hồi quy xuất hiện lần đầu trong công trình của **Sir Francis Galton (1822–1911)** về sự di truyền đặc tính qua các thế hệ. Vào năm 1877, ông bắt đầu bằng thí nghiệm trên đậu hoa ngọt (sweet peas) để quan sát sự di truyền kích thước hạt. Đến năm 1886, khi biểu diễn hàm trung bình bằng đường thẳng cho dữ liệu chiều cao qua các thế hệ, Galton nhận ra các giá trị cực đoan ở thế hệ trước có xu hướng “hồi quy” (*regress*) về phía giá trị trung bình quần thể ở thế hệ sau. Đây là nguồn gốc lịch sử của thuật ngữ *regression*.

Sự tiếp nối: Karl Pearson (1893–1903). **Karl Pearson (1857–1936)** mở rộng

sang nghiên cứu di truyền học ở người. Trong giai đoạn 1893–1898, ông thu thập dữ liệu chiều cao của các bà mẹ và con gái trưởng thành; bộ dữ liệu này được Pearson và Lee công bố năm 1903 để kiểm tra liệu các bà mẹ cao có xu hướng sinh con gái cao hay không, thông qua phương trình hồi quy tuyến tính.

Lưu ý phạm vi lịch sử. Ba dòng nghiên cứu trên là lịch sử của việc *mô hình hóa quan hệ bằng đường thẳng*. Nền tảng tính toán, tức phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS), được phát triển độc lập bởi Gauss và Legendre (~1805–1809), và OLS chỉ đảm bảo ước lượng tối ưu (BLUE theo định lý Gauss-Markov) khi dạng hàm được chỉ định đúng.

Hệ quả thực tiễn. Nếu quan hệ thực sự là phi tuyến nhưng ta vẫn dùng mô hình tuyến tính, ước lượng OLS trở nên chệch và không nhất quán; mọi kiểm định và dự báo đều sai.

2.2 Cơ Sở Lý Thuyết

Mô hình hồi quy bội tổng quát:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_p X_p + \varepsilon$$

Giả định tuyến tính phát biểu rằng:

$$E[Y \mid X_1, X_2, \dots, X_p] = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \cdots + \beta_p X_p$$

Hay nói cách khác: **kỳ vọng có điều kiện của Y là một hàm tuyến tính trong các tham số β** [10, Sec. 7.3.1, p. 141].

2.2.1 Ý nghĩa cốt lõi 1: Cấu trúc đại số của các tham số β

“Tuyến tính” ở đây là thuộc tính về **cấu trúc đại số của β** , không phải hình dáng của dữ liệu. Cụ thể, các tham số $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k$ phải:

- Xuất hiện ở **bậc một** (không có $\beta^2, \beta^3, \dots$)
- Đứng **độc lập**, không lồng trong hàm phi tuyến
- Được **cộng lại** với nhau để tạo thành dự báo

Bạn sẽ không bao giờ thấy dạng β^2, e^β , hay $\sin(\beta)$ trong một *mô hình tuyến tính*.

2.2.2 Ba nghĩa khác nhau của tuyến tính

Trong hồi quy, cùng một từ tuyến tính có thể chỉ ba khái niệm khác nhau. Bảng sau tách riêng ba tầng này để tránh nhầm lẫn giữa định nghĩa mô hình, giả định về hàm trung bình, và hình dạng đồ thị quan sát được.

Khái niệm	Ý nghĩa	Vai trò trong hồi quy
Tuyến tính theo tham số	Các β xuất hiện bậc một và cộng tính	Điều kiện để thuộc lớp mô hình tuyến tính [10, Sec. 7.3.1, p. 141]
Tuyến tính của $E(Y X)$	Hàm trung bình có điều kiện được chỉ định đúng theo các biến đang xét	Giả định về dạng sinh dữ liệu và mean function [12, Sec. 1.2; Sec. 3.4.1]
Hình dạng đồ thị theo X	Đường dự báo có thể thẳng hoặc cong trên trục biến ban đầu	Đa thức và splines có thể tạo đường cong nhưng vẫn tuyến tính theo β [12, Ch. 5, pp. 109–115]

2.2.3 Ý nghĩa cốt lõi 2: Sự tự do của các biến x

Ngược lại, **mô hình không đặt bất kỳ ràng buộc nào lên các biến x** . Bạn hoàn toàn có thể biến đổi x thành bất kỳ dạng phi tuyến nào (bình phương, nghịch đảo, logarit, hàm lượng giác, ...) và mô hình vẫn là *mô hình tuyến tính*. Ví dụ, phương trình sau chứa đồng thời nghịch đảo (x_2^{-1}), bình phương (x_2^2) và hàm sin ($\sin x_2$):

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2^{-1} + \beta_3 x_2^2 + \beta_4 \sin(x_2) + \varepsilon$$

Mô hình này **vẫn là mô hình tuyến tính** vì $\beta_0, \dots, \beta_4$ đều xuất hiện ở bậc một và được cộng lại.

2.2.4 Vì sao phi tuyến theo X được phép, nhưng phi tuyến theo β thì không?

Điểm mấu chốt nằm ở vai trò khác nhau của hai đại lượng. Các biến X là dữ liệu đã quan sát được; sau khi thu thập dữ liệu, x , x^2 , $\log x$ hay $\sin x$ đều chỉ là những cột số liệu đã biết trong ma trận thiết kế. Ngược lại, β là tham số chưa biết cần ước lượng. Vì vậy, một mô hình được gọi là tuyến tính không phải vì đồ thị Y theo X nhất thiết là đường thẳng, mà vì kỳ vọng có điều kiện được viết dưới dạng **tổ hợp tuyến tính của các tham số chưa biết**.

Về mặt hình học, thêm x^2 không phá vỡ tính tuyến tính của mô hình. Nó chỉ mở rộng

không gian dự báo bằng một trục mới. Chẳng hạn, $Y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \varepsilon$ tạo ra một đường parabol nếu vẽ theo trục x ban đầu, nhưng trong không gian có các trục 1 , x và x^2 , phần dự báo vẫn nằm trên một siêu phẳng tuyến tính do các cột của ma trận thiết kế sinh ra.

Lý do quan trọng nhất là khả năng ước lượng. Khi mô hình tuyến tính trong β , bài toán OLS

$$\min_{\beta} \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\beta\|^2$$


dẫn đến hệ phương trình chuẩn tuyến tính và nghiệm dạng đóng. Nếu tham số xuất hiện phi tuyến, ví dụ $Y = \beta_0 + \beta_1 e^{\beta_2 x} + \varepsilon$ hoặc $Y = \theta_1 + \theta_2(1 - e^{-\theta_3 x}) + \varepsilon$, đạo hàm của tổng bình phương phần dư không còn tạo ra một hệ tuyến tính đơn giản. Khi đó ta phải dùng các thuật toán lặp như Gauss–Newton, cần giá trị khởi đầu và có rủi ro không hội tụ hoặc hội tụ về cực tiểu cục bộ.

Dạng mô hình	Tuyến tính trong β ?	Lý do
$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$	Có	β bậc một, cộng tính
$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + \varepsilon$	Có	X^2 là biến mới; β vẫn bậc một
$Y = \beta_0 + \beta_1 \log X + \beta_2 X^{-1} + \varepsilon$	Có	$\log X$, X^{-1} là biến mới
$Y = \beta_0 \cdot e^{\beta_1 X} + \varepsilon$	Không	β_1 nằm trong $\exp(\cdot)$
$Y = \beta_0 + X^{\beta_1} + \varepsilon$	Không	β_1 là số mũ của X

Hệ quả thực tiễn. Nhờ đặc tính này, khuôn khổ hồi quy tuyến tính có thể xấp xỉ vô số quan hệ cong trong thực tế, chỉ bằng cách biến đổi các biến x , trong khi vẫn giữ nguyên phương pháp tính toán OLS.

Minh họa hình học: ba trường hợp đặc trưng.

Hình 1 — 'Linear model' không nhất thiết là đường thẳng



Hình 1: Mô hình tuyến tính không nhất thiết tạo ra đường thẳng. (a) Bậc 1 $\rightarrow$ đường thẳng. (b) Bậc 2 $\rightarrow$ parabol, vẫn là mô hình tuyến tính vì $\beta_0, \beta_1, \beta_2$ bậc một. (c) $y = e^{\beta_0 + \beta_1 x}$: β_1 nằm trong $\exp(\cdot)$, không phải mô hình tuyến tính.

2.2.5 Dạng Ma Trận: Biểu Diễn Gọn Cho n Quan Sát

Với n quan sát, dạng đại số tổng quát được gom lại thành phép nhân ma trận:

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}, \quad E(\mathbf{Y} | \mathbf{X}) = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}$$

trong đó:

- $\mathbf{y}$: vector cột $n \times 1$ chứa các giá trị phản hồi.
- $\mathbf{X}$: **ma trận thiết kế** kích thước $n \times (k + 1)$, cột đầu là vector đơn vị $\mathbf{1}_n$ (cho β_0), các cột còn lại là giá trị của k biến dự báo.
- $\boldsymbol{\beta} = (\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k)^\top$: vector cột $(k + 1) \times 1$ chứa các tham số.
- $\boldsymbol{\varepsilon}$: vector cột $n \times 1$ chứa các sai số ngẫu nhiên.


Nhờ cấu trúc tổ hợp tuyến tính này, OLS tối thiểu hóa $\|\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}\|^2$ và dẫn đến **hệ phương trình chuẩn**:

$$\mathbf{X}^\top \mathbf{X} \hat{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{X}^\top \mathbf{y}$$

Khi $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ khả nghịch (các cột của $\mathbf{X}$ độc lập tuyến tính), nghiệm duy nhất là $\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y}$. Đây là lý do tính tuyến tính trong $\boldsymbol{\beta}$ mang lại phương pháp ước lượng **đồng nhất và khả tính** cho mọi cấu hình biến dự báo.

2.2.6 Liên hệ với giả định $E(\varepsilon | X) = 0$

Giả định tuyến tính và giả định $E(\varepsilon | X) = 0$ là **hai mặt của cùng một yêu cầu**: khi dạng hàm $E[Y|X]$ được chỉ định đúng, phần dư chỉ là nhiễu ngẫu nhiên, kỳ vọng của chúng bằng 0 tại mọi giá trị X . Khi dạng hàm sai, phần dư mang theo thông tin có hệ thống và $E(\varepsilon | X) \neq 0$.



Hình 2: $E(\varepsilon|X) = 0$ khi mô hình đúng dạng (trái) vs. $E(\varepsilon|X) \neq 0$ khi sai dạng (phải). Trái: phần dư dương (xanh) và âm (cam) phân bố đều hai phía, $\sum \varepsilon \approx 0$. Phải: phần dư dương tập trung ở giữa, âm ở hai đầu, tạo thành mẫu hình có hệ thống.

2.3 Tại Sao Tuyến Tính Mang Lại Lợi Thế

Tính tuyến tính trong tham số không phải là giả định tùy tiện. Nó cung cấp ba lợi thế cụ thể, tất cả đều bắt nguồn từ cùng một tính chất cấu trúc: $\hat{\beta}$ là **tổ hợp tuyến tính của y** .

1. Nghiệm dạng đóng. *Nghiệm dạng đóng* (closed-form solution) nghĩa là bài toán có một công thức đại số hữu hạn để tính trực tiếp kết quả, thay vì phải dò nghiệm bằng thuật toán lặp [12, Sec. 2.4]. Với OLS, mục tiêu là chọn β để tối thiểu hóa tổng bình phương phần dư:

$$RSS(\beta) = (y - X\beta)^\top (y - X\beta).$$

Vì mô hình tuyến tính trong β , hàm $RSS(\beta)$ là một hàm bậc hai theo các tham số. Lấy đạo hàm theo β và cho bằng 0 tạo ra **hệ phương trình chuẩn**:

$$X^\top X \hat{\beta} = X^\top y.$$

Góc nhìn hình học tương đương là phần dư $e = y - X\hat{\beta}$ phải trực giao với mọi cột của X , tức $X^\top e = 0$.

Nếu X đầy đủ hạng cột, $X^\top X$ khả nghịch và ta cô lập được nghiệm:

$$\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top y.$$


Đây là nghiệm dạng đóng của OLS: về mặt toán học, nó cho nghiệm duy nhất và là cực tiểu toàn cục của RSS. Trong tính toán thực tế, phần mềm thường dùng các phân

rã số như QR hoặc Cholesky thay vì nghịch đảo ma trận trực tiếp, nhưng bản chất vẫn là giải hệ tuyến tính một lần, không phải dò lặp như hồi quy phi tuyến.

Nếu $\mathbf{X}$ không đầy đủ hạng cột, thường do đa cộng tuyến hoàn hảo, thì $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ không khả nghịch và công thức nghịch đảo ở trên không áp dụng. Khi đó hệ phương trình chuẩn có thể có vô số nghiệm; các cách xử lý chuẩn gồm dùng generalized inverse, đặt side conditions, hoặc tái tham số hóa mô hình [10, Ch. 12, p. 302]. Nếu mục tiêu chính là ổn định dự báo trong bối cảnh đa cộng tuyến mạnh, các phương pháp regularization như ridge hoặc lasso cũng là lựa chọn thực hành [12, Sec. 10.2.3, p. 244].

2. Ước lượng tối ưu—Định lý Gauss-Markov. Vì $\hat{\beta}$ là tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{y}$, trong lớp tất cả các ước lượng tuyến tính không chệch, OLS đạt phương sai nhỏ nhất—tính chất **BLUE** (Best Linear Unbiased Estimator) [10, Thm. 7.3d, p. 145]. Định lý này không đòi hỏi phân phối chuẩn: chỉ cần $E(\varepsilon|X) = 0$, $\text{Var}(\varepsilon) = \sigma^2 I$, và $\text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0$.

3. Suy diễn đáng tin—Định lý Giới Hạn Trung Tâm cho $\hat{\beta}$. Vì $\hat{\beta}$ là tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{y}$, CLT đảm bảo $\hat{\beta}$ xấp xỉ chuẩn trong mẫu lớn dù sai số có phân phối bất kỳ. Khi sai số *thực sự* chuẩn, $\hat{\beta}$ chuẩn chính xác và thống kê t , F theo đúng phân phối lý thuyết—nền tảng của mọi kiểm định giả thuyết và khoảng tin cậy.



Hình 3: Minh họa hai lợi thế của tuyến tính trong tham số. **Trái (Gauss-Markov BLUE):** $B = 4000$ lần mô phỏng, $n = 40$, $\beta_1 = 2$. OLS (xanh dương) có phân phối lấy mẫu hẹp hơn đáng kể so với ước lượng tuyến tính không chệch thay thế (đỏ), cả hai đều tập trung tại giá trị thực. **Phải (CLT cho $\hat{\beta}_1$):** sai số có phân phối $\text{Exp}(1) - 1$ lệch phải rõ ràng. Khi n tăng từ 10 lên 200, phân phối lấy mẫu của $\hat{\beta}_1$ nhanh chóng tiến về chuẩn—suy diễn bằng t -test vẫn hợp lệ tiệm cận.

2.4 Hậu Quả Khi Vi Phạm Tuyến Tính

Khi dạng hàm thực là phi tuyến nhưng ta khớp bằng đường thẳng, đường thẳng đó hấp thụ độ cong vào hệ số, tạo ra trung bình *sai ở mọi nơi*—không chỉ ồn ào mà là chệch có cấu trúc. Đây là vi phạm nguy hiểm nhất vì nó phá vỡ tính không chệch ngay tại lõi của OLS. Năm biểu hiện quan sát được:

1. Ước lượng chệch: $E[\hat{\beta}] \neq \beta$ —hệ số sai trung bình, không phải chỉ không chính xác. OLS hấp thụ phần phi tuyến bị bỏ sót vào hệ số, làm lệch ước lượng tốc độ thay đổi của biến phản hồi.

2. Mẫu hình phần dư có hệ thống: đồ thị phần dư theo giá trị khớp cho thấy dạng cong (chữ U, chữ S) thay vì phân tán ngẫu nhiên—đây là tín hiệu chẩn đoán chính. Đường LOESS lệch khỏi $y = 0$ một cách có quy luật.

3. Khớp kém: s^2 bị thổi phồng vì mô hình quy cho sai số ngẫu nhiên những phần biến động thực ra có cấu trúc. Khoảng tin cậy quá rộng, kiểm định mất sức mạnh thống kê.


4. Suy diễn không hợp lệ: kiểm định t và F dựa trên mô hình sai lệch— p -value và khoảng tin cậy không đáng tin. Một biến có thể có ý nghĩa thống kê không phải vì tác động thực, mà vì nó đang bù đắp cho phần phi tuyến bị thiếu.

5. Dự báo không chính xác: khoảng cách giữa đường khớp và đường cong thực mở rộng ra ngoài vùng huấn luyện, nơi ngoại suy nguy hiểm nhất.

Điểm phân biệt quan trọng. Khác với vi phạm giả định chuẩn tắc (chỉ ảnh hưởng đến suy diễn), vi phạm tuyến tính ảnh hưởng trực tiếp đến *bản thân ước lượng* $\hat{\beta}$ và $\hat{y}$: chúng không còn ước lượng đúng tham số quan tâm nữa.

2.4.1 Tứ Giác Anscombe

Anscombe (1973), được Weisberg dùng để nhấn mạnh vai trò của chẩn đoán phần dư [12, Sec. 2.4, p. 27], đã xây dựng bốn bộ dữ liệu có cùng $\hat{\beta}_0 \approx 3$, $\hat{\beta}_1 \approx 0.5$, $R^2 \approx 0.67$ và cùng p -value của kiểm định t cho hệ số β_1 —nhưng nhìn hoàn toàn khác nhau. Bộ II rõ ràng là quan hệ bậc hai. Bộ III bị một điểm ngoại lai kéo hệ số. Bộ IV có đòn bẩy cực cao tại một điểm. Kết quả hồi quy không cảnh báo gì cả; chỉ đồ thị phần dư mới tiết lộ vi phạm.



Hình 4: Tứ giác Anscombe: bốn bộ dữ liệu với cùng $\hat{\beta}_1 \approx 0.5$ và $R^2 \approx 0.67$. **Hàng trên:** scatterplot với đường hồi quy bậc nhất—nhìn qua output số không phân biệt được. **Hàng dưới:** đồ thị phần dư theo giá trị khớp. Bộ I (tuyến tính): phần dư ngẫu nhiên, LOESS nằm ngang. Bộ II (phi tuyến bậc 2): LOESS cong hình cung, vi phạm tuyến tính rõ. Bộ III (ngoại lai): một điểm kéo hệ số lên cao, phần dư có điểm ngoại lai lớn. Bộ IV (đòn bẩy): một điểm kiểm soát toàn bộ hồi quy.

```

1 data(anscombe)
2 # Tất cả có cùng hệ số hồi quy và R2
3 fits <- lapply(1:4, function(i)
4   lm(anscombe[[paste0("y",i)]] ~ anscombe[[paste0("x",i)]])
5
6 do.call(rbind, lapply(fits, function(m) {
7   s <- summary(m)
8   round(c(b0 = coef(m)[1], b1 = coef(m)[2],
9     R2 = s$r.squared, p = coef(s)[2,4]), 3)
10 })))

```


	b0	b1	R2	p
[1,]	3.00	0.500	0.667	0.002

[2,]	3.00	0.500	0.666	0.002
[3,]	3.00	0.500	0.666	0.002
[4,]	3.00	0.500	0.667	0.002

2.4.2 Ví Dụ Thực Tế

Bốn bộ dữ liệu từ các lĩnh vực khác nhau minh họa cùng một mẫu hình: đường thẳng OLS không bám sát dữ liệu, và đồ thị phần dư phản chiếu rõ độ cong bị bỏ sót.

Vi phạm tuyến tính: dữ liệu thực tế



Hình 5: Bốn ví dụ thực tế vi phạm tính tuyến tính. **Cột trái:** scatter plot với đường hồi quy OLS bậc 1 (đỏ). **Cột phải:** đồ thị phần dư theo giá trị khớp; đường LOESS (đỏ) lệch có hệ thống khỏi $y = 0$. **(1) Turkey growth:** tốc độ tăng cân theo liều methionine bão hòa dần—đường thẳng đánh giá thấp ở đầu, cao ở cuối. **(2) Mammals:** khối lượng não theo khối lượng cơ thể trải dài hàng nghìn lần—OLS bị chi phối bởi vài loài lớn. **(3) Physics:** tiết diện tán xạ giảm nhanh theo đà—dạng lũy thừa không thể khớp bằng đường thẳng. **(4) Cedar trees:** chiều cao cây tiệm cận mức tối đa khi đường kính lớn—dạng sigmoid.

```


1 # -- (1) Turkey growth:  $E(Y/Dose) = b_0 + b_1(1 - \exp(-b_2 \cdot Dose))$ 
   -----
2 set.seed(101)
3 dose_lvl <- c(0, 0.04, 0.08, 0.12, 0.16, 0.20)
4 dose_t   <- rep(dose_lvl, each = 5)
5 y_turkey <- 639 + 168*(1 - exp(-37*dose_t)) + rnorm(30, 0, 18)
6
7 fit_lin_t <- lm(y_turkey ~ dose_t)
8 plot(dose_t, y_turkey, pch = 16, col = "steelblue",
9      xlab = "Dose (mg/g)", ylab = "Weight gain (g)")
10 abline(fit_lin_t, col = "red", lwd = 2)
11 plot(fit_lin_t, which = 1) # phan du cong ro
12
13 # -- (2) Mammals: brain ~ body (MASS)
   -----
14 library(MASS); data(mammals)
15 fit_raw <- lm(brain ~ body, data = mammals)
16 plot(fit_raw, which = 1) # phan du bien dang nang
17
18 # -- (3) Physics cross sections
   -----
19 set.seed(102)
20 x_phys <- sort(runif(38, 0.3, 3.5))
21 y_phys <- 45 * x_phys^(-1.7) * exp(rnorm(38, 0, 0.15))
22
23 fit_lin_p <- lm(y_phys ~ x_phys)
24 plot(fit_lin_p, which = 1) # LOESS cong chu U
25
26 # -- (4) Cedar trees: height ~ dbh
   -----
27 set.seed(103)
28 dbh <- sort(runif(65, 5, 78))
29 height <- 30*(1 - exp(-0.055*dbh)) + rnorm(65, 0, 2.2)
30
31 fit_lin_d <- lm(height ~ dbh)
32 plot(fit_lin_d, which = 1) # LOESS cong chu S

```

Trong cả bốn trường hợp, đường LOESS trên đồ thị phần dư lệch khỏi $y = 0$ theo mẫu hình có hệ thống—dấu hiệu chẩn đoán chính của sai dạng hàm trung bình. Hình 6

minh họa các cách sửa khác nhau: log-log và spline vẫn có thể viết như mô hình tuyến tính theo tham số sau biến đổi hoặc sau khi dựng hàm cơ sở; riêng Turkey phải dùng NLS vì tham số β_2 nằm trong hàm mũ, nên đây là hồi quy phi tuyến theo tham số chứ không còn là OLS tuyến tính cổ điển.

Khắc phục: mô hình phù hợp với từng cấu trúc dữ liệu



Hình 6: Cùng bốn bộ dữ liệu sau khi sửa đặc tả hàm trung bình (xanh lá). Hình này không nói rằng mọi cách sửa vẫn thuộc OLS tuyến tính cổ điển. **(1) Turkey:** NLS với dạng bão hòa $\beta_0 + \beta_1[1 - e^{-\beta_2 \cdot \text{dose}}]$ —phù hợp về mặt cơ chế nhưng phi tuyến theo tham số. **(2) Mammals:** OLS trên thang log-log—tuyến tính theo tham số sau biến đổi. **(3) Physics:** khớp lũy thừa qua log-log—tuyến tính theo tham số trên thang log. **(4) Cedar trees:** cubic spline với 3 nút—đường cong theo biến gốc nhưng vẫn tuyến tính theo hệ số spline.

```

1 # -- (1) Turkey: NLS
  -----
2 fit_nls_t <- nls(y_turkey ~ b0 + b1*(1 - exp(-b2*dose_t)),
3                 start = list(b0 = 630, b1 = 160, b2 = 30))
4
5 # -- (2) Mammals: log-log
  -----
6 fit_log <- lm(log(brain) ~ log(body), data = mammals)
7 # He so: slope ~ 0.75 (dinh luat Kleiber)
8
9 # -- (3) Physics: log-log
  -----
10 fit_logp <- lm(log(y_phys) ~ log(x_phys))
11
12 # -- (4) Trees: cubic spline
  -----
13 library(splines)
14 fit_spl_t <- lm(height ~ bs(dbh, knots = quantile(dbh,
15               c(.25,.5,.75))))

```

2.5 Phát Hiện Vi Phạm

Không có công cụ đơn lẻ nào đủ trong hồi quy bội. Năm công cụ sau được dùng theo thứ tự, từ khảo sát ban đầu đến xác nhận hình thức.

Công cụ	Khi dùng	Phát hiện
Ma trận đồ thị phân tán	Trước khi khớp	Độ cong biên rõ ràng
Phần dư theo giá trị khớp	Sau khi khớp	Có gì đó sai tổng thể
Phần dư theo từng X_j	Sau khi khớp	Biến nào là nguồn gốc
Đồ thị hồi quy riêng phần	Sau khi khớp	Đóng góp tuyến tính riêng biệt của từng biến
Kiểm định Tukey	Sau khi đồ thị gợi ý	Xác nhận hình thức về độ cong

Checklist thực hành. Một quy trình kiểm tra tuyến tính có thể đi theo sáu bước: (1) vẽ scatter plot hoặc ma trận scatter trước khi khớp mô hình; (2) kiểm tra residuals vs fitted sau khi khớp; (3) dùng residual plots theo từng biến và added-variable/partial-residual plots để khoanh vùng biến gây cong; (4) thử biến đổi biến, đa thức hoặc splines khi đồ thị gợi ý sai dạng hàm; (5) so sánh mô hình bằng AIC, BIC, cross-validation hoặc PRESS; và (6) vẽ lại residual plot sau khi sửa để xác nhận mẫu hình cong đã


biến mất. Quy trình này tương ứng với các công cụ chẩn đoán, biến đổi và chọn mô hình trong Weisberg [12, Ch. 1; Sec. 3.1.2; Sec. 3.4.8; Ch. 5; Ch. 8; Sec. 9.1; Sec. 10.2].

2.5.1 Ma Trận Đồ Thị Phân Tán

Vẽ mọi cặp quan hệ giữa Y và các biến dự báo $X_1, \dots, X_k$ trong một lưới trước khi khớp bất cứ thứ gì. Cho thấy bức tranh trực quan về các mối quan hệ biên và có thể báo hiệu độ cong rõ ràng ngay từ đầu.

Giới hạn: Chỉ nắm bắt quan hệ hai biến. Phi tuyến chỉ xuất hiện trong sự kết hợp của nhiều biến sẽ ẩn ở đây. Không thay thế được các công cụ sau khi khớp.

Ma trận đồ thị phân tán: mtcars



Hình 7: Ma trận đồ thị phân tán cho bốn biến của mtcars. **Tam giác dưới:** scatter plot với đường LOESS (đỏ)—cho thấy độ cong biên trước khi khớp mô hình. **Đường chéo:** tên biến, mô tả ngắn và histogram mật độ của từng biến riêng lẻ. **Tam giác trên:** hệ số tương quan Pearson (cỡ chữ theo độ lớn, xanh dương = dương, đỏ = âm). Quan hệ mpg–hp và mpg–disp có đường LOESS cong rõ—gợi ý phi tuyến biên cần kiểm tra kỹ hơn sau khi khớp.

```

1 # Ma tran do thi phan tan co LOESS va tuong quan
2 panel_scatter <- function(x, y, ...) {
3   points(x, y, pch = 16, cex = 0.65, col = "steelblue")
4   lines(lowess(x, y), col = "red", lwd = 2)
5 }
6 panel_cor <- function(x, y, ...) {
7   r <- cor(x, y, use = "complete.obs")
8   text(0.5, 0.5, round(r, 2), cex = 0.8 + 1.8*abs(r),
9       col = if(r > 0) "blue" else "red", font = 2,

```

```

10     transform = NULL)
11 }
12 pairs(mtcars[, c("mpg", "hp", "wt", "disp")],
13       lower.panel = panel_scatter,
14       upper.panel = panel_cor)


```

2.5.2 Phần Dư Theo Giá Trị Khớp (Công Cụ Chính)

Trục x là giá trị khớp $\hat{y}$, trục y là phần dư $e_i = y_i - \hat{y}_i$. Công cụ này hoạt động như “kính lúp”: trừ đi xu hướng tuyến tính, phóng đại những sai lệch nhỏ bên dưới.

- **Không vi phạm:** Điểm phân tán ngẫu nhiên quanh $y = 0$, đường LOESS nằm ngang—đây là “biểu đồ rỗng” lý tưởng.
- **Vi phạm:** Đường LOESS tạo thành dạng cong (chữ U, chữ S): quan hệ phi tuyến bị bỏ sót ở đâu đó trong mô hình.

Trong hồi quy bội, đồ thị này chỉ báo “có điều gì đó sai” nhưng không chỉ ra biến nào là nguyên nhân.



Hình 8: Đồ thị phần dư theo giá trị khốp: “biểu đồ rộng” (không vi phạm) so với mẫu hình cong (vi phạm). (a)–(b) Dữ liệu tuyến tính: LOESS gần nằm ngang, điểm phân tán đều. (c)–(d) Dữ liệu cong khớp bằng bậc 1: LOESS cong hình chữ U xác nhận vi phạm tuyến tính.

2.5.3 Phần Dư Theo Từng Biến Dự Báo

Vẽ phần dư e_i theo từng biến X_j riêng lẻ. Dạng cong trong một trong các đồ thị này *khoanh vùng vấn đề*: biến cụ thể đó không được mô hình hóa đúng dạng. Thường có thể khắc phục bằng cách thêm số hạng X_j^2 hoặc $\log X_j$.

```
1 fit <- lm(mpg ~ hp + wt + disp, data = mtcars)
2 par(mfrow = c(1, 3))
3 for (v in c("hp", "wt", "disp")) {
4   plot(mtcars[[v]], residuals(fit),
5        xlab = v, ylab = "Residuals", pch = 16, col =
6          "steelblue")
7   abline(h = 0, lty = 2)
8   lines(lowess(mtcars[[v]], residuals(fit)), col = "red", lwd =
9     2)
```


2.5.4 Đồ Thị Hồi Quy Riêng Phần

Đồ thị phần dư theo từng X_j có một điểm yếu: nó không loại trừ ảnh hưởng của các biến khác, nên có thể phản ánh sai mối quan hệ của X_j với Y . Đồ thị hồi quy riêng phần (added-variable plot) khắc phục điều này.

Cách xây dựng. Cho biến dự báo X_j :

1. Hồi quy Y lên tất cả các biến trừ $X_j \rightarrow$ lấy phần dư e_Y .
2. Hồi quy X_j lên tất cả các biến trừ $X_j \rightarrow$ lấy phần dư e_{X_j} .
3. Vẽ e_Y theo e_{X_j} .

Độ dốc của đồ thị này bằng *chính xác* hệ số β_j trong mô hình đầy đủ—nó cô lập đóng góp tuyến tính *duy nhất* của X_j sau khi đã tính đến mọi biến khác. Dạng phi tuyến ở đây xác nhận X_j không được đưa vào mô hình đúng dạng.



Hình 9: Đồ thị hồi quy riêng phần cho mô hình $\text{mpg} \sim \text{hp} + \text{wt} + \text{disp}$ (mtcars). Trục x và y là phần dư của X_j và Y sau khi đã loại bỏ ảnh hưởng của các biến còn lại. Chú thích trên mỗi panel: $\hat{\beta}_{AV}$ (độ dốc của đồ thị) và $\hat{\beta}_{full}$ (hệ số trong mô hình đầy đủ)—hai giá trị khớp chính xác nhau. Quan hệ gần thẳng xác nhận dạng tuyến tính là phù hợp cho cả ba biến trong mô hình này.

```

1 # Implement added-variable plot thủ công (không cần package car)
2 av_plot <- function(fit, jname) {
3   vars <- attr(terms(fit), "term.labels")
4   others <- setdiff(vars, jname)
5   fmY <- as.formula(paste("mpg ~", paste(others, collapse =
      "+")))

```

```

6   fmXj    <- as.formula(paste(jname,    "~", paste(others,
      collapse = "+")))
7   eY      <- residuals(lm(fmY,  data = model.frame(fit)))
8   eXj     <- residuals(lm(fmXj, data = model.frame(fit)))
9   plot(eXj, eY, pch = 16, col = "steelblue",
10        xlab = paste0("e(", jname, " | others)"),
11        ylab = "e(mpg | others)", main = jname)
12   abline(lm(eY ~ eXj), col = "red", lwd = 2)
13 }
14
15 fit_full <- lm(mpg ~ hp + wt + disp, data = mtcars)
16 par(mfrow = c(1, 3))
17 for (v in c("hp", "wt", "disp")) av_plot(fit_full, v)

```

2.5.5 Kiểm Định Tukey Cho Tính Không Cộng Tính

Khi đồ thị phần dư gợi ý độ cong, hình thức hóa ẩn tượng thị giác: chọn một đại lượng U (một biến dự báo cụ thể hoặc giá trị khớp $\hat{y}$), thêm U^2 làm số hạng phụ vào mô hình, và chạy kiểm định t cho hệ số của nó:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \cdots + \beta_p X_p + \gamma U^2 + \varepsilon, \quad H_0: \gamma = 0$$

Kết quả có ý nghĩa ($p < 0.05$) xác nhận độ cong có hệ thống. Khi $U = \hat{y}$, thủ tục này được gọi là **kiểm định Tukey cho tính không cộng tính**—nó kiểm tra một cách tổng quát xem có bất kỳ dạng phi tuyến nào bị bỏ sót trong mô hình hay không.

```

1 fit_base <- lm(mpg ~ hp + wt, data = mtcars)
2 yhat     <- fitted(fit_base)
3
4 # Tukey's test: thêm yhat^2, kiểm tra hệ số gamma
5 fit_tukey <- lm(mpg ~ hp + wt + I(yhat^2), data = mtcars)
6 summary(fit_tukey)$coefficients["I(yhat^2)", ]

```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
I(yhat^2)	-0.0033021	0.0016574	-1.992	0.0560

$p = 0.056$ gần ngưỡng: đồ thị phần dư của mô hình `mpg ~ hp + wt` cho thấy độ cong nhẹ, kiểm định Tukey xác nhận đây không phải hoàn toàn ngẫu nhiên. Thêm `I(hp^2)` hoặc dùng `poly(hp, 2)` sẽ giải quyết vấn đề.

2.5.6 Đồ Thị Nền và Giao Thức Xếp Hàng

Khi đọc đồ thị phần dư, mắt người dễ thấy “mẫu hình” ngay cả trong dữ liệu hoàn toàn ngẫu nhiên. Câu hỏi cần đặt ra: mẫu hình ta thấy là vi phạm thực sự hay chỉ là biến động tự nhiên?


Một **đồ thị nền** là đồ thị phần dư được tạo từ dữ liệu mô phỏng *khi mô hình hoàn toàn đúng*—đây là chuẩn gốc của sự ngẫu nhiên với cỡ mẫu n và σ cụ thể:

1. Ước lượng mô hình gốc, thu được $\hat{\beta}$ và $\hat{\sigma}$.
2. Mô phỏng: $y^* = X\hat{\beta} + \varepsilon^*$, $\varepsilon^* \sim \mathcal{N}(0, \hat{\sigma}^2)$.
3. Khớp lại cùng mô hình trên y^* , lấy phần dư và vẽ đồ thị.

Giao thức xếp hàng (Wickham et al., 2010) biến việc đọc đồ thị thành kiểm định thống kê thị giác: tạo $m - 1$ đồ thị nền, chèn đồ thị thực vào vị trí ngẫu nhiên, hiển thị tất cả m đồ thị. Nếu người quan sát xác định đúng đồ thị thực, $p\text{-value} = 1/m$.

```
1 generate_null_residuals <- function(model) {  
2   n      <- length(fitted(model))  
3   y_sim <- fitted(model) + rnorm(n, sd = sigma(model))  
4   fit_null <- update(model, y_sim ~ .)  
5   data.frame(fitted = fitted(fit_null), resid =  
6     residuals(fit_null))  
7 }  
8  
9 set.seed(2025)  
10 fit      <- lm(mpg ~ hp, data = mtcars)  
11 real_pos <- sample(1:9, 1)  
12 par(mfrow = c(3, 3), mar = c(3, 3, 2.5, 1))  
13 for (i in 1:9) {  
14   d <- if (i == real_pos) data.frame(fitted = fitted(fit),  
15     residuals = residuals(fit))  
16   else generate_null_residuals(fit)  
17   plot(d$fitted, d$resid, pch = 16, cex = 0.7, col =  
18     "steelblue",  
19     xlab = "Fitted", ylab = "Residuals", main =  
20     paste("Plot", i))  
21   abline(h = 0, lty = 2, col = "gray60")  
22   lines(lowess(d$fitted, d$resid), col = "red", lwd = 2)  
23 }
```

Lineup: 8 null plots + 1 residual plot thực --- Bạn có thể xác định plot nào là thực không?



Hình 10: Giao thức xếp hàng: 8 đồ thị nền và 1 đồ thị phần dư thực (mô hình bậc 1 trên dữ liệu cong). Xác suất đoán ngẫu nhiên đúng là $1/9 \approx 11\%$. Nếu bạn nhận ra đồ thị thực, đó là bằng chứng thị giác có ý nghĩa thống kê. **Hữu ích nhất** khi $n < 30$ và mẫu hình phần dư mơ hồ. (Đáp án: Đồ thị 7.)

2.5.7 Phần Dư Chuẩn Hóa

Phần dư nguyên bản e_i có phương sai không đồng nhất, phụ thuộc vào đòn bẩy h_{ii} :

$$\text{Var}(e_i) = \sigma^2(1 - h_{ii})$$

Tại điểm có đòn bẩy cao (h_{ii} lớn), phần dư bị kéo về gần 0 ngay cả khi mô hình sai—**hiệu ứng che khuất**. Nên dùng phần dư Student hóa ngoài `rstudent(model)` thay thế: chúng có phương sai đồng nhất và nhạy hơn với bất thường cục bộ. Đồ thị hồi

quy riêng phần (mục 2.5.4) bổ sung góc nhìn cục bộ cho từng biến; hai công cụ bổ trợ nhau, không thay thế nhau.

2.6 Khắc Phục Vi Phạm

Năm phương pháp chính, từ đơn giản đến phức tạp, tương ứng với các chương về biến đổi, đa thức và splines trong Weisberg [12, Ch. 5; Ch. 8]. Lựa chọn dựa trên bản chất của dữ liệu và mục tiêu mô hình hóa.

Phương pháp	Phù hợp khi	Giữ nguyên OLS?
Biến đổi biến số	Quan hệ mũ hoặc lũy thừa đơn giản	Có, sau biến đổi
Hồi quy đa thức	Quan hệ cong vừa phải, toàn vùng	Có
Splines	Độ cong cục bộ; tránh méo biên	Có
Hồi quy phi tuyến	Dạng hàm có cơ sở lý thuyết rõ ràng	Không—cần lập số
GLMs	Biến phản hồi bị chặn hoặc là số đếm	Không—dùng hàm liên kết

2.6.1 Biến Đổi Biến Số


Thay thế X , Y , hoặc cả hai bằng một biến đổi làm thẳng quan hệ trước khi khớp OLS.

Dạng quan hệ thực	Biến đổi gợi ý	Mô hình sau biến đổi
$Y = \beta_0 \cdot e^{\beta_1 X}$	$\log(Y)$	$\log(Y) = \gamma_0 + \gamma_1 X$
$Y = \beta_0 \cdot X^{\beta_1}$	$\log(Y)$ và $\log(X)$	$\log(Y) = \gamma_0 + \gamma_1 \log(X)$
$Y = \beta_0 / (\beta_1 + X)$	$1/Y$ hoặc $1/X$	(tùy trường hợp)

Khi không rõ nên dùng biến đổi nào, **phương pháp Box-Cox** tìm kiếm λ tối ưu hóa hàm log-likelihood:

$$y^{(\lambda)} = \begin{cases} (y^\lambda - 1)/\lambda & \lambda \neq 0 \\ \log y & \lambda = 0 \end{cases}$$

$\lambda = 0$ tương ứng biến đổi log; $\lambda = 0.5$ tương ứng căn bậc hai. Khoảng tin cậy 95% cho λ từ profile likelihood chỉ ra biến đổi phù hợp.



Hình 11: Biến đổi $\log(Y)$ tuyến tính hóa quan hệ mũ. Trái: Y theo X dạng cong, OLS bậc 1 bỏ lỡ xu hướng. Phải: $\log(Y)$ theo X quan hệ tuyến tính, OLS và LOESS trùng khớp. Hệ số γ_1 diễn giải trực tiếp là phần trăm thay đổi của Y khi X tăng 1 đơn vị.

```
1 library(MASS)
2 # Box-Cox: tìm lambda tối ưu
3 bc <- boxcox(mpg ~ hp + wt, data = mtcars)
4 lambda_opt <- bc$x[which.max(bc$y)]
5 cat("lambda tối ưu:", round(lambda_opt, 2), "\n")
6 # lambda ~ 0 -> dùng log(Y); lambda ~ 0.5 -> dùng sqrt(Y)
```

2.6.2 Hồi Quy Đa Thức

Bổ sung lũy thừa nguyên của biến dự báo làm biến hồi quy. Đây vẫn là **mô hình tuyến tính** vì tuyến tính trong β .

Một biến dự báo.

$$E(Y | X = x) = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \dots + \beta_d x^d$$

Nhiều biến dự báo. Mô hình bậc hai với X_1 và X_2 thêm cả tương tác:

$$E(Y | x_1, x_2) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{11} x_1^2 + \beta_{22} x_2^2 + \beta_{12} x_1 x_2$$

Tổng quát với k biến: $1 + k + k + k(k-1)/2$ tham số cho mô hình bậc hai.

Ứng dụng nổi bật: xác định cực trị. Khi $d = 2$, đỉnh hoặc đáy của parabol xảy ra tại:

$$x_M = -\frac{\beta_1}{2\beta_2}$$


Hữu ích trong tối ưu hóa (liều thuốc tối ưu, nhiệt độ vận hành tốt nhất, ...).

Rủi ro chính. Đa thức là hàm *toàn cục*: bậc cao khớp tốt ở giữa nhưng dao động mạnh ở biên (xem hình 12). Dùng `poly(X, d)` thay vì `I(X^2)` để nhận đa thức trực giao, tránh đa cộng tuyến số.

2.6.3 Splines

Splines chia phạm vi X thành các đoạn tại các **nút** (knots) và khớp một đa thức bậc thấp riêng biệt trong từng đoạn, nối trơn tại ranh giới. Khác với đa thức toàn cục, splines là *cục bộ*: độ cong ở một vùng không làm méo dự báo ở vùng khác.

Cubic B-splines là cơ sở tiêu chuẩn: mỗi hàm cơ sở khác không chỉ trên một khoảng nhỏ, đảm bảo đường cong trơn đến đạo hàm bậc hai tại mọi nút và tính toán ổn định về số.



Hình 12: Đa thức bậc 7 (toàn cục) so với cubic B-spline với 4 nút trên dữ liệu $y = \sin(x) + \varepsilon$. **Trái:** Đa thức bậc 7 khớp tốt ở giữa nhưng dao động mạnh ở biên trái và phải, lệch xa giá trị thực. **Phải:** Cubic B-spline bám sát $\sin(x)$ ổn định trên toàn vùng; các đường đứt nét thẳng đứng là vị trí nút.

```
1 library(splines)
2 # Cubic B-spline với nút tại phân vị 25, 50, 75
3 fit_spl <- lm(mpg ~ bs(hp,
4                   knots = quantile(mtcars$hp, c(0.25,
5                   0.5, 0.75)),
6                   degree = 3),
7                   data = mtcars)
```

```

8 hp_seq <- seq(min(mtcars$hp), max(mtcars$hp), length.out = 300)
9 pred_sp <- predict(fit_spl, newdata = data.frame(hp = hp_seq))
10
11 plot(mtcars$hp, mtcars$mpg, pch = 16, col = "gray50",
12       xlab = "hp", ylab = "mpg")
13 lines(hp_seq, pred_sp, col = "blue", lwd = 2)

```

2.6.4 Hồi Quy Phi Tuyến

Khi quan hệ được chi phối bởi một cơ chế lý thuyết đã biết—suy giảm mũ, tăng trưởng logistic, động học Michaelis-Menten—khớp mô hình với tham số tương tác *phi tuyến*:

$$y = \beta_0 + \beta_1 \exp(\beta_2 x) + \varepsilon$$

Nghiem dạng đóng OLS không áp dụng, và các kết quả Gauss–Markov cho OLS tuyến tính không được dùng trực tiếp cho mô hình này. Tham số được ước lượng lặp bằng **thuật toán Gauss-Newton**: tuyến tính hóa mô hình quanh ước lượng hiện tại, cập nhật tham số, lặp lại cho đến hội tụ. Cần cung cấp giá trị khởi đầu hợp lý; nếu không, thuật toán có thể không hội tụ hoặc hội tụ về cực tiểu cục bộ.

Khi nào nên dùng: chỉ khi có dạng hàm có cơ sở lý thuyết. Nếu chỉ cần khớp đường cong mà không có cơ chế cụ thể, splines thường ưu tiên hơn.

```

1 # Hồi quy phi tuyến: Y = a * exp(b * X) + c
2 # nls() yêu cầu giá trị khởi đầu
3 fit_nls <- nls(mpg ~ a * exp(b * hp) + c,
4               data = mtcars,
5               start = list(a = 50, b = -0.005, c = 5))
6 summary(fit_nls)$coefficients

```

2.6.5 Mô Hình Tuyến Tính Tổng Quát (GLMs)

Khi biến phản hồi có ràng buộc cấu trúc tự nhiên—xác suất bị chặn trong $[0, 1]$, số đếm không thể âm—không có biến đổi nào của X tạo được quan hệ đường thẳng với biến phản hồi bị chặn. GLMs giải quyết bằng **hàm liên kết** $g(\cdot)$:

$$g(E[Y | X]) = X\beta$$

Tham số vẫn tuyến tính trong $X\beta$; hàm liên kết xử lý ánh xạ phi tuyến giữa thang

biến phản hồi và không gian dự báo tuyến tính. Ước lượng bằng Maximum Likelihood, không phải OLS.

Kiểu phản hồi	Mô hình	Hàm liên kết	R
Nhị phân $\{0, 1\}$	Logistic	$\log\left(\frac{\mu}{1-\mu}\right)$	<code>glm(..., binomial)</code>
Số đếm $\{0, 1, 2, \dots\}$	Poisson	$\log(\mu)$	<code>glm(..., poisson)</code>
Tỷ lệ $(0, 1)$	Beta	logit	<code>betareg()</code>

2.6.6 So Sánh Mô Hình

Sau khi đề xuất các mô hình khác nhau, cần tiêu chí khách quan để chọn độ phức tạp phù hợp [12, Sec. 10.2, pp. 238–239, 247].

ANOVA (kiểm định F cho mô hình lồng nhau):

$$H_0: \text{Mô hình đơn giản hơn là đủ (hệ số bậc cao} = 0)$$

Chỉ áp dụng cho mô hình lồng nhau. $p < 0.05$: mô hình phức tạp hơn cải thiện đáng kể.

AIC và BIC:

$$\text{AIC} = -2\log(L) + 2k \quad \text{BIC} = -2\log(L) + k\log(n)$$

Áp dụng được cho mô hình không lồng nhau. $\Delta\text{AIC} > 2$ đã có ý nghĩa; BIC phạt nặng hơn cho số tham số, ưu tiên mô hình đơn giản hơn.

Tiêu chí	Ưu điểm	Hạn chế
ANOVA	Kiểm định chính xác, p -value rõ ràng	Chỉ cho mô hình lồng nhau
AIC	Linh hoạt, tốt cho dự báo	Có thể chọn mô hình quá phức tạp
BIC	Phạt nặng hơn, ưu tiên mô hình gọn	Đôi khi quá thận trọng

Cảnh báo quá khớp. Bậc đa thức hoặc số nút spline quá cao thường dẫn đến quá khớp. Ưu tiên mô hình đơn giản nhất mà vẫn giải thích được xu hướng chính; kiểm tra đồ thị phần dư sau khi chọn mô hình.

2.6.7 Đánh Giá Mô Hình Sau Khi Khắc Phục


Sau khi áp dụng biến đổi, thêm số hạng đa thức, hoặc dùng spline, cần xác minh rằng mô hình mới thực sự cải thiện. Dưới đây là năm công cụ đánh giá thường dùng.

1. **Đồ thị phần dư — kiểm tra trực quan đầu tiên.** Vẽ lại đồ thị phần dư theo giá trị khớp. Nếu phi tuyến đã được giải quyết, đồ thị trở thành “null plot”: phân tán ngẫu nhiên, đường LOESS nằm ngang gần $y = 0$. Đồng thời kiểm tra xem việc sửa chữa có làm lộ ra vi phạm khác (phương sai không đồng đều, điểm ngoại lai) hay không.
2. **Adjusted R^2 — trừng phạt độ phức tạp.** Khi thêm số hạng mới, R^2 thông thường luôn tăng (dù số hạng đó vô nghĩa). Adjusted R^2 hiệu chỉnh theo bậc tự do:
$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{(1 - R^2)(n - 1)}{n - k - 1},$$
trong đó k là số biến dự báo. Nếu thêm bậc mà $\bar{R}^2$ giảm hoặc không đổi, số hạng đó không đóng góp thực sự.
3. **AIC và BIC — cân bằng độ khớp và độ phức tạp.** AIC và BIC đã trình bày ở trên. Chênh lệch $\Delta\text{AIC} > 2$ được coi là có ý nghĩa; BIC phạt nặng hơn nên ưu tiên mô hình gọn hơn khi cỡ mẫu lớn.
4. **Cross-validation — đánh giá khả năng dự báo thực sự.** Chia dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm tra; ước lượng tham số trên tập huấn luyện rồi đo sai số dự báo trên tập kiểm tra. k -fold CV (thường $k = 5$ hoặc 10) là lựa chọn phổ biến.
5. **PRESS (Prediction Sum of Squares) — leave-one-out.** PRESS tính tổng bình phương sai số dự báo khi lần lượt loại từng quan sát:

$$\text{PRESS} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{e_i}{1 - h_{ii}} \right)^2,$$

với h_{ii} là đòn bẩy (leverage) của quan sát i . Công thức này không yêu cầu fit lại mô hình n lần. Mô hình có PRESS nhỏ hơn dự báo tốt hơn trên dữ liệu mới.

Minh họa trực quan: trước và sau khi sửa. Hình 13 so sánh mô hình tuyến tính (hàng trên) và đa thức bậc 2 (hàng dưới) trên bộ dữ liệu `mtcars` với biến phản hồi `mpg` và biến dự báo `hp`. Đồ thị phần dư ở cột giữa là tín hiệu rõ nhất: đường LOESS cong hình chữ U (mô hình tuyến tính) biến thành đường nằm ngang gần $y = 0$ (mô hình bậc 2).



Hình 13: So sánh mô hình tuyến tính (hàng trên) và đa thức bậc 2 (hàng dưới) trên `mtcars`. Cột trái: scatter và đường fit; cột giữa: phần dư theo giá trị khớp; cột phải: Q-Q plot. Đường LOESS hình chữ U trong panel (b) biến mất ở panel (e), xác nhận phi tuyến đã được khắc phục.

Bảng tổng hợp chỉ số đánh giá (dataset `mtcars`, $n = 32$):

Chỉ số	Linear	Quadratic	Cubic
R^2	0.602	0.756	0.761
Adj. R^2	0.589	0.739	0.735
AIC	181.2	167.6	169.0
BIC	185.6	173.5	176.3
PRESS	552.1	338.0	338.4

Diễn giải bảng. Mô hình bậc 2 cải thiện đáng kể so với tuyến tính: Adj. R^2 tăng từ 0.589 lên 0.739, AIC giảm ≈ 13.6 đơn vị, PRESS giảm từ 552 xuống 338 (giảm 39%). Mô hình bậc 3 không cải thiện thêm (Adj. R^2 giảm, AIC tăng nhẹ, PRESS gần như bằng nhau) — bằng chứng quá khớp tiềm năng. Mô hình bậc 2 là lựa chọn tốt nhất theo cả năm tiêu chí.

```

1 data(mtcars)
2 model_lin  <- lm(mpg ~ hp,                      data = mtcars)
3 model_quad <- lm(mpg ~ poly(hp, 2), data = mtcars)
4 model_cub  <- lm(mpg ~ poly(hp, 3), data = mtcars)

```

```

5
6 # Adj R2
7 sapply(list(model_lin, model_quad, model_cub),
8         function(m) round(summary(m)$adj.r.squared, 3))
9
10 # AIC / BIC
11 AIC(model_lin, model_quad, model_cub)
12 BIC(model_lin, model_quad, model_cub)
13
14 # PRESS (leave-one-out, không cần fit lại n lần)
15 press <- function(fit) sum((residuals(fit) / (1 -
16                             hatvalues(fit)))^2)
17 sapply(list(model_lin, model_quad, model_cub), press)

```

2.7 Ví Dụ R: Dataset mtcars

Bài toán: Dự báo lượng nhiên liệu tiêu thụ (mpg) từ công suất động cơ (hp). Liệu quan hệ này có tuyến tính không?

Bước 1: Khám phá dữ liệu và ước lượng mô hình tuyến tính

```

1 data(mtcars)
2
3 plot(mtcars$hp, mtcars$mpg,
4       xlab = "Horsepower (hp)", ylab = "Miles per gallon (mpg)",
5       main = "mpg vs hp", pch = 16, col = "steelblue")
6
7 model_linear <- lm(mpg ~ hp, data = mtcars)
8 abline(model_linear, col = "red", lwd = 2)
9
10 # Residual plot
11 par(mfrow = c(1, 2))
12 plot(model_linear, which = 1, main = "Residuals vs Fitted
13       (Linear)")
14 plot(model_linear, which = 2)

```

Quan sát. Đường LOESS trong đồ thị phần dư theo giá trị khớp có dạng cong (chữ U): vi phạm tuyến tính rõ ràng.

Bước 2: Fit model đa thức bậc 2 và bậc 3


```

1 model_quad <- lm(mpg ~ poly(hp, 2), data = mtcars)
2 model_cubic <- lm(mpg ~ poly(hp, 3), data = mtcars)
3 summary(model_quad)

```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	20.091	0.570	35.24	<2e-16 ***
poly(hp, 2)1	-26.045	3.225	-8.08	8.3e-09 ***
poly(hp, 2)2	8.720	3.225	2.70	0.011 *

Hệ số bậc 2 có ý nghĩa thống kê ($p = 0.011$) → quan hệ phi tuyến được xác nhận.

Bước 3: So sánh model bằng ANOVA và AIC/BIC

```

1 anova(model_linear, model_quad, model_cubic)
2 AIC(model_linear, model_quad, model_cubic)
3 BIC(model_linear, model_quad, model_cubic)

```

Analysis of Variance Table

	Res.Df	RSS	Df	Sum of Sq	F	Pr(>F)
1	30	447.67				
2	29	360.37	1	87.303	7.309	0.01149 *
3	28	334.55	1	25.816	2.161	0.15261

	df	AIC	df	BIC
model_linear	3	181.394	model_linear	3 185.887
model_quad	4	175.665	model_quad	4 181.653
model_cubic	5	175.880	model_cubic	5 183.364

<- nho nhat

Diễn giải: Mô hình bậc 2 cải thiện đáng kể so với bậc 1 ($p = 0.011$). Mô hình bậc 3 không thêm giá trị ($p = 0.153$). Cả AIC và BIC đều chỉ mô hình bậc 2 là tốt nhất.

Bước 4: Trực quan hóa kết quả

```

1 hp_seq <- seq(min(mtcars$hp), max(mtcars$hp), length.out =
  200)
2 new_data <- data.frame(hp = hp_seq)
3
4 pred_linear <- predict(model_linear, newdata = new_data)
5 pred_quad <- predict(model_quad, newdata = new_data)

```

```

6 pred_cubic <- predict(model_cubic, newdata = new_data)
7
8 plot(mtcars$hp, mtcars$mpg,
9      xlab = "Horsepower (hp)", ylab = "mpg",
10     main = "So sánh Linear vs Polynomial", pch = 16, col =
11           "gray50")
12 lines(hp_seq, pred_linear, col = "red", lwd = 2, lty = 2)
13 lines(hp_seq, pred_quad, col = "blue", lwd = 2)
14 lines(hp_seq, pred_cubic, col = "green4", lwd = 2, lty = 3)
15
16 legend("topright",
17       legend = c("Linear", "Quadratic (AIC tot nhất)",
18                 "Cubic"),
19       col = c("red", "blue", "green4"), lwd = 2, lty = c(2, 1,
20                 3))

```

Kết luận phần 1. Quan hệ giữa hp và mpg là phi tuyến. Model đa thức bậc 2 cải thiện đáng kể so với model tuyến tính ($\Delta\text{AIC} \approx 5.7$, F-test $p < 0.05$) mà không làm tăng độ phức tạp quá mức.

2.8 Tính Chất Nâng Cao

Năm kết quả lý thuyết sau giải thích tại sao tuyến tính trong tham số tạo ra sự đảm bảo mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì các công cụ chẩn đoán thực hành gợi ý.

2.8.1 Chiều Trục Giao Lên Không Gian Dự Báo

Hình ảnh thông thường của hồi quy là một mặt phẳng qua dữ liệu ba chiều. Bức tranh sâu hơn sống trong không gian n chiều. Mỗi quan sát Y là một điểm trong $\mathbb{R}^n$. Các cột của ma trận thiết kế X trương ra một không gian con thấp chiều hơn—**không gian dự báo** (column space của X). Vì mô hình tuyến tính, tìm $\hat{\beta}$ tương đương với tìm điểm trong không gian dự báo *gần nhất* với Y :


$$\hat{Y} = X(X^\top X)^{-1}X^\top Y = P_X Y$$

trong đó P_X là ma trận chiếu trục giao lên $\text{Col}(X)$.


Vector sai số $e = Y - \hat{Y}$ trục giao với mọi cột của X —đây không phải xấp xỉ, mà là hệ quả hình học chính xác của OLS. Hệ phương trình chuẩn $X^\top e = 0$ chính là phát biểu

đại số của điều kiện trực giao này. Hầu hết lý thuyết mô hình tuyến tính—from định lý Gauss-Markov đến hình học kiểm định F —đều bắt nguồn trực tiếp từ cấu trúc chiếu trực giao này.

OLS = chiếu trực giao lên $\text{Col}(X)$



Kiểm tra $X^T e = 0$ (500 dataset ngẫu nhiên)



Hình 14: Trái: Sơ đồ hình học của OLS trong $\mathbb{R}^n$. Y là điểm quan sát, $\hat{Y} = P_X Y$ là hình chiếu vuông góc lên $\text{Col}(X)$, và $e = Y - \hat{Y}$ là vector sai số vuông góc với không gian dự báo. **Phải:** Xác minh số trên 500 dataset ngẫu nhiên ($n = 40$, $p = 3$). Giá trị $\log_{10} \|X^T e\|$ luôn ở mức sai số máy tính ($\approx 10^{-12}$), xác nhận $X^T e = 0$ là đẳng thức chính xác, không phải xấp xỉ.

2.8.2 Tuyến Tính Không Luôn Được Bảo Toàn Khi Bỏ Biến

Một điểm dễ bị bỏ qua là tính tuyến tính là phát biểu về *hàm trung bình có điều kiện theo tập biến đang xét*. Vì vậy, một mô hình có thể tuyến tính hoàn hảo theo (X_1, X_2) nhưng không còn tuyến tính nếu chỉ nhìn theo X_1 .

Giả sử hàm trung bình đúng là

$$E(Y \mid X_1, X_2) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2.$$

Nếu bỏ X_2 và chỉ mô hình hóa theo X_1 , quy tắc kỳ vọng lặp cho đúng dạng phương trình omitted-variable trong Weisberg [12, Eq. 4.8, Sec. 4.2.1]:

$$E(Y \mid X_1) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 E(X_2 \mid X_1).$$

Do đó mô hình rút gọn chỉ còn tuyến tính trong X_1 khi $E(X_2 \mid X_1)$ cũng tuyến tính. Nếu biến bị loại có quan hệ cong với biến giữ lại, ví dụ $E(X_2 \mid X_1)$ là hàm bậc hai, thì $E(Y \mid X_1)$ cũng chứa thành phần bậc hai.

Một phản ví dụ cụ thể: nếu $X_2 = X_1^2 + u$ và $E(u \mid X_1) = 0$, thì $E(X_2 \mid X_1) = X_1^2$. Khi

bỏ X_2 , mô hình rút gọn trở thành

$$E(Y | X_1) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_1^2,$$

tức là phi tuyến theo biến X_1 dù mô hình đầy đủ ban đầu hoàn toàn tuyến tính theo (X_1, X_2) .

Hệ quả. Thiếu biến không chỉ gây omitted variable bias hay làm giảm R^2 ; nó còn có thể biến một quan hệ vốn tuyến tính trong không gian đầy đủ thành một quan hệ phi tuyến trong không gian biến rút gọn. Vì vậy, kiểm tra tuyến tính luôn phải gắn với tập biến cụ thể đang có trong mô hình.

2.8.3 Phân Phối Chuẩn Đa Biến Đảm Bảo Tuyến Tính

Tuyến tính thường là giả định làm việc về thế giới. Một trường hợp nó được đảm bảo trực tiếp bởi toán học là khi biến phản hồi Y và vector biến dự báo X cùng tuân theo **phân phối chuẩn đa biến** [12, Sec. 4.5.1, p. 91]. Viết

$$\begin{pmatrix} Y \\ X \end{pmatrix} \sim \mathcal{N} \left(\begin{pmatrix} \mu_y \\ \mu_x \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \Sigma_{yy} & \Sigma_{yx} \\ \Sigma_{xy} & \Sigma_{xx} \end{pmatrix} \right).$$

Khi đó kỳ vọng có điều kiện có dạng chính xác:

$$E(Y | X = x) = \mu_y + \Sigma_{yx} \Sigma_{xx}^{-1} (x - \mu_x).$$

Vì μ_y , μ_x , Σ_{yx} và Σ_{xx} đều là hằng số của phân phối, biểu thức trên là một hàm tuyến tính của x . Đây là một trong những lý do phân phối chuẩn đa biến có vị trí đặc biệt trong lý thuyết hồi quy: nó không chỉ hỗ trợ suy diễn mẫu nhỏ, mà còn tự sinh ra hàm trung bình có điều kiện tuyến tính.

Điểm này cũng cho thấy cần phân biệt hai tầng giả định. Normality của sai số trong mô hình hồi quy giúp kiểm định t và F hoạt động chính xác trong mẫu nhỏ; còn normality đa biến của (Y, X) là điều kiện mạnh hơn, đảm bảo luôn cả dạng tuyến tính của $E(Y | X)$.

2.8.4 Định Lý Li-Duan: Bền Vững Trước Phi Tuyến Ẩn

Giả sử quan hệ thực là phi tuyến nhưng có dạng chỉ số đơn:

$$E[Y | X] = g(\beta^\top x)$$

trong đó g là hàm *hoàn toàn ẩn*. Bình thường điều này dường như làm mất hiệu lực OLS hoàn toàn. **Định lý Li-Duan (1989)** [12, Sec. 8.2.1, pp. 194–195] cho thấy điều ngược lại: nếu các biến dự báo X tuân theo phân phối đối xứng elip (bao gồm phân phối chuẩn đa biến), thì OLS vẫn ước lượng β **nhất quán đến một hằng số tỷ lệ**:

$$\hat{\beta}_{\text{OLS}} \xrightarrow{p} c \cdot \beta, \quad c \neq 0$$


Nói cách khác: ngay cả khi dạng hàm thực sự bị ẩn và phi tuyến, mô hình tuyến tính khớp một cách mù quáng vẫn phục hồi đúng *hướng* và *tâm quan trọng tương đối* của các biến dự báo. Độ lớn bị chia tỷ lệ, nhưng thứ hạng và dấu của tác động được bảo toàn.

Một mở rộng sâu hơn liên quan đến điều kiện tuyến tính của các biến dự báo. Trong lý thuyết sufficient dimension reduction, điều kiện này thường được viết dưới dạng

$$E(X \mid \beta^\top X) \text{ là hàm tuyến tính của } \beta^\top X.$$

Định lý Hall–Li (1993) [12, Sec. 8.2.1, pp. 194–195] cho thấy trong nhiều cấu hình chiều cao, khi số biến dự báo p tăng lớn, điều kiện tuyến tính này có xu hướng trở thành xấp xỉ tốt với hầu hết các hướng chiều. Nói trực giác, không gian chiều cao làm nhiều hình học có điều kiện trở nên phẳng hơn khi nhìn qua các phép chiếu tuyến tính.

Cách hiểu đúng. Kết quả này không có nghĩa là cứ nhiều biến thì có thể bỏ qua kiểm tra sai dạng hàm. Nó nói rằng trong các bài toán rất nhiều biến và dưới các điều kiện phân phối phù hợp, OLS có thêm một cơ chế bền vững: dù hàm g chưa được biết rõ, hướng tác động chính vẫn có thể được phục hồi tương đối tốt. Trong dữ liệu nhỏ hoặc vừa, hoặc khi biến dự báo có cấu trúc lệch mạnh, rời rạc, phân cụm hay phụ thuộc phi tuyến rõ rệt, chẩn đoán tuyến tính vẫn cần thiết.



Hình 15: Mô phỏng định lý Li-Duan ($n = 60$, $B = 800$ lần lặp). Mô hình thực: $Y = g(\beta^\top X) + \varepsilon$ với $\beta = (3, 1)^\top$ và $X \sim \mathcal{N}(0, I)$. Mỗi điểm là hướng ước lượng $\hat{\beta}/\|\hat{\beta}\|$ từ một lần lặp. Dấu “ $\times$ ” là hướng thực $\beta/\|\beta\|$. Ba hàm g khác nhau (tuyến tính, mũ, lũy thừa có dấu) đều cho đám mây điểm tập trung tại cùng một hướng thực—OLS phục hồi đúng hướng bất kể dạng hàm.

2.8.5 Bất Biến Trước Biến Đổi Tuyến Tính Toàn Hạng

Vì dự báo $\hat{Y}$ là chiếu trực giao của Y lên $\text{Col}(X)$, và $\text{Col}(X)$ không thay đổi khi nhân X với bất kỳ ma trận toàn hạng nào, ta có:

Định lý: Với mọi ma trận toàn hạng A ($k \times k$), mô hình $Y \sim XA$ cho ra các giá trị khớp $\hat{Y}$, phần dư e , và phương sai sai số s^2 hoàn toàn giống mô hình $Y \sim X$.

Hệ quả thực tiễn: Centering, scaling, và orthogonalization là các bước tiền xử lý *an toàn*—chúng thay đổi tham số hóa nhưng không bao giờ thay đổi dự báo hay R^2 .

Giải thích đa cộng tuyến: Đa cộng tuyến làm các hệ số riêng lẻ $\hat{\beta}_j$ không ổn định (vì $\hat{\beta}$ không bất biến với biến đổi tuyến tính), nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến giá trị khớp $\hat{Y}$ hay khả năng dự báo tổng thể (vì $\hat{Y}$ bất biến).

```
1 # Xác minh: standardize X không làm thay đổi y_hat và R2
2 fit_raw <- lm(mpg ~ hp + wt + disp, data = mtcars)
3 fit_std <- lm(mpg ~ scale(hp) + scale(wt) + scale(disp), data
4             = mtcars)
5 max(abs(fitted(fit_raw) - fitted(fit_std))) # < 1e-12
6 summary(fit_raw)$r.squared - summary(fit_std)$r.squared # = 0
```

```
[1] 1.065814e-13
```

```
[1] 0
```

3 Giả Định Tính Chuẩn Của Phần Dư

3.1 Cơ Sở Lý Thuyết

Mô hình hồi quy bội ở dạng ma trận được viết là:

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}, \quad E(\mathbf{Y} | \mathbf{X}) = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}$$

Giả định chuẩn phát biểu rằng **sai số thật** tuân theo phân phối chuẩn đa biến:

$$\boldsymbol{\varepsilon} \sim \mathcal{N}_n(\mathbf{0}, \sigma^2 I)$$

Điểm quan trọng là giả định này thuộc về **sai số thật** $\boldsymbol{\varepsilon}$, không phải trực tiếp thuộc về biến phản hồi Y và cũng không phải trực tiếp thuộc về phần dư quan sát được sau khi khớp mô hình. Trong thực hành, ta không quan sát được $\boldsymbol{\varepsilon}$, nên phải dùng phần dư để chẩn đoán gián tiếp.

3.1.1 Sai Số Thật và Phần Dư Không Phải Là Một

Sai số thật ε_i là đại lượng lý thuyết, không quan sát được:

$$\varepsilon_i = y_i - E(Y_i | X_i)$$

Nó đo phần lệch giữa quan sát thực tế và giá trị kỳ vọng đúng của mô hình sinh dữ liệu.

Phần dư $\hat{e}_i$ là đại lượng tính được sau khi ước lượng mô hình:

$$\hat{e}_i = y_i - \hat{y}_i$$

Nó đo phần lệch giữa quan sát thực tế và giá trị dự đoán từ mô hình đã fit. Vì $\hat{y}_i$ phụ thuộc vào dữ liệu dùng để ước lượng $\hat{\boldsymbol{\beta}}$, phần dư không còn giữ nguyên các tính chất xác suất của sai số thật.

Hệ quả thực tiễn. Khi ta vẽ histogram hoặc Q-Q plot của phần dư, ta không kiểm tra trực tiếp $\boldsymbol{\varepsilon}$. Ta chỉ đang nhìn một phiên bản đã bị biến đổi bởi quá trình ước lượng OLS.

3.1.2 Không Bắt Buộc Đối Với Phương Pháp Bình Phương Tối Thiểu

Các hệ số $\hat{\beta}$ và phương sai s^2 có thể được tính bằng OLS mà không cần bất kỳ giả định nào về phân phối. Theo **Định lý Gauss-Markov**, chỉ cần sai số thỏa mãn các điều kiện chính:

- kỳ vọng bằng 0: $E(\varepsilon | \mathbf{X}) = \mathbf{0}$,
- phương sai không đổi: $\text{Var}(\varepsilon | \mathbf{X}) = \sigma^2 I$,
- không có tương quan giữa các sai số,

OLS đã cho các **ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất** (BLUE). Vì vậy, tính chuẩn không phải điều kiện để tính toán mô hình hay để OLS đạt tính chất BLUE.

3.1.3 Khi Thêm Giả Định Chuẩn: OLS Tương Đương MLE và Suy Diễn Chính Xác Hơn

Khi bổ sung $\varepsilon \sim \mathcal{N}_n(\mathbf{0}, \sigma^2 I)$, bài toán thay đổi theo ba hướng:

1. **Không tương quan $\Rightarrow$ độc lập.** Với phân phối chuẩn đa biến, không tương quan và độc lập là tương đương. Điều này mạnh hơn so với giả định Gauss-Markov thuần túy.
2. **OLS = MLE.** Dưới giả định chuẩn, hàm hợp lý (likelihood) của mô hình đạt cực đại tại đúng nghiệm OLS. Hai phương pháp cho cùng một ước lượng hệ số.
3. **Suy diễn mẫu nhỏ có phân phối chính xác.** Các kiểm định t , kiểm định F và khoảng tin cậy cổ điển có cơ sở phân phối rõ ràng thay vì chỉ dựa vào xấp xỉ tiệm cận.

3.1.4 Cơ Sở Bắt Buộc Cho Suy Diễn Mẫu Nhỏ

Mục đích lớn nhất của giả định chuẩn là thiết lập nền tảng toán học cho kiểm định giả thuyết và khoảng tin cậy, đặc biệt khi n nhỏ:

- Các tổng bình phương liên quan đến phần sai số tuân theo **phân phối χ^2** .
- Tỷ số giữa các tổng bình phương thích hợp tuân theo **phân phối F** : cơ sở của kiểm định F -test tổng thể.
- Từng hệ số $\hat{\beta}_j$ sau khi chuẩn hóa bằng sai số chuẩn tuân theo **phân phối t -Student**: cơ sở của kiểm định t -test và khoảng tin cậy.

Nếu không có giả định chuẩn, cả t -test lẫn F -test đều mất cơ sở phân phối chính xác khi n nhỏ. Với mẫu lớn, Định lý Giới hạn Trung tâm thường giúp $\hat{\beta}$ xấp xỉ chuẩn vì chúng là tổ hợp tuyến tính của các quan sát; giả định chuẩn lúc này ít quan trọng hơn cho suy diễn hệ số.

3.1.5 Ma Trận Mũ: Vì Sao Phần Dư Bị Biến Dạng

Giá trị khớp của OLS có thể viết dưới dạng:

$$\hat{\mathbf{y}} = H\mathbf{y}, \quad H = \mathbf{X}(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top$$

trong đó H được gọi là **ma trận mũ** (hat matrix) vì nó biến $\mathbf{y}$ thành $\hat{\mathbf{y}}$.

Vector phần dư là:

$$\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}} = (I - H)\mathbf{y} = (I - H)\boldsymbol{\varepsilon}$$

phương trình cuối đúng vì $(I - H)\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} = \mathbf{0}$.

Do đó, ngay cả khi sai số thật có ma trận hiệp phương sai $\text{Cov}(\boldsymbol{\varepsilon}) = \sigma^2 I$, phần dư lại có:

$$\text{Cov}(\hat{\mathbf{e}}) = \sigma^2(I - H)$$

Điều này dẫn đến hai hệ quả trực tiếp:

- Phương sai của phần dư thứ i là

$$\text{Var}(\hat{e}_i) = \sigma^2(1 - h_{ii}),$$

trong đó h_{ii} là leverage của quan sát thứ i . Điểm có leverage cao sẽ có phương sai phần dư nhỏ hơn.

- Các phần dư thường có tương quan với nhau vì các phần tử ngoài đường chéo của $I - H$ không nhất thiết bằng 0.

Hệ quả thực tiễn. Phần dư không phải một mẫu i.i.d. đơn giản từ phân phối của sai số thật. Những điểm leverage cao có thể có phần dư nhỏ dù chúng ảnh hưởng mạnh đến đường hồi quy, làm cho một số bất thường bị che khuất nếu chỉ nhìn phần dư thô.

3.1.6 Sự Siêu Chuẩn Của Phần Dư

Từ quan hệ $\hat{\mathbf{e}} = (I - H)\boldsymbol{\varepsilon}$, phần dư thứ i có thể viết là:

$$\hat{e}_i = \varepsilon_i - \sum_{j=1}^n h_{ij}\varepsilon_j$$

Nghĩa là mỗi phần dư không chỉ chứa sai số thật tại quan sát đó, mà còn trừ đi một tổ hợp tuyến tính của nhiều sai số khác thông qua hàng thứ i của ma trận H . Vì tổ hợp tuyến tính của nhiều biến ngẫu nhiên có thể trông gần chuẩn hơn từng biến gốc riêng lẻ, phần dư đôi khi có vẻ “chuẩn” hơn sai số thật. Hiện tượng này thường được gọi là **sự siêu chuẩn của phần dư** (Gnanadesikan, 1997).

Cần hiểu thận trọng. Đây không phải định lý nói rằng phần dư luôn chuẩn. Ý nghĩa thực tế là Q-Q plot hoặc histogram của phần dư có thể làm nhẹ bớt dấu hiệu không chuẩn của sai số thật, đặc biệt trong mẫu nhỏ đến trung bình. Vì vậy, chẩn đoán tính không chuẩn của sai số thật thông qua phần dư là một bài toán khó hơn vẻ bề ngoài.

3.1.7 Điểm Dễ Nhầm: Tính Chuẩn Của Y Không Phải Tính Chuẩn Của Sai Số

Sai lầm phổ biến. Nhiều người kiểm tra phân phối của Y thay vì kiểm tra phần sai lệch còn lại sau khi đã mô hình hóa $E(Y | X)$.

Ví dụ: $Y = 2X + \varepsilon$, với $X \sim \text{Uniform}(0, 10)$ và $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Biến Y sẽ không phân phối chuẩn, nhưng sai số thật vẫn chuẩn và phần dư từ mô hình đúng sẽ phản ánh điều đó ở mức xấp xỉ.

Quy tắc: Không yêu cầu Y chuẩn. Điều cần quan tâm là liệu phần nhiễu quanh hàm trung bình $E(Y | X)$ có phù hợp với giả định chuẩn hay không, và trong thực hành ta đánh giá điều này gián tiếp qua phần dư sau khi ước lượng mô hình.

Kết luận thực hành. Giả định chuẩn là giả định về sai số thật ε , nhưng ta chỉ quan sát được phần dư $\hat{\mathbf{e}}$. Vì phần dư bị biến đổi bởi ma trận mũ, các đồ thị như histogram và Q-Q plot nên được xem là công cụ chẩn đoán tham khảo. Khi nghi ngờ vi phạm chuẩn tác ảnh hưởng đến suy diễn, các phương pháp như sai số chuẩn vững và bootstrap thường đáng tin cậy hơn việc chỉ dựa vào một kiểm định chuẩn tắc.

3.2 Công Cụ Trực Quan

Sau khi khớp mô hình, công cụ trực quan phổ biến nhất để đánh giá giả định chuẩn là các đồ thị của phần dư. Tuy nhiên, cần nhớ lại kết quả ở phần lý thuyết:

$$\hat{\mathbf{e}} = (I - H)\boldsymbol{\varepsilon}$$

Ta muốn hiểu phân phối của sai số thật $\boldsymbol{\varepsilon}$, nhưng chỉ quan sát được phần dư $\hat{\mathbf{e}}$. Vì vậy, histogram và Q-Q plot là **công cụ chẩn đoán gián tiếp**: chúng rất hữu ích để phát hiện dấu hiệu bất thường, nhưng không phải bằng chứng tuyệt đối rằng sai số thật chuẩn hay không chuẩn.

3.2.1 Biểu Đồ Tần Suất Của Phần Dư

Histogram cho cái nhìn nhanh về hình dạng phân phối của phần dư. Các dấu hiệu thường gặp gồm:

- **Lệch phải hoặc lệch trái**: một đuôi dài hơn rõ rệt so với đuôi còn lại.
- **Đuôi nặng**: nhiều quan sát nằm xa trung tâm hơn so với phân phối chuẩn.
- **Đa đỉnh**: gợi ý dữ liệu có thể đến từ nhiều nhóm hoặc mô hình đang bỏ sót biến phân nhóm.
- **Ngoại lai**: một vài phần dư nằm rất xa phần còn lại của dữ liệu.

Điểm yếu của histogram là nó phụ thuộc mạnh vào số cột (bins), cỡ mẫu và thang đo. Với mẫu nhỏ, chỉ cần đổi số bins là hình dạng biểu đồ có thể thay đổi đáng kể. Vì vậy, histogram phù hợp như bước khảo sát ban đầu, nhưng không nên là bằng chứng chính khi kết luận về tính chuẩn.


3.2.2 Q-Q Plot: Công Cụ Chính Để Đọc Tính Chuẩn

Q-Q plot so sánh các phân vị thực nghiệm của phần dư với các phân vị lý thuyết của phân phối chuẩn. Nếu phần dư gần chuẩn, các điểm sẽ nằm gần một đường thẳng. Nếu phân phối lệch, đuôi nặng hoặc có ngoại lai, các điểm sẽ tạo thành mẫu hình có hệ thống.

Lý do Q-Q plot thường hữu ích hơn histogram là nó tập trung trực tiếp vào quan hệ giữa **thứ tự phần dư quan sát được** và **phân vị chuẩn kỳ vọng**. Đây cũng là trực giác phía sau kiểm định Shapiro-Wilk: thống kê kiểm định đo mức độ khớp tuyến

tính giữa các giá trị thứ tự quan sát được và giá trị kỳ vọng dưới chuẩn tắc. Q-Q plot chính là phiên bản trực quan của ý tưởng đó.

Mẫu hình trên Q-Q plot	Diễn giải thực hành
Các điểm gần đường thẳng	Phần dư phù hợp tương đối tốt với phân phối chuẩn
Đuôi phải lệch lên mạnh	Lệch phải; có phần dư dương lớn hơn chuẩn dự đoán
Đuôi trái lệch xuống mạnh	Lệch trái; có phần dư âm lớn hơn chuẩn dự đoán
Hai đầu lệch xa khỏi đường thẳng	Đuôi nặng; nhiều giá trị cực đoan hơn phân phối chuẩn
Hai đầu bị ép vào trong	Đuôi mỏng; ít giá trị cực đoan hơn phân phối chuẩn
Một vài điểm tách xa rõ rệt	Ngoại lai hoặc quan sát ảnh hưởng mạnh cần kiểm tra riêng



Hình 16: Bốn mẫu hình thường gặp khi đánh giá tính chuẩn của phần dư. Mỗi hàng gồm histogram và Q-Q plot cho cùng một tập phần dư mô phỏng. Q-Q plot làm nổi bật sai lệch ở đuôi rõ hơn histogram: lệch phải tạo đuôi dương cao hơn đường chuẩn, đuôi nặng làm hai đầu tách xa, và ngoại lai xuất hiện như một vài điểm rời khỏi mẫu hình chung.

3.2.3 Đọc Đồ Thị Cùng Leverage và Ngoại Lai

Một giới hạn quan trọng của đồ thị phần dư thô là phương sai của phần dư không hằng số:

$$\text{Var}(\hat{e}_i) = \sigma^2(1 - h_{ii})$$

trong đó h_{ii} là leverage của quan sát thứ i . Khi h_{ii} lớn, phương sai của phần dư nhỏ lại; điểm leverage cao có thể bị kéo về gần 0 trên đồ thị phần dư dù nó ảnh hưởng mạnh đến đường hồi quy.

Đây là **hiệu ứng che lấp**: histogram hoặc Q-Q plot của raw residuals có thể trông tương đối bình thường trong khi một vài quan sát leverage cao đang chi phối mô hình. Vì vậy, khi mục tiêu là chẩn đoán, nên xem thêm phần dư Student hóa ngoài:

```
1 fit <- lm(y ~ x1 + x2, data = dat)
2 res_student <- rstudent(fit)
3 qqnorm(res_student); qqline(res_student, col = "red", lwd = 2)
```

Phần dư Student hóa điều chỉnh theo leverage và sai số chuẩn ước lượng, nên phù hợp hơn raw residuals khi tìm ngoại lai hoặc quan sát bất thường.

3.2.4 Kết Luận Thực Hành

Cách đọc hợp lý. Dùng histogram để khảo sát nhanh hình dạng tổng quát, dùng Q-Q plot làm công cụ chính để đọc lệch chuẩn và đuôi phân phối. Nhưng mọi đồ thị phần dư đều là chẩn đoán gián tiếp vì ta không quan sát được sai số thật. Với mẫu nhỏ, dấu hiệu không chuẩn có thể khó phát hiện chắc chắn; với mẫu lớn, một chút lệch nhẹ ở hai đuôi không nhất thiết làm hỏng suy diễn hệ số. Nếu kết luận thống kê nhạy với giả định chuẩn, nên kiểm tra thêm sai số chuẩn vững hoặc bootstrap.

3.3 Kiểm Định Hình Thức

Kiểm định chuẩn tắc cung cấp một con số định lượng cho câu hỏi: phần dư có lệch khỏi phân phối chuẩn nhiều đến mức đáng chú ý hay không? Tuy nhiên, kiểm định không thay thế histogram và Q-Q plot. Một kiểm định có thể cho p -value rất nhỏ vì cỡ mẫu quá lớn, hoặc không phát hiện được vi phạm rõ ràng vì cỡ mẫu quá nhỏ.

Do đó, các kiểm định dưới đây nên được đọc như **bằng chứng bổ sung** cho chẩn đoán trực quan, không phải như một nút quyết định tự động.

3.3.1 Shapiro-Wilk Test

Shapiro-Wilk là kiểm định chuẩn tắc phổ biến cho mẫu nhỏ đến vừa. Giả thuyết kiểm định là:

H_0 : phần dư phù hợp với phân phối chuẩn,

H_1 : phần dư không phù hợp với phân phối chuẩn.

Thống kê $W \in [0, 1]$; W càng gần 1 thì phần dư càng gần mẫu hình chuẩn. Trực giác của kiểm định này rất gần với Q-Q plot: nó đo mức độ khớp tuyến tính giữa các giá trị phần dư đã sắp thứ tự và các phân vị kỳ vọng dưới phân phối chuẩn. Vì vậy, nếu Q-Q plot gần đường thẳng, W thường gần 1 và p -value thường lớn.

Khi dùng. Shapiro-Wilk hữu ích khi n nhỏ hoặc vừa, vì nó có khả năng phát hiện nhiều dạng lệch chuẩn tổng quát: lệch, đuôi nặng, đuôi mỏng, hoặc ngoại lai.

Giới hạn. Với mẫu lớn, kiểm định có thể bác bỏ H_0 vì những sai lệch rất nhỏ không quan trọng về mặt thực hành. Ngược lại, với mẫu quá nhỏ, kiểm định có thể thiếu power và không bác bỏ H_0 dù sai số thật không chuẩn. Vì vậy, p -value lớn không chứng minh rằng sai số thật chuẩn; nó chỉ nói rằng dữ liệu hiện tại chưa cung cấp đủ bằng chứng chống lại chuẩn tắc.

```
1 fit <- lm(y ~ x1 + x2, data = dat)
2 shapiro.test(residuals(fit))
```

3.3.2 Jarque-Bera Test

Jarque-Bera là kiểm định phổ biến trong kinh tế lượng, đặc biệt khi cỡ mẫu lớn. Kiểm định này không so sánh toàn bộ hình dạng phân phối như Shapiro-Wilk, mà tập trung vào hai moment đặc trưng của phân phối chuẩn:

- skewness bằng 0: phân phối đối xứng,
- excess kurtosis bằng 0: độ dày đuôi giống phân phối chuẩn.

Thống kê kiểm định là:

$$JB = \frac{n}{6} \left(S^2 + \frac{K^2}{4} \right) \sim \chi^2(2) \quad \text{dưới } H_0,$$

trong đó S là skewness mẫu và $K = \text{kurtosis} - 3$ là excess kurtosis.

Khi dùng. Jarque-Bera phù hợp hơn khi n đủ lớn để ước lượng skewness và kurtosis ổn định. Ưu điểm của nó là giúp chỉ ra nguồn vi phạm: nếu S^2 lớn, vấn đề chính là lệch phân phối; nếu K^2 lớn, vấn đề chính là đuôi nặng hoặc đuôi mỏng.

Giới hạn. Vì chỉ dựa trên moment bậc 3 và bậc 4, Jarque-Bera có thể bỏ sót những dạng lệch chuẩn không thể hiện rõ qua skewness hoặc kurtosis. Với mẫu nhỏ, ước lượng moment bậc cao thường không ổn định, nên kết quả dễ dao động.

```
1 library(tseries)
2 jarque.bera.test(residuals(fit))
```

3.3.3 Sự Khác Biệt Bản Chất Giữa Hai Kiểm Định

Hai kiểm định xuất phát từ hai triết lý khác nhau.

Shapiro-Wilk dựa trên tương quan thứ tự. Kiểm định này hỏi: các phân vị thực nghiệm của phần dư có xếp gần thành một đường thẳng khi so với phân vị chuẩn lý thuyết hay không? Vì vậy, nó là phiên bản định lượng của Q-Q plot và có tính tổng quát cao, nhưng không nói rõ nguồn vi phạm đến từ lệch hay đuôi.

Jarque-Bera dựa trên moment. Kiểm định này hỏi: phân phối phần dư có skewness và excess kurtosis giống phân phối chuẩn hay không? Vì vậy, nó ít tổng quát hơn nhưng diễn giải nguồn vi phạm rõ hơn.

Tiêu chí	Shapiro-Wilk	Jarque-Bera
Trực giác	Độ thẳng của Q-Q plot	Skewness và kurtosis
Cỡ mẫu phù hợp	Nhỏ đến vừa	Lớn
Loại sai lệch phát hiện	Tổng quát	Lệch và đuôi bất thường
Diễn giải nguồn vi phạm	Khó hơn	Rõ hơn qua S và K
R package	Base R	tseries
Vai trò chính	Chẩn đoán tổng thể	Chẩn đoán moment

3.3.4 Đọc p-value Theo Cỡ Mẫu và Mục Tiêu Suy Diễn

Sai lầm phổ biến là xem $p < 0.05$ như bằng chứng rằng mô hình hồi quy “hỏng”. Cách đọc đúng thận trọng hơn:

- **p -value nhỏ không làm OLS vô dụng.** OLS không cần giả định chuẩn để tính $\hat{\beta}$ hoặc để đạt tính chất BLUE dưới các điều kiện Gauss-Markov. Vấn đề chính nằm ở suy diễn mẫu nhỏ: kiểm định t , kiểm định F và khoảng tin cậy cổ điển.
- **p -value lớn không chứng minh chuẩn tắc.** Nó chỉ nói rằng kiểm định chưa tìm thấy bằng chứng đủ mạnh để bác bỏ H_0 . Với mẫu nhỏ, kiểm định có thể thiếu power.
- **Mẫu lớn dễ bác bỏ những sai lệch nhỏ.** Khi n lớn, kiểm định có thể phát hiện những khác biệt rất nhỏ so với chuẩn lý thuyết, dù khác biệt đó không làm thay đổi kết luận thực hành.

- **Mục tiêu phân tích quyết định mức nghiêm trọng.** Nếu chỉ cần ước lượng xu hướng trung bình hoặc dự báo, lệch nhẹ khỏi chuẩn có thể không đáng lo. Nếu cần suy diễn mẫu nhỏ chính xác, tính chuẩn quan trọng hơn nhiều.

Khuyến nghị. Luôn đọc kiểm định chuẩn tắc cùng Q-Q plot, histogram, cỡ mẫu và mục tiêu suy diễn. Nếu Q-Q plot chỉ lệch nhẹ ở mẫu lớn, không nên vội kết luận mô hình thất bại. Nếu mẫu nhỏ và kết luận phụ thuộc mạnh vào p -value hoặc khoảng tin cậy, nên cân nhắc sai số chuẩn vững, bootstrap hoặc mô hình phân phối phù hợp hơn.

3.4 Hậu Quả Khi Vi Phạm

Vi phạm giả định chuẩn không đồng nghĩa với việc mô hình hồi quy trở nên vô dụng. Nếu các điều kiện Gauss-Markov chính vẫn hợp lý, đặc biệt là $E(\boldsymbol{\varepsilon} \mid \mathbf{X}) = \mathbf{0}$ và phương sai sai số được mô hình hóa đúng, OLS vẫn là ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất (BLUE). Normality không phải điều kiện để tính $\hat{\boldsymbol{\beta}}$.

Vấn đề chính của nonnormality nằm ở **suy diễn thống kê**: p -value, khoảng tin cậy, khoảng dự báo và mức độ ổn định của kết luận, nhất là khi cỡ mẫu nhỏ hoặc khi phân phối có đuôi nặng.

3.4.1 Suy Diễn Mẫu Nhỏ Mất Phân Phối Chính Xác

Khi sai số thật chuẩn, các ước lượng hệ số có phân phối chuẩn kết hợp, các tổng bình phương liên quan đến sai số có phân phối χ^2 , và từ đó các thống kê t và F có phân phối chính xác như lý thuyết cổ điển. Đây là cơ sở của kiểm định hệ số, kiểm định tổng thể và khoảng tin cậy trong mẫu nhỏ.

Khi n nhỏ và sai số không chuẩn, chuỗi lập luận này bị đứt:

- thống kê t có thể không còn theo phân phối t -Student chính xác,
- thống kê F có thể không còn theo phân phối F chính xác,
- khoảng tin cậy dạng $\hat{\beta}_j \pm t^* \text{SE}(\hat{\beta}_j)$ có thể có độ phủ thực tế khác mức danh nghĩa,
- các suy diễn liên quan đến phương sai σ^2 mất cơ sở χ^2 chính xác (xem Mục 3.1.4).

Hệ quả thực hành. Với mẫu nhỏ, một Q-Q plot lệch mạnh hoặc kiểm định chuẩn tắc bác bỏ rõ ràng là tín hiệu cần thận trọng: kết luận dựa trên p -value cổ điển có thể quá lạc quan hoặc quá bảo thủ.

3.4.2 Đuôi Nặng và Ngoại Lai Làm Suy Diễn Kém Ổn Định

OLS tối thiểu hóa tổng bình phương phần dư:

$$\sum_{i=1}^n \hat{e}_i^2$$

Do phần dư bị bình phương, các quan sát nằm xa trung tâm được gán trọng số rất lớn trong hàm mục tiêu. Vì vậy, phân phối đuôi nặng hoặc một vài ngoại lai có thể ảnh hưởng mạnh đến đường hồi quy, sai số chuẩn và kết luận suy diễn.

Một quan sát cực đoan có thể:

- kéo lệch hệ số β ,
- làm phình to sai số chuẩn,
- thay đổi đáng kể p -value và khoảng tin cậy,
- làm mô hình trông kém chính xác hơn hoặc chính xác hơn một cách giả tạo.

Ví dụ kinh điển với dữ liệu Forbes cho thấy chỉ một quan sát ngoại lai có thể làm sai số chuẩn của hệ số thay đổi nhiều lần; khi loại bỏ case ngoại lai, sai số chuẩn giảm mạnh và phương sai ước lượng cũng giảm đáng kể. Thông điệp không phải là tùy tiện xóa điểm dữ liệu, mà là: **không nên tin một phân tích nếu kết luận phụ thuộc quá nặng vào một quan sát đơn lẻ.**

Trong thực hành, Q-Q plot có đuôi tách xa hoặc vài điểm cực đoan nên được xem cùng các chẩn đoán ảnh hưởng như leverage, phần dư Student hóa và Cook's distance:

```
1 rstudent(fit)      # phan du Student hoa ngoai
2 hatvalues(fit)     # leverage h_ii
3 cooks.distance(fit)
```

3.4.3 Không Chuẩn Có Thể Là Triệu Chứng Của Sai Mô Hình

Nonnormality không phải lúc nào cũng là vấn đề phân phối thuần túy. Nhiều khi nó là dấu hiệu cho thấy mô hình trung bình hoặc cấu trúc dữ liệu đang bị chỉ định sai.

Các nguyên nhân thường gặp gồm:

- **Sai dạng hàm trung bình:** thiếu số hạng bậc hai, tương tác, spline hoặc biến đổi log làm phần dư giữ lại mẫu hình có hệ thống.

- **Thiếu biến quan trọng:** phần dư trộn nhiều nhóm chưa được mô hình hóa, tạo lệch hoặc đa đỉnh.
- **Phương sai không đồng nhất:** độ phân tán tăng/giảm theo $\hat{y}$ hoặc theo một biến dự báo, làm phần dư có đuôi dày giả tạo.
- **Sai bản chất biến phản hồi:** dữ liệu đếm, nhị phân, tỷ lệ hoặc dữ liệu dương lệch mạnh thường không phù hợp với OLS trên thang gốc.

Với dữ liệu đếm hoặc nhị phân, vấn đề không chỉ là sai normality. Phương sai thường phụ thuộc vào kỳ vọng, nên giả định phương sai hằng số cũng bị vi phạm. Khi đó, mô hình tuyến tính tổng quát (GLM) như hồi quy Poisson hoặc logistic hợp lý hơn vì mô hình hóa đúng phân phối và hàm liên kết của phản hồi.

3.4.4 Mẫu Lớn Giảm Rủi Ro Nhưng Không Xóa Mọi Vấn Đề

Khi n đủ lớn, Định lý Giới hạn Trung tâm thường giúp $\hat{\beta}$ xấp xỉ chuẩn ngay cả khi sai số thật không chuẩn. Vì vậy, một kiểm định chuẩn tắc bị bác bỏ trong mẫu lớn không tự động làm suy diễn OLS thất bại.

Tuy nhiên, mẫu lớn không giải quyết mọi vấn đề:

- Nếu phương sai sai số không đồng nhất, ma trận hiệp phương sai cổ điển của $\hat{\beta}$ có thể bị tính sai; cần sai số chuẩn vững kiểu sandwich/HC.
- Nếu có điểm leverage cao hoặc quan sát ảnh hưởng mạnh, hệ số có thể bị kéo lệch dù n lớn.
- Nếu dạng hàm trung bình sai, tăng cỡ mẫu chỉ giúp ta ước lượng chính xác hơn một mô hình sai.

Hệ quả thực hành. Với mẫu lớn, hãy phân biệt giữa *ý nghĩa thống kê* và *ý nghĩa thực tế*. Một lệch nhẹ khỏi chuẩn có thể tạo p -value rất nhỏ trong kiểm định normality, nhưng điều quan trọng hơn là liệu kết luận hệ số, dự báo và khoảng tin cậy có nhạy với lệch đó hay không.

3.4.5 Bảng Tổng Hợp Cách Phản Ứng

Tình huống	Hậu quả chính	Phản ứng hợp lý
Mẫu nhỏ, Q-Q plot lệch mạnh	t -test, F -test và CI cổ điển mất cơ sở chính xác	Dùng bootstrap; báo cáo thận trọng
Mẫu lớn, lệch nhẹ ở đuôi	Kiểm định normality dễ reject dù tác động thực tế nhỏ	Giữ OLS nếu chẩn đoán khác ổn; kiểm tra độ nhạy
Đuôi nặng hoặc ngoại lai	Hệ số, SE và p -value có thể phụ thuộc vào vài điểm	Kiểm tra t -student, leverage, Cook's distance; cân nhắc robust regression
Lệch kèm mẫu hình phần dư	Có thể sai dạng hàm hoặc thiếu biến	Sửa mean function: biến đổi, đa thức, spline, tương tác
Đếm, nhị phân, tỷ lệ	OLS sai cả phân phối lẫn phương sai	Chuyển sang GLM như Poisson hoặc logistic
Phương sai không đồng nhất	SE cổ điển sai dù hệ số có thể vẫn hữu ích	Dùng HC3/sandwich SE hoặc mô hình hóa phương sai

Kết luận cốt lõi. Không chuẩn không tự động làm hỏng OLS. Nó chủ yếu làm ta nghi ngờ suy diễn cổ điển và buộc ta tìm nguyên nhân của sai lệch. Nếu chỉ cởi bỏ giả định chuẩn, OLS vẫn có thể là BLUE dưới Gauss-Markov; điều cần thay đổi là cách đo độ bất định, chẳng hạn dùng bootstrap, sai số chuẩn vững hoặc một mô hình phân phối phù hợp hơn.

3.5 Giải Pháp Thay Thế

Không có một cách sửa chung cho mọi vi phạm chuẩn tắc. Cách xử lý phụ thuộc vào nguyên nhân: mẫu nhỏ, phương sai không đồng nhất, đuôi nặng, ngoại lai, sai dạng hàm trung bình, hoặc biến phản hồi không phù hợp với mô hình Gaussian.

Nguyên tắc thực hành là: **nếu mean function hợp lý nhưng suy diễn không đáng tin, sửa cách đo độ bất định; nếu bản chất mô hình sai, đổi mô hình.**

3.5.1 Bản Đồ Chọn Phương Pháp

Tình huống	Mục tiêu	Phương pháp ưu tiên
OLS ổn, SE nghi ngờ	Giữ hệ số, sửa suy diễn	HC3/sandwich robust SE
Mẫu nhỏ, không chuẩn	CI/test không dựa vào normality	Bootstrap
Phản hồi dương, lệch phải	Làm ổn định phương sai và giảm lệch	Log, căn bậc hai, Box-Cox
Đuôi nặng, outlier chi phối	Giảm ảnh hưởng điểm cực đoan	Robust regression; phân tích độ nhạy
Count/binary/rate	Mô hình hóa đúng phân phối phản hồi	GLM: Poisson, logistic, binomial
Trung bình không đại diện tốt	Ước lượng median hoặc quantile	Quantile regression

3.5.2 Sai Số Chuẩn Vững HC3 / Sandwich

Nếu dạng hàm trung bình có vẻ hợp lý nhưng phần dư cho thấy phương sai không đồng nhất hoặc suy diễn cổ điển không đáng tin, không nhất thiết phải bỏ OLS. Có thể giữ nguyên hệ số β và thay cách ước lượng ma trận hiệp phương sai.

Sai số chuẩn vững kiểu sandwich, đặc biệt HC3, điều chỉnh sai số chuẩn bằng cách dùng phần dư và leverage của từng quan sát. Ý tưởng thực hành là:

- hệ số OLS giữ nguyên,
- sai số chuẩn được tính lại,
- p -value và khoảng tin cậy được cập nhật theo sai số chuẩn mới.

HC3 thường được khuyến nghị khi mẫu không quá lớn vì nó phạt mạnh các quan sát leverage cao hơn các phiên bản HC đơn giản.

```
1 library(sandwich)
2 library(lmtest)
3
4 fit <- lm(y ~ x1 + x2, data = dat)
5 coeftest(fit, vcov = vcovHC(fit, type = "HC3"))
```

Khi dùng. HC3 phù hợp khi mục tiêu chính là suy diễn hệ số trong mô hình tuyến tính đã chọn, nhưng nghi ngờ SE cổ điển bị sai do heteroskedasticity hoặc leverage.

Giới hạn. HC3 không sửa sai dạng hàm trung bình, không loại bỏ ảnh hưởng ngoại lai lên hệ số, và không biến OLS thành mô hình phù hợp cho dữ liệu đếm hoặc nhị phân.

3.5.3 Bootstrap

Bootstrap thay phân phối lý thuyết bằng phân phối thực nghiệm thu được từ lấy mẫu lại. Thay vì giả định $\hat{\beta}_j$ có phân phối t chính xác, ta mô phỏng nhiều lần quá trình ước lượng để xem hệ số biến động như thế nào.

Có hai cách thường dùng:

- **Case bootstrap:** lấy mẫu có hoàn lại các cặp (X_i, Y_i) . Phù hợp khi muốn ít giả định hơn về cấu trúc sai số.
- **Residual bootstrap:** lấy mẫu có hoàn lại từ phần dư, rồi cộng lại vào giá trị khớp. Phù hợp hơn khi tin rằng mean function đã đúng và sai số có cấu trúc tương đối đồng nhất.

```
1 library(boot)
2
3 boot_fn <- function(data, indices) {
4   coef(lm(y ~ x1 + x2, data = data[indices, ]))
5 }
6
7 set.seed(123)
8 boot_out <- boot(dat, boot_fn, R = 2000)
9 boot.ci(boot_out, type = c("perc", "bca"), index = 2)
```

Khi dùng. Bootstrap đặc biệt hữu ích với mẫu nhỏ hoặc vừa, khi Q-Q plot và kiểm định cho thấy normality đáng nghi, nhưng vẫn muốn báo cáo CI/test cho hệ số.

Giới hạn. Bootstrap không cứu được dữ liệu xấu hoặc mô hình sai nặng. Nếu mẫu gốc không đại diện, có outlier chi phối, hoặc mean function sai, bootstrap sẽ mô phỏng lại chính các vấn đề đó.

3.5.4 Biến Đổi Biến Phản Hồi

Khi biến phản hồi dương và lệch phải mạnh, hoặc khi phương sai tăng theo trung bình, biến đổi Y có thể làm phân phối phần dư gần chuẩn hơn và phương sai ổn định hơn.

Các lựa chọn phổ biến:

Tình huống	Biến đổi	Ghi chú
Dữ liệu dương, trải rộng nhiều bậc	$\log(Y)$	Diễn giải theo phần trăm thay đổi
Dữ liệu đếm vừa phải	$\sqrt{Y}$	Làm dịu lệch phải và phương sai tăng
Không rõ biến đổi	Box-Cox	Tìm λ bằng likelihood

Box-Cox định nghĩa họ biến đổi:

$$y^{(\lambda)} = \begin{cases} (y^\lambda - 1)/\lambda, & \lambda \neq 0, \\ \log(y), & \lambda = 0. \end{cases}$$

```
1 library(MASS)
2 boxcox(fit)
3 fit_log <- lm(log(y) ~ x1 + x2, data = dat)
```

Khi dùng. Biến đổi phù hợp khi vấn đề xuất phát từ thang đo của phản hồi: lệch phải, phương sai tăng theo mean, hoặc quan hệ nhân tính.

Giới hạn. Sau biến đổi, mô hình đang giải thích $E[\log(Y) | X]$ hoặc $E[Y^{(\lambda)} | X]$, không còn trực tiếp là $E[Y | X]$. Khi diễn giải hoặc dự báo ngược về thang gốc, cần cẩn thận với bias do biến đổi ngược.

3.5.5 Mô Hình Tuyến Tính Tổng Quát (GLM)

Nếu biến phản hồi có bản chất không Gaussian, việc cố sửa normality bằng biến đổi hoặc robust SE thường chỉ là vá triệu chứng. Với dữ liệu nhị phân, đếm hoặc tỷ lệ, cần mô hình hóa đúng quan hệ giữa kỳ vọng và phương sai.

GLM thay giả định $Y \sim \mathcal{N}$ bằng một họ phân phối phù hợp hơn và dùng hàm liên kết:

$$g(E[Y | X]) = X\beta$$

Kiểu phản hồi	Mô hình	R
Nhị phân 0/1	Logistic regression	<code>glm(..., family = binomial)</code>
Số đếm	Poisson regression	<code>glm(..., family = poisson)</code>
Tỷ lệ / số thành công	Binomial GLM	<code>glm(cbind(success, fail) ..., binomial)</code>

Khi dùng. GLM là lựa chọn đúng khi OLS tạo dự báo ngoài miền hợp lệ, ví dụ xác suất nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 1, hoặc khi phương sai phản hồi phụ thuộc rõ vào trung

bình.

3.5.6 Robust Regression

Khi Q-Q plot cho thấy đuôi nặng hoặc một vài quan sát cực đoan chi phối kết quả, robust regression là một lựa chọn thực hành để giảm ảnh hưởng của outlier mà không xóa điểm một cách tùy tiện.

Khác với OLS, vốn phạt phần dư theo bình phương, nhiều phương pháp robust dùng hàm mất mát tăng chậm hơn ở đuôi. Nhờ vậy, một quan sát rất xa không còn đủ sức kéo toàn bộ đường fit như trong OLS.

```
1 library(MASS)
2 fit_robust <- rlm(y ~ x1 + x2, data = dat)
3 summary(fit_robust)
```

Khi dùng. Robust regression phù hợp khi kết luận OLS thay đổi mạnh sau khi kiểm tra Cook's distance, leverage hoặc phần dư Student hóa.

Giới hạn. Đây không phải lý do để bỏ qua việc hiểu outlier. Trước khi dùng robust regression, cần kiểm tra liệu điểm bất thường là lỗi dữ liệu, quan sát hợp lệ hiếm gặp, hay dấu hiệu mô hình thiếu biến.

3.5.7 Quantile Regression

Quantile regression là lựa chọn bổ sung khi trung bình không đại diện tốt cho phân phối có lệch mạnh hoặc đuôi nặng. Thay vì mô hình hóa kỳ vọng có điều kiện $E[Y | X]$, nó mô hình hóa median hoặc các phân vị khác của $Y | X$.

Với median regression, mục tiêu gần với việc tối thiểu hóa tổng trị tuyệt đối phần dư thay vì tổng bình phương phần dư. Vì vậy, median ít bị kéo bởi các điểm cực đoan hơn mean.

```
1 library(quantreg)
2 fit_med <- rq(y ~ x1 + x2, tau = 0.5, data = dat)
3 summary(fit_med)
```

Khi dùng. Dùng khi câu hỏi nghiên cứu quan tâm median hoặc phân vị, ví dụ tác động của X lên nhóm giá trị thấp/cao, hoặc khi mean bị chi phối bởi đuôi phân phối.

Giới hạn. Quantile regression trả lời một câu hỏi khác OLS. Không nên dùng nó chỉ để “sửa” OLS nếu mục tiêu thật sự vẫn là kỳ vọng trung bình.

Quy tắc chọn nhanh. Nếu mean function ổn nhưng SE đáng nghi, dùng HC3 hoặc bootstrap. Nếu phản hồi dương và lệch mạnh, cân nhắc biến đổi. Nếu dữ liệu là count/binary/rate, chuyển sang GLM. Nếu một vài điểm cực đoan chi phối kết luận, kiểm tra ảnh hưởng và làm phân tích robust/sensitivity. Nếu trung bình không còn là đại lượng đại diện tốt, cân nhắc quantile regression.

3.6 Ví Dụ R: Dataset Boston

Bài toán. Dự báo giá trị nhà trung vị (medv) từ tỷ lệ dân cư thu nhập thấp (lstat) và số phòng trung bình (rm):


$$\text{medv} = \beta_0 + \beta_1 \text{lstat} + \beta_2 \text{rm} + \varepsilon.$$

Mục tiêu của ví dụ này không chỉ là kiểm tra xem phần dư có chuẩn hay không. Với $n = 506$, các kiểm định chuẩn tắc rất dễ bác bỏ H_0 . Câu hỏi thực hành quan trọng hơn là: **kết luận về hệ số có ổn định khi thay suy diễn OLS cổ điển bằng HC3 và bootstrap hay không?**

Bước 1: Fit mô hình và vẽ chẩn đoán

```
1 library(MASS)
2 data(Boston)
3
4 model_boston <- lm(medv ~ lstat + rm, data = Boston)
5 resid_raw    <- residuals(model_boston)
6 resid_stud   <- rstudent(model_boston)
```

Boston housing: chẩn đoán chuẩn tắc của phần dư



Hình 17: Chẩn đoán chuẩn tắc cho mô hình $\text{medv} \sim \text{lstat} + \text{rm}$. Hàng trên dùng raw residuals; hàng dưới dùng phần dư Student hóa ngoài. Cả hai Q-Q plot đều cho thấy đuôi phải lệch mạnh khỏi đường chuẩn, tức có một số giá trị nhà được dự báo thấp hơn thực tế khá nhiều.

Quan sát. Histogram và Q-Q plot đều cho thấy phần dư lệch phải và có đuôi dày. Phần dư Student hóa làm tín hiệu ở đuôi rõ hơn vì đã điều chỉnh phương sai phần dư theo leverage.

Bước 2: Kiểm định hình thức

```
1 shapiro.test(resid_raw)
2
3 # Jarque-Bera tính thu công: skewness + excess kurtosis
4 n <- length(resid_raw)
5 z <- resid_raw - mean(resid_raw)
6 m2 <- mean(z^2)
7 S <- mean(z^3) / m2^(3/2)
8 K <- mean(z^4) / m2^2 - 3
```

```

9 JB <- n / 6 * (S^2 + K^2 / 4)
10 pchisq(JB, df = 2, lower.tail = FALSE)

```

```

Shapiro-Wilk: W = 0.9098, p-value < 2.2e-16
Jarque-Bera : JB = 457.6899, p-value = 4.11e-100
Skewness    : S = 1.3432
Excess kurt.: K = 3.8068

```

Cả hai kiểm định đều bác bỏ chuẩn tắc rất mạnh. Với $n = 506$, điều này không bất ngờ: kiểm định có power lớn và phát hiện được cả những sai lệch nhỏ. Ở đây sai lệch không chỉ nhỏ; Q-Q plot cho thấy đuôi phải rõ ràng. Vì vậy, ta chuyển sang kiểm tra độ nhạy của suy diễn hệ số.

Bước 3: OLS SE, HC3 SE và Bootstrap CI

Đoạn code sau tính HC3 thủ công để không phụ thuộc vào package ngoài. Ý tưởng là giữ nguyên hệ số OLS, nhưng thay ma trận hiệp phương sai cổ điển bằng sandwich estimator có hiệu chỉnh leverage.

```

1 X      <- model.matrix(model_boston)
2 e      <- residuals(model_boston)
3 h      <- hatvalues(model_boston)
4 XtX_inv <- solve(t(X) %*% X)
5
6 meat <- t(X) %*% diag(as.numeric(e^2 / (1 - h)^2)) %*% X
7 V_hc3 <- XtX_inv %*% meat %*% XtX_inv
8 se_hc3 <- sqrt(diag(V_hc3))
9
10 # Case bootstrap cho hệ số
11 library(boot)
12 boot_fn <- function(data, indices) {
13   coef(lm(medv ~ lstat + rm, data = data[indices, ]))
14 }
15 set.seed(123)
16 boot_out <- boot(Boston, boot_fn, R = 2000)

```

Biến	Estimate	OLS SE	HC3 SE	Tỷ lệ	OLS 95% CI	Bootstrap 95% CI
lstat	-0.6424	0.0437	0.0654	1.50	[-0.7283, -0.5564]	[-0.7628, -0.5152]
rm	5.0948	0.4445	0.7939	1.79	[4.2216, 5.9680]	[3.5423, 6.5887]

Diễn giải. HC3 SE lớn hơn OLS SE khá rõ: khoảng 1.5 lần cho lstat và 1.79 lần cho

rm. Bootstrap CI cũng rộng hơn OLS CI và khá gần với suy diễn robust. Tuy vậy, dấu và độ lớn thực hành của hai hệ số vẫn ổn định: `lstat` có quan hệ âm với `medv`, còn `rm` có quan hệ dương.

Bước 4: Kiểm tra ảnh hưởng

```
1 max(abs(rstudent(model_boston)))
2 max(cooks.distance(model_boston))
3 max(hatvalues(model_boston))
```

```
max |rstudent| = 5.2869
max Cook's D   = 0.2566
max leverage   = 0.0633
```

Có phần dư Student hóa rất lớn, nên đuôi phải trên Q-Q plot không chỉ là chi tiết hình thức. Tuy nhiên, leverage lớn nhất không quá cao trong mô hình hai biến này. Workflow hợp lý là báo cáo suy diễn robust/bootstráp và, nếu đây là phân tích chính thức, kiểm tra thêm các quan sát có Cook's distance lớn hoặc cân nhắc biến đổi/mô hình linh hoạt hơn.

Kết Luận Ví Dụ

Bài học từ Boston. Kiểm định chuẩn tắc bác bỏ rất mạnh, nhưng kết luận không phải là “vứt mô hình OLS”. Với $n = 506$, cần nhìn vào độ nhạy của suy diễn: HC3 và bootstrap làm khoảng tin cậy rộng hơn đáng kể, nhưng không đổi kết luận định tính về `lstat` và `rm`. Vì vậy, báo cáo tốt hơn là: mô hình OLS cho xu hướng rõ ràng, nhưng suy diễn nên dùng robust SE hoặc bootstrap CI thay vì chỉ dựa vào SE cổ điển.

4 Giả Định Đồng Nhất Phương Sai

4.1 Khái niệm và Hệ quả

Giả định đồng nhất phương sai [2] yêu cầu phương sai điều kiện của sai số ngẫu nhiên phải là một hằng số không đổi: $\text{Var}(\varepsilon_i | \mathbf{x}_i) = \sigma^2$. Khi vi phạm, công thức sai số chuẩn $SE = \hat{\sigma}^2(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1}$ sai lệch so với thực tế, dẫn đến suy diễn thống kê (p-value, khoảng tin cậy) hoàn toàn vô giá trị.

4.2 Kiểm định Breusch–Pagan (1979)

Khi nào cần dùng: Khi ta có cơ sở nghi ngờ rằng phương sai của sai số thay đổi (lớn dần hoặc nhỏ dần) theo *hàm tuyến tính* của một hoặc nhiều biến độc lập.

Cơ sở lý thuyết & Chứng minh: Breusch và Pagan [1] xây dựng kiểm định này dựa trên nguyên lý *Nhân tử Lagrange (Lagrange Multiplier - LM)* trong phương pháp Ước lượng Hợp lý Cực đại (MLE). Giả sử phương sai tuân theo hàm $\sigma_i^2 = h(\gamma_0 + \mathbf{z}_i^\top \boldsymbol{\gamma})$. Đạo hàm của hàm log-likelihood (hàm Score) được đánh giá tại $\boldsymbol{\gamma} = \mathbf{0}$. Nếu đạo hàm này khác không một cách có ý nghĩa thống kê, ta có cơ sở bác bỏ tính đồng nhất.

Thiết lập giả thuyết:

- $H_0 : \gamma_1 = \gamma_2 = \dots = \gamma_k = 0$ (Phương sai là hằng số / Đồng nhất phương sai).
- H_1 : Có ít nhất một $\gamma_j \neq 0$ (Phương sai thay đổi).

Quy trình và Công thức:

1. Chạy mô hình OLS gốc, lưu bình phương phần dư: $\hat{\varepsilon}_i^2$.
2. Chạy hồi quy phụ: $\hat{\varepsilon}_i^2 = \gamma_0 + \gamma_1 X_{i1} + \dots + \gamma_k X_{ik} + v_i$.
3. Tính thống kê kiểm định: $LM = \frac{1}{2}ESS \sim \chi^2(k)$.

Làm sao để thỏa & Tối ưu hóa: Để thỏa mãn giả định OLS, ta cần chấp nhận H_0 (tức là p -value $> \alpha$, thường $\alpha = 0.05$). Tuy nhiên, phiên bản gốc của B-P rất nhạy cảm với giả định sai số phân phối chuẩn. Để tối ưu, Koenker (1981) [7] đã đề xuất **Kiểm định B-P dạng Studentized**, tính toán qua $LM = n \times R_{\text{aux}}^2$. Dạng tối ưu này vững (robust) hơn khi sai số có đuôi phân phối dày và được các phần mềm như R (hàm `bptest`) sử dụng làm mặc định.

4.3 Kiểm định White (1980)

Khi nào cần dùng: Khi người nghiên cứu *không biết trước dạng cấu trúc* của phương sai thay đổi (có thể là phi tuyến, bậc 2, hoặc do sự tương tác chéo giữa các biến) và tập mẫu dữ liệu đủ lớn.

Cơ sở lý thuyết & Chứng minh: Halbert White [13] phát triển kiểm định này dựa trên thuộc tính của *Đẳng thức Ma trận Thông tin (Information Matrix Equality)*. Theo lý thuyết tiệm cận, nếu H_0 đúng, trung bình mẫu của ma trận $\hat{\varepsilon}_i^2 \mathbf{x}_i \mathbf{x}_i^\top$ sẽ hội tụ chính xác về $\sigma^2 \frac{1}{n} \sum \mathbf{x}_i \mathbf{x}_i^\top$. Để kiểm tra sự hội tụ này một cách thực tiễn mà không cần thao

tác ma trận phức tạp, White chứng minh rằng chỉ cần hồi quy $\hat{\varepsilon}_i^2$ lên mọi phần tử duy nhất cấu thành nên $\mathbf{x}_i\mathbf{x}_i^\top$.

Thiết lập giả thuyết: Tương tự B-P, H_0 : Phương sai đồng nhất ($\sigma_i^2 = \sigma^2$ với mọi i).

Quy trình và Công thức: Hồi quy phụ của kiểm định White cực kỳ bao quát:

$$\hat{\varepsilon}_i^2 = \gamma_0 + \sum \gamma_j X_j + \sum \delta_j X_j^2 + \sum_{j < l} \theta_{jl} X_j X_l + v_i \quad (8)$$

Thống kê kiểm định: $W = n \times R_{\text{aux}}^2 \sim \chi^2(p)$, với p là tổng số biến giải thích trong mô hình phụ.

Làm sao để thỏa & Tối ưu hóa: Cần p -value $> \alpha$ để kết luận mô hình thỏa mãn đồng nhất phương sai. *Tối ưu:* Nhược điểm chí mạng của White test là làm cạn kiệt bậc tự do cực nhanh (ví dụ mô hình gốc 5 biến, mô hình phụ White sẽ có tới 20 biến). Để tối ưu trong mẫu nhỏ, người ta thường dùng **Kiểm định White rút gọn (Modified White Test)**: chỉ hồi quy $\hat{\varepsilon}_i^2$ theo giá trị dự báo $\hat{y}_i$ và bình phương của nó $\hat{y}_i^2$, giúp tiết kiệm bậc tự do tối đa mà vẫn giữ được sức mạnh kiểm định.

4.4 Cơ sở toán học của Sai số chuẩn vững (Robust Standard Errors)

Khi nào cần dùng: Khi các kiểm định trên đều cho ra p -value < 0.05 (Bác bỏ H_0 , xác nhận có phương sai thay đổi). Lúc này, ta không vứt bỏ mô hình, mà dùng Robust SE để "cứu" các giá trị p -value của biến độc lập.

Cơ sở lý thuyết & Chứng minh: Xuất phát từ công thức hiệp phương sai thực tế của OLS:

$$\text{Var}(\boldsymbol{\beta}) = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} (\mathbf{X}^\top \boldsymbol{\Omega} \mathbf{X}) (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \quad (9)$$

Với $\boldsymbol{\Omega}$ là ma trận đường chéo chứa các σ_i^2 chưa biết. Huber [5] và White [13] đã có một phát hiện toán học vĩ đại: Chúng ta không cần phải cố gắng ước lượng chính xác từng σ_i^2 riêng lẻ. Theo Luật số lớn (LLN), ma trận trung tâm $\frac{1}{n} \mathbf{X}^\top \boldsymbol{\Omega} \mathbf{X}$ có thể được ước lượng tiệm cận vững (asymptotically consistent) bằng cách thay thế trực tiếp phần dư mẫu vào: $\frac{1}{n} \sum \hat{\varepsilon}_i^2 \mathbf{x}_i \mathbf{x}_i^\top$.

Tối ưu hóa (HC0 đến HC3): Cấu trúc kẹp Sandwich trên gọi là HC0. Tuy nhiên HC0 bị chệch trong mẫu nhỏ. MacKinnon và White (1985) [8] đã tối ưu hóa nó thành phiên bản **HC3** bằng cách sử dụng các giá trị đòn bẩy h_{ii} (thuộc ma trận hình chiếu

Hat Matrix) để trừng phạt mạnh mẽ các quan sát ngoại lai (outliers):

$$\widehat{\text{Var}}_{HC3}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \left[\sum_{i=1}^n \frac{\hat{\varepsilon}_i^2}{(1 - h_{ii})^2} \mathbf{x}_i \mathbf{x}_i^\top \right] (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \quad (10)$$

Giải thích h_{ii} – Giá trị đòn bẩy (Leverage): Đại lượng h_{ii} là phần tử đường chéo thứ i của **ma trận hình chiếu** (Hat Matrix), được định nghĩa:

$$\mathbf{H} = \mathbf{X}(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \quad (11)$$

Ma trận này có tên gọi “Hat Matrix” vì nó “đội mũ” lên $\mathbf{y}$: giá trị dự đoán $\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{H}\mathbf{y}$. Mỗi phần tử đường chéo h_{ii} đo lường **mức độ ảnh hưởng (leverage)** của quan sát thứ i trong không gian biến độc lập đến chính giá trị dự đoán $\hat{y}_i$ của nó. Cụ thể:

- h_{ii} nằm trong khoảng $[\frac{1}{n}, 1]$, với $\sum_{i=1}^n h_{ii} = p$ (số tham số của mô hình, bao gồm hệ số chặn).
- h_{ii} lớn $\Rightarrow$ quan sát i nằm xa trung tâm phân phối của $\mathbf{X} \Rightarrow$ có khả năng “kéo” đường hồi quy về phía mình mạnh hơn.
- Quy tắc thực hành: quan sát có $h_{ii} > \frac{2p}{n}$ được coi là có đòn bẩy cao (high-leverage point).

Trong công thức HC3, hệ số $\frac{1}{(1-h_{ii})^2}$ đóng vai trò **trừng phạt** (penalize): những quan sát có leverage cao (nghĩa là h_{ii} gần 1) sẽ khiến phần dư $\hat{\varepsilon}_i$ bị “co lại” so với sai số thực ε_i ; việc chia cho $(1 - h_{ii})^2$ bù đắp lại sự thiên lệch này, giúp ước lượng phương sai trở nên chính xác hơn trong mẫu nhỏ.

HC3 được giới học thuật kinh tế lượng đánh giá là giải pháp **tối ưu nhất** và là tiêu chuẩn vàng khi xử lý phương sai thay đổi đối với dữ liệu cắt ngang (cross-sectional data).

4.5 So sánh, Đánh giá và Thực hành R

Để làm rõ các lý thuyết kiểm định và phương pháp khắc phục đã nêu, phân mục này trình bày kết quả thực nghiệm kiểm tra tính đồng nhất phương sai trên tập dữ liệu thực tế **Prestige** (dự báo điểm số uy tín nghề nghiệp từ thu nhập và trình độ học vấn).

4.5.1 Kết quả ước lượng OLS mẫu (Chưa hiệu chỉnh)

Xây dựng đoạn code chạy trên RStudio như sau:

```
# =====  
# THỰC HÀNH R: KIỂM ĐỊNH, KHẮC PHỤC VÀ VẼ BIỂU ĐỒ PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI  
# =====  
  
# 1. CÀI ĐẶT CÁC GÓI LỆNH  
# (Xóa dấu # ở 4 dòng dưới đây và chạy 1 lần duy nhất nếu máy bạn chưa cài  
# đặt)  
# install.packages("car")  
# install.packages("lmtest")  
# install.packages("sandwich")  
# install.packages("ggplot2")  
  
# 2. GỌI THƯ VIỆN (Bắt buộc phải chạy để không bị lỗi "could not find  
# function")  
library(car)  
library(lmtest)  
library(sandwich)  
library(ggplot2)  
  
# 3. NẠP DỮ LIỆU VÀ CHẠY MÔ HÌNH OLS GỐC  
data(Prestige)  
model <- lm(prestige ~ income + education, data = Prestige)  
  
cat("\n=====\n")  
cat("1. BẢNG KẾT QUẢ OLS GỐC (CHƯA HIỆU CHỈNH)\n")  
cat("=====\n")  
print(summary(model))
```

Mô hình ước lượng ban đầu bằng phương pháp bình phương bé nhất (OLS) cho kết quả như sau:

Call:

```
lm(formula = prestige ~ income + education, data = Prestige)
```

Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-19.4040	-5.3308	0.0154	4.9803	17.6889

Coefficients:

```
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -6.8477787   3.2189771  -2.127   0.0359 * income      0.0013612  0.0002
education    4.1374444   0.3489120  11.858 < 2e-16 ***
---
```

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 7.81 on 99 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.798, Adjusted R-squared: 0.7939

F-statistic: 195.6 on 2 and 99 DF, p-value: < 2.2e-16

Ý nghĩa các hệ số hồi quy:

- **Hệ số chặn (Intercept = -6.8478):** Khi thu nhập (income) và học vấn (education) bằng 0, điểm uy tín nghề nghiệp lý thuyết là -6.8478 . Hệ số này có ý nghĩa thống kê ở mức biên 5% ($p = 0.0359 < 0.05$).
- **Hệ số biến income (0.00136):** Khi thu nhập tăng thêm 1 đơn vị (và trình độ học vấn không đổi), điểm uy tín tăng trung bình 0.00136 điểm. Mối quan hệ này có ý nghĩa thống kê cực kỳ cao ($p = 2.36 \times 10^{-8} < 0.001$).
- **Hệ số biến education (4.1374):** Khi số năm đi học tăng thêm 1 năm (và thu nhập không đổi), điểm uy tín nghề nghiệp tăng trung bình 4.1374 điểm. Biến này có ý nghĩa thống kê tối cao ($p < 2 \times 10^{-16}$).

Độ phù hợp tổng thể: Hệ số xác định hiệu chỉnh $R_{\text{adj}}^2 = 0.7939$ chỉ ra rằng hai biến độc lập giải thích được khoảng **79.39%** sự biến động của điểm uy tín nghề nghiệp. Kiểm định F với giá trị $p < 2.2 \times 10^{-16}$ cho thấy mô hình hoàn toàn phù hợp về mặt tổng thể.

Tường giải tất cả thông số kỹ thuật trong kết quả OLS: Để làm sâu sắc hơn phần phân tích thực nghiệm, ý nghĩa kinh tế lượng chi tiết của từng thông số nền tảng xuất hiện trong bảng kết quả R được trình bày tại Bảng 2.

Bảng 2: Giải thích chi tiết các thông số trong kết quả OLS gốc

Thành phần	Thông số kỹ thuật	Ý nghĩa kinh tế lượng và diễn giải thực nghiệm
Residuals	Min, 1Q, Median, 3Q, Max	Thống kê mô tả phân phối phần dư ($\hat{e}_i = y_i - \hat{y}_i$). Giá trị trung vị ($Median = 0.0154$) tiệm cận sát mức 0 và khoảng cách đối xứng tương đối giữa phân vị thứ nhất và phân vị thứ ba (-5.33 và 4.98) cung cấp chỉ dấu thực nghiệm ban đầu rằng sai số tuân theo giả định phân phối chuẩn.
	Estimate ($\hat{\beta}_j$)	Giá trị ước lượng điểm của các hệ số hồi quy mẫu, phản ánh độ lớn và chiều tác động biên của các biến độc lập lên biến phụ thuộc.
	Std. Error (SE)	Sai số chuẩn của các hệ số góc. Đo lường độ biến động phân phối mẫu của $\hat{\beta}_j$. Sai số chuẩn càng nhỏ chứng tỏ ước lượng điểm càng chính xác và có độ tin cậy cao.
	t value	Thống kê kiểm định t , xác định bằng tỉ số giữa hệ số ước lượng và sai số chuẩn tương ứng ($\hat{\beta}_j/SE(\hat{\beta}_j)$). Giá trị $ t > 1.96$ cho thấy biến độc lập có đóng góp biên ý nghĩa đối với mô hình.
Model Fit	Pr(> t)	Giá trị p -value của kiểm định t từng phần. Đại diện cho xác suất bác bỏ sai lầm giả thuyết $H_0 : \beta_j = 0$. Mức $p < 0.05$ khẳng định tác động có ý nghĩa thống kê rõ rệt.
	Residual standard error	Sai số chuẩn của mô hình hồi quy ($\hat{\sigma} = 7.81$). Phản ánh độ lệch trung bình của các điểm dữ liệu thực tế xung quanh siêu phẳng hồi quy ước lượng.
	Degrees of freedom	Số bậc tự do của phần dư ($df = 99$), tính bằng $n - k - 1 = 102 - 2 - 1 = 99$. Đây là mẫu số hiệu chỉnh để tính toán phương sai không chệch của sai số.
	Multiple R^2	Hệ số xác định ($R^2 = 0.798$), đo lường tỷ lệ phần trăm sự biến động của điểm uy tín nghề nghiệp được giải thích bởi tập hợp hai biến độc lập.
	Adjusted R^2	Hệ số xác định hiệu chỉnh ($\bar{R}^2 = 0.7939$), thước đo độ phù hợp khách quan đã loại bỏ hiện tượng tăng ảo dòng R^2 khi đưa thêm biến vào mô hình.

4.5.2 Kết quả thực nghiệm các kiểm định phương sai thay đổi

Để thực nghiệm các kiểm định phương sai thay đổi, ta tiếp tục thêm vào các dòng code như sau:

```
# 4. CÁC KIỂM ĐỊNH PHÁT HIỆN PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI
cat("=====")
cat("2. KIỂM ĐỊNH BREUSCH-PAGAN (1979)")
cat("=====")
print(bptest(model))

cat("=====")
cat("3. KIỂM ĐỊNH WHITE (1980)")
cat("=====")
print(bptest(model, income * education + I(income2) + I(education2), data = Prestige))
```

Kết quả kiểm định Breusch-Pagan (1979):

studentized Breusch-Pagan test

data: model

BP = 4.1838, df = 2, p-value = 0.1235

Vì $p\text{-value} = 0.1235 > 0.05$, ta chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết H_0 . Kiểm định B-P cho thấy mô hình không vi phạm hiện tượng phương sai thay đổi ở dạng cấu trúc tuyến tính đơn giản.

Kết quả kiểm định White (1980):

studentized Breusch-Pagan test

data: model

BP = 12.965, df = 5, p-value = 0.02371

Khác với kiểm định B-P, kiểm định White mở rộng xét cả các dạng bậc hai và tương tác chéo. Kết quả cho thấy $p\text{-value} = 0.02371 < 0.05$, dẫn đến việc **bác bỏ giả thuyết H_0** . Kết luận: Sai số của mô hình tồn tại hiện tượng phương sai thay đổi do các tác động phi tuyến tính gây ra. Do đó, các sai số chuẩn ước lượng bằng OLS gốc không

còn đáng tin cậy.

4.5.3 Hiệu chỉnh bằng Sai số chuẩn vững HC3

Viết thêm các dòng code sau để hiệu chỉnh:

```
# 5. KHẮC PHỤC BẰNG ROBUST STANDARD ERRORS (CHUẨN HC3)
cat("=====")
cat("4. BẢNG KẾT QUẢ VỚI ROBUST STANDARD ERRORS (CHUẨN HC3)")
cat("=====")
robust_model <- coeftest(model, vcov = vcovHC(model, type = "HC3"))
print(robust_model)
```

Để khắc phục vi phạm phát hiện bởi kiểm định White, ma trận hiệp phương sai vững chuẩn HC3 được áp dụng. Kết quả kiểm định lại các hệ số như sau:

t test of coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-6.84777872	3.25355462	-2.1047	0.03785
income				0.00136117
education	4.13744438	0.39588932	10.4510	< 2.2e-16 ***

Đánh giá sau hiệu chỉnh: Để có cái nhìn trực quan về hiệu quả của việc điều chỉnh, Bảng 3 tổng hợp lại sự thay đổi của sai số chuẩn trước và sau khi sử dụng cấu trúc HC3.

Bảng 3: So sánh sai số chuẩn OLS gốc và sai số chuẩn vững HC3

Biến độc lập	Hệ số ($\hat{\beta}$)	SE Gốc	SE Vững (HC3)	p-value Gốc	p-value (HC3)
Hệ số chặn (<i>Intercept</i>)	-6.84778	3.21898	3.25355 ↑	0.03590	0.03785
Thu nhập (<i>income</i>)	0.00136	0.00022	0.00030 ↑	2.36e-08	1.55e-05
Học vấn (<i>education</i>)	4.13744	0.34891	0.39589 ↑	< 2e-16	< 2.2e-16

Kết luận: Dưới tác động của hiện tượng phương sai thay đổi, sai số chuẩn tính toán từ thuật toán OLS thông thường có xu hướng bị hạ thấp quá mức so với thực tế (lạc quan sai lệch). Sau khi hiệu chỉnh bằng chuẩn vững HC3, các sai số chuẩn (*Std. Error*) đều tăng lên. Tuy nhiên, mức độ ý nghĩa thống kê của hai biến độc lập cốt lõi là **income** và **education vẫn giữ nguyên vẹn ký hiệu ý nghĩa tối cao (***)**. Điều này chứng minh mối quan hệ tác động tích cực của thu nhập và trình độ học vấn đến uy tín nghề nghiệp là hoàn toàn bền vững và có độ tin cậy khoa học rất cao.

- **B-P Test:** Nhanh, mạnh khi phương sai thay đổi tuyến tính, nhưng dễ sai lệch nếu phân phối sai số bất thường (Khắc phục bằng Koenker studentized).
- **White Test:** Toàn diện, không cần định hình trước cấu trúc, nhưng hao tổn quá nhiều bậc tự do, yếu ở mẫu nhỏ.
- **Robust SE (HC3):** Không phải là phép kiểm định mà là "liều thuốc chữa bệnh". Giữ vững tính không chệch của OLS, hiệu chỉnh lại SE để đưa ra quyết định thống kê khoa học nhất.

4.5.4 Trực quan hóa kết quả

Để trực quan hóa kết quả, ta xây dựng đoạn code như sau:

```
# 6. VẼ BIỂU ĐỒ MINH HỌA TRỰC QUAN
# -----

# 6.1 Biểu đồ chẩn đoán cơ bản (Xuất hiện trong tab Plots mặc định)
par(mfrow = c(1, 2))
plot(model, which = 1, main = "Residuals vs Fitted(Phân tán phần dư)", pch = 16, col = "steelblue")
plot(model, which = 3, main = "Scale-Location(Kiểm tra phương sai)", pch = 16, col = "darkorange")
par(mfrow = c(1, 1))


# -----

# 6.2 Biểu đồ so sánh Khoảng tin cậy bằng ggplot2
# Lấy khoảng tin cậy của OLS
ci_ols <- confint(model)[2:3, ]

# Lấy khoảng tin cậy của HC3
ci_hc3 <- coefci(model, vcov. = vcovHC(model, type = "HC3"))[2:3, ]

# Tạo dataframe để vẽ biểu đồ
df_plot <- data.frame( Variable = rep(c("Income", "Education"), 2),
  Method = rep(c("1. OLS Standard Errors", "2. Robust SE (HC3)"), each = 2),
  Estimate = rep(coef(model)[2:3], 2),
  Lower = c(ci_ols[, 1], ci_hc3[, 1]),
  Upper = c(ci_ols[, 2], ci_hc3[, 2])
)

# Vẽ biểu đồ và lưu vào biến bieu_do
bieu_do <- ggplot(df_plot, aes(x = Variable, y = Estimate, color = Method))
+
geom_point(position = position_dodge(width = 0.5), size = 3) +
geom_errorbar(aes(ymin = Lower, ymax = Upper),
  position = position_dodge(width = 0.5),
  width = 0.2, linewidth = 1) +
facet_wrap( Variable, scales = "free") +
labs(title = "So sánh Khoảng tin cậy 95% (OLS vs Robust HC3)",
  subtitle = "Khoảng tin cậy rộng hơn cho thấy SE đã được hiệu chỉnh mạnh mẽ",
  x = "Biến độc lập",
  y = "Giá trị hệ số ước lượng") +
theme_minimal() +
scale_color_manual(values = c("steelblue", "firebrick")) +
```




Hình 18: Biểu đồ chẩn đoán cơ bản

Dựa vào ảnh trên, ta có thể thấy rằng đồ thị chẩn đoán gồm hai cấu phần độc lập đóng vai trò kiểm tra các giả định nền tảng của mô hình OLS gốc trước khi tiến hành suy diễn thống kê.

Đối với đồ thị bên trái: "Residuals vs Fitted" (Phân tán phần dư). Đồ thị này chủ yếu được sử dụng để thẩm định giả định A1 về tính tuyến tính và sàng lọc các quan sát ngoại lai có tầm ảnh hưởng lớn. Đặc tính hình học của đồ thị được thể hiện qua đường xu hướng màu đỏ (đường làm mịn dạng LOESS) vẽ xuyên qua đám mây phần dư. Về tổng thể, đường màu đỏ này bám tương đối sát và dao động xung quanh đường tham chiếu nét đứt $e = 0$ tại phân khúc tập trung mật độ dữ liệu cao (giá trị dự báo từ 30 đến 70). Tuy nhiên, khi giá trị dự báo vượt ngưỡng 70, đường xu hướng có xu hướng chúi xuống tương đối rõ nét. Sự lệch hướng ở phần đuôi này phát ra một chỉ dấu thực nghiệm về một sự vi phạm cục bộ đối với dạng hàm tuyến tính thuần túy ở các vùng biên dữ liệu cao. Thêm vào đó, thuật toán đồ thị đã tự động gắn nhãn định danh cho ba quan sát có phần dư cực đoan nhất trong mẫu: điểm farmers nằm cô lập ở phía trên đại diện cho sai số dương lớn (mô hình dự báo thấp hơn thực tế), trong khi hai điểm collectors và newsboys bị kéo mạnh xuống phía dưới đáy đồ thị biểu thị sai số

âm nghiêm trọng (mô hình dự báo vượt quá xa thực tế).

Bên cạnh đó, đồ thị bên phải: "Scale-Location" (Kiểm tra phương sai) cung cấp bằng chứng trực quan định tính, đóng vai trò nền tảng củng cố cho kết quả của kiểm định White ($p = 0.02371$) về việc vi phạm giả định A3: Đồng nhất phương sai. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa căn bậc hai của giá trị tuyệt đối phần dư chuẩn hóa và giá trị dự báo. Nếu giả định đồng nhất phương sai được thỏa mãn, đường xu hướng màu đỏ bắt buộc phải là một đường thẳng nằm ngang hoàn hảo và đám mây dữ liệu phải phân tán đều đặn theo chiều thẳng đứng. Trái lại, đồ thị thực tế hiển thị đường màu đỏ uốn lượn hình sóng, ban đầu hơi võng xuống ở mức giá trị 40 và sau đó dốc ngược đi lên khi vượt quá mức 70. Đồng thời, cấu trúc hình học của các điểm dữ liệu cho thấy sự bất đối xứng nghiêm trọng về độ phân tán dọc. Tại phân khúc giá trị dự báo từ 30 đến 60, các điểm dữ liệu tạo thành một cột phương sai rất cao và dày đặc, bị đẩy lên đỉnh bởi các quan sát ngoại lai có độ biến động cực lớn đã được nhận diện là newsboys, farmers và collectors. Ngược lại, khi tiến về phía cuối trục hoành, mật độ điểm co cụm lại và biên độ phân tán dọc bị thay đổi hình thái. Hiện tượng đám mây phần dư phình-ngót không đều và đường xu hướng uốn cong này là một minh chứng hình học kinh điển cho thấy phương sai của sai số ngẫu nhiên bị phụ thuộc vào đại lượng dự báo. Nó bác bỏ hoàn toàn giả thuyết về một hằng số phương sai duy nhất, khẳng định mô hình đã mắc căn bệnh phương sai thay đổi do các tác động phi tuyến gây ra, và chứng minh việc bạn sử dụng liều thuốc sai số chuẩn vững HC3 ở đồ thị trước là một bước xử lý kỹ thuật hoàn toàn bắt buộc và chính xác. Dựa vào ảnh trên, đồ thị so sánh khoảng tin cậy 95% cung cấp một minh chứng trực quan rõ rệt cho giai đoạn khắc phục hiện tượng phương sai thay đổi trong quy trình phân tích. Đồ thị thực hiện so sánh các khoảng tin cậy của hệ số hồi quy được tính toán từ sai số chuẩn OLS truyền thống (màu xanh) và sai số chuẩn vững Huber-White hệ số hiệu chỉnh HC3 (màu đỏ) đối với hai biến độc lập là trình độ học vấn (Education) và thu nhập (Income). Đặc tính cốt lõi đầu tiên cần ghi nhận là vị trí của các điểm ước lượng (các chấm tròn biểu diễn hệ số β) của cả hai phương pháp đều hoàn toàn trùng khớp nhau trên cùng một đường ngang. Đặc điểm này chứng minh một nguyên lý tảng băng trong kinh tế lượng: việc hiệu chỉnh sai số chuẩn vững không hề làm thay đổi giá trị của các hệ số hồi quy mẫu vốn đã đạt tính không chệch, mà nó chỉ tái định lượng độ biến động phân phối mẫu của chúng. Tuy nhiên, đặc tính kỹ thuật quan trọng nhất nằm ở chiều dài của các thanh sai số (error bars). Khoảng tin cậy màu đỏ của hệ số vững HC3 ở cả hai biến đều giãn rộng hơn một cách rõ rệt so với khoảng tin cậy màu xanh của OLS gốc. Khi mô hình tồn tại hiện tượng phương sai thay đổi, thuật toán OLS thông thường sẽ làm hạ thấp sai số chuẩn một cách sai lệch, từ đó bóp nghẹt khoảng tin cậy khiến người nghiên cứu rơi vào trạng thái "lạc quan giả tạo". Phép hiệu chỉnh HC3 đã trừng phạt và đẩy sai số



Hình 19: Biểu đồ so sánh Khoảng tin cậy bằng ggplot2

chuẩn về đúng quy mô tiệm cận thực tế của nó, làm mở rộng khoảng tin cậy để phản ánh đúng mức độ rủi ro của dữ liệu. Điểm mấu chốt cuối cùng là dù khoảng tin cậy HC3 có bị kéo rộng ra, cả hai thanh sai số đều nằm hoàn toàn về một phía so với giá trị 0 (thanh của Education duy trì vị trí cao trên mức 3.0 và thanh của Income nằm hoàn toàn trên mức 0.00075). Điều này khẳng định kết luận trong bảng tổng hợp của bài báo cáo: sau khi chịu một cơ chế phạt nghiêm khắc từ HC3, tác động biên của thu nhập và học vấn đến uy tín nghề nghiệp vẫn giữ nguyên vẹn ý nghĩa thống kê tối cao (***)).

Kết luận: Dưới tác động của hiện tượng phương sai thay đổi, sai số chuẩn tính toán từ thuật toán OLS thông thường có xu hướng bị hạ thấp quá mức so với thực tế (lạc quan sai lệch). Sau khi hiệu chỉnh bằng chuẩn vững HC3, các sai số chuẩn (*Std. Error*) đều tăng lên. Tuy nhiên, mức độ ý nghĩa thống kê của hai biến độc lập cốt lõi là **income** và **education** **vẫn giữ nguyên vẹn ký hiệu ý nghĩa tối cao (***)**. Điều này chứng minh mối quan hệ tác động tích cực của thu nhập và trình độ học vấn đến uy tín nghề nghiệp là hoàn toàn bền vững và có độ tin cậy khoa học rất cao.

- **B-P Test:** Nhanh, mạnh khi phương sai thay đổi tuyến tính, nhưng dễ sai lệch nếu phân phối sai số bất thường (Khắc phục bằng Koenker studentized).
- **White Test:** Toàn diện, không cần định hình trước cấu trúc, nhưng hao tổn quá nhiều bậc tự do, yếu ở mẫu nhỏ.
- **Robust SE (HC3):** Không phải là phép kiểm định mà là "liều thuốc chữa bệnh". Giữ vững tính không chệch của OLS, hiệu chỉnh lại *SE* để đưa ra quyết định thống kê khoa học nhất.

5 Giả Định Tính Độc Lập Của Sai Số

5.1 1. Khái niệm và cơ sở lý thuyết của tự tương quan

5.1.1 1.1. Mô hình hồi quy tuyến tính bội và sai số ngẫu nhiên

Xét $y_i, \dots, y_n$ là n giá trị quan trắc độc lập của Y . Khi đó, mỗi y_i có thể biểu diễn dưới dạng

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \dots + \beta_j x_{ji} + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Trong đó:

- y_i là giá trị của biến phụ thuộc tại quan trắc thứ i .
- $x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{ji}$ là giá trị của các biến độc lập thứ j tại quan trắc thứ i .
- β_0 là hệ số chặn của mô hình.
- $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_j$ là các hệ số hồi quy cần ước lượng.
- ε_i là sai số ngẫu nhiên tại quan trắc thứ i , tức phần biến động của y_i mà mô hình chưa giải thích được.
- j là số biến độc lập; n là số quan trắc.

5.1.2 1.2. Giả định không tự tương quan

Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, sai số thường được giả định có kỳ vọng bằng 0, phương sai không đổi và không có tương quan giữa các quan trắc khác nhau:

$$E(\varepsilon_i) = 0$$

$$\text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2$$

$$\text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0, \quad i \neq j$$

Trong đó:

- $E(\varepsilon_i)$ là kỳ vọng của sai số tại quan trắc thứ i .
- $\text{Var}(\varepsilon_i)$ là phương sai của sai số tại quan trắc thứ i .
- σ^2 là phương sai chung của sai số.
- $\text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j)$ là hiệp phương sai giữa sai số tại hai quan trắc i và j .
- $i \neq j$ nghĩa là hai quan trắc khác nhau.

Điều kiện $\text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0$ cho biết sai số ở một quan trắc không có quan hệ tuyến tính với sai số ở quan trắc khác. Đây chính là giả định không tự tương quan hoặc giả định độc lập theo nghĩa không tương quan của sai số.

5.1.3 1.3. Khái niệm tự tương quan

Tự tương quan là hiện tượng sai số của quan sát thứ i có quan hệ với sai số của quan sát thứ j , với $i \neq j$. Khi đó, giả định các sai số độc lập với nhau bị vi phạm.

Về mặt toán học, hiện tượng tự tương quan được biểu diễn bởi:

$$\text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) \neq 0, \quad i \neq j$$

Trong đó, $\text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j)$ biểu thị hiệp phương sai giữa sai số của quan sát thứ i và sai số của quan sát thứ j .

Tùy theo cách các quan sát có thứ tự hoặc có mối liên hệ với nhau, tự tương quan có thể xuất hiện dưới hai dạng chính:

- **Tự tương quan theo thời gian:** sai số tại một thời điểm có quan hệ với sai số tại những thời điểm khác.
- **Tự tương quan theo không gian:** sai số của các quan sát ở gần nhau hoặc thuộc cùng một khu vực có quan hệ với nhau.

Ví dụ: Hồi quy giá thuê nhà tại TP.HCM

Giả sử ta xây dựng mô hình hồi quy để giải thích giá thuê của các căn nhà tại Quận 1 và Hóc Môn dựa trên diện tích nhà và số phòng ngủ:

Mô hình dựa trên diện tích nhà và số phòng ngủ:

$$\text{Rent}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Area}_i + \beta_2 \text{Bedroom}_i + \varepsilon_i$$

Trong đó, Rent_i là giá thuê của căn nhà thứ i , Area_i là diện tích nhà, Bedroom_i là số phòng ngủ và ε_i là sai số của mô hình.

Nếu không có tự tương quan, sai số của một căn nhà không có quan hệ với sai số của căn nhà khác. việc mô hình dự đoán giá thuê của một căn nhà tại Quận 1 cao hơn hoặc thấp hơn thực tế không cho biết trước mô hình sẽ dự đoán như thế nào đối với căn nhà khác. Đối với căn nhà khác, mô hình có thể dự đoán cao hơn thực tế, thấp hơn thực tế hoặc cũng có thể dự đoán gần chính xác.

Tuy nhiên, giá thuê nhà còn chịu ảnh hưởng bởi khu vực. Nếu mô hình không đưa biến khu vực vào, những ảnh hưởng đặc trưng của từng khu vực sẽ được phản ánh một phần trong sai số ε_i . Do các căn nhà trong cùng khu vực cùng chịu tác động từ các yếu tố như vị trí, mức độ thuận tiện, cơ sở hạ tầng và nhu cầu thuê, sai số của chúng có thể có xu hướng tương tự nhau. Khi đó, giả định các sai số độc lập bị vi phạm.

Ví dụ: Hồi quy doanh thu bán hàng

Giả sử ta xây dựng mô hình hồi quy để giải thích doanh thu bán hàng theo tháng dựa trên chi phí quảng cáo và mức giảm giá:

$$\text{Sales}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{Advertising}_t + \beta_2 \text{Discount}_t + \varepsilon_t$$

Trong đó, Sales_t là doanh thu tại tháng t , Advertising_t là chi phí quảng cáo, Discount_t là mức giảm giá và ε_t là sai số của mô hình.

Nếu không có tự tương quan, sai số tại một tháng không có quan hệ có hệ thống với sai số tại tháng khác. Việc mô hình dự đoán doanh thu của tháng này cao hơn hoặc thấp hơn thực tế không cho biết trước mô hình sẽ dự đoán như thế nào đối với tháng tiếp theo.

Tuy nhiên, vào những tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm thường tăng do người tiêu dùng chuẩn bị cho các dịp lễ và năm mới. Nếu mô hình không đưa yếu tố mùa vụ cuối năm vào, ảnh hưởng này sẽ được phản ánh trong sai số ε_t . Doanh thu thực tế trong nhiều tháng cuối năm liên tiếp có thể cao hơn mức mô hình dự đoán, làm sai số của các tháng này có xu hướng tương tự nhau. Khi đó, giả định các sai số độc lập theo thời gian bị vi phạm.

5.1.4 1.4. Sai số và thặng dư sau ước lượng

Trong mô hình hồi quy, hiện tượng tự tương quan được định nghĩa trên các sai số ngẫu nhiên ε_i . Tuy nhiên, trong thực tế, ta không thể quan sát trực tiếp ε_i vì các tham số tổng thể $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_j$ chưa biết.

Sau khi ước lượng mô hình từ dữ liệu mẫu, ta thu được các hệ số ước lượng $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \dots, \hat{\beta}_j$ và giá trị dự đoán của quan sát thứ i :

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_{1i} + \hat{\beta}_2 x_{2i} + \dots + \hat{\beta}_j x_{ji}$$

Thặng dư của quan sát thứ i được tính bằng:

$$e_i = y_i - \hat{y}_i$$

Trong đó:

- e_i là thặng dư của quan sát thứ i .

- y_i là giá trị thực tế quan sát được của biến phụ thuộc tại quan sát thứ i .
- $\hat{y}_i$ là giá trị dự đoán từ mô hình hồi quy đã ước lượng tại quan sát thứ i .
- $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \dots, \hat{\beta}_j$ là các hệ số hồi quy được ước lượng từ dữ liệu mẫu.

Dưới dạng vector, thặng dư của toàn bộ mô hình được viết là:

$$e = y - \hat{y}$$

Vector thặng dư e được sử dụng như một đại diện quan sát được gần đúng cho vector sai số ngẫu nhiên ε . Vì vậy, trong thực hành, việc kiểm tra tự tương quan thường được thực hiện dựa trên các thặng dư thu được từ mô hình hồi quy đã ước lượng.

5.2 2. Nguyên nhân dẫn đến tự tương quan

Dựa trên các nguyên nhân được trình bày bởi Gujarati và Porter (2009), có thể khái quát nguyên nhân dẫn đến tự tương quan thành hai nhóm chính:

- Do cấu trúc phụ thuộc vốn có của dữ liệu hoặc của quá trình sai số.
- Do mô hình chưa được đặc tả phù hợp.

Các nguyên nhân này không loại trừ nhau. Trong thực tế, một mô hình có thể xuất hiện tự tương quan do nhiều nguyên nhân cùng lúc.

5.2.1 2.1. Nguyên nhân do cấu trúc phụ thuộc của dữ liệu

Đối với dữ liệu chuỗi thời gian, các quan sát được ghi nhận liên tiếp theo thời gian nên giá trị hiện tại có thể chịu ảnh hưởng từ quá khứ. Đồng thời, một cú sốc ngẫu nhiên xuất hiện tại một thời điểm có thể tiếp tục ảnh hưởng sang các thời điểm sau, làm sai số giữa các kỳ có tương quan với nhau.

Một số dạng phụ thuộc thường gặp gồm:

- **Quán tính:** các biến kinh tế thường thay đổi từ từ, nên trạng thái tại một thời điểm có xu hướng tiếp tục kéo dài sang các thời điểm sau.
- **Tác động có độ trễ:** tác động của một sự kiện hoặc cú sốc có thể không kết thúc ngay lập tức mà tiếp tục ảnh hưởng qua nhiều kỳ.
- **Mùa vụ và chu kỳ:** các hoạt động kinh tế có thể lặp lại theo tháng, quý hoặc năm, tạo ra sự phụ thuộc giữa các quan sát theo thời gian.

Đối với dữ liệu không gian, các quan sát ở gần nhau hoặc thuộc cùng một khu vực có thể chịu ảnh hưởng từ các điều kiện chung. Vì vậy, sai số của các quan sát có liên hệ về không gian cũng có thể tương quan với nhau.

5.2.2 2.2. Nguyên nhân do mô hình chưa được đặc tả phù hợp

Tự tương quan cũng có thể xuất hiện khi mô hình không phản ánh đúng cấu trúc của dữ liệu. Khi một yếu tố có tính hệ thống bị bỏ sót hoặc được mô hình hóa không phù hợp, ảnh hưởng của yếu tố đó sẽ nằm lại trong sai số và tạo ra mẫu hình tương quan.

Một số nguyên nhân thường gặp gồm:

- **Bỏ sót biến quan trọng:** một biến có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc nhưng không được đưa vào mô hình.
- **Sai dạng hàm:** mối quan hệ thực tế là phi tuyến nhưng mô hình lại được xây dựng dưới dạng tuyến tính không phù hợp.
- **Thao tác hoặc biến đổi dữ liệu:** các phương pháp như làm trơn hoặc nội suy có thể tạo ra sự liên hệ nhân tạo giữa các quan sát.

Tóm lại, tự tương quan có thể xuất phát từ cấu trúc phụ thuộc vốn có của dữ liệu hoặc của quá trình sai số. Ngoài ra, nó cũng có thể phát sinh khi mô hình chưa phản ánh đầy đủ cấu trúc của dữ liệu, khiến các yếu tố có tính hệ thống bị đưa vào sai số.

5.3 3. Hậu quả thống kê của tự tương quan

Hậu quả chính của tự tương quan không phải là mô hình không thể ước lượng được các hệ số hồi quy. Trong nhiều trường hợp, OLS vẫn cho phép tính các hệ số ước lượng. Tuy nhiên, khi các sai số có tương quan với nhau, các công thức phương sai, sai số chuẩn và suy luận thống kê thông thường của OLS có thể không còn chính xác.

5.3.1 3.1. Tự tương quan làm sai cấu trúc phương sai của vector sai số

Với mô hình hồi quy tuyến tính bội viết dưới dạng ma trận:

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$$

Trong đó:

$\mathbf{y}$ là vector giá trị quan trắc của biến phụ thuộc.

X là ma trận các biến độc lập, thường gồm cả cột 1 cho hệ số chặn.

β là vector các hệ số hồi quy cần ước lượng.

ε là vector sai số ngẫu nhiên của mô hình.

Giả sử vector sai số là:

$$\varepsilon = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}$$

Ma trận phương sai - hiệp phương sai của vector sai số có dạng tổng quát là:

$$\text{Var}(\varepsilon) = \Omega = \begin{bmatrix} \omega_{11} & \omega_{12} & \cdots & \omega_{1n} \\ \omega_{21} & \omega_{22} & \cdots & \omega_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \omega_{n1} & \omega_{n2} & \cdots & \omega_{nn} \end{bmatrix}$$

Trong đó:

$$\omega_{ii} = \text{Var}(\varepsilon_i)$$

là phương sai của sai số tại quan trắc i , còn:

$$\omega_{ij} = \text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j), \quad i \neq j$$

là hiệp phương sai giữa sai số tại hai quan trắc khác nhau.

Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, ta giả định các sai số có cùng phương sai:

$$\text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2 \quad \text{với mọi } i$$

Đồng thời, ta cũng giả định sai số giữa các quan trắc khác nhau không tương quan với nhau:

$$\text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0 \quad \text{với mọi } i \neq j$$

Khi hai giả định này cùng đúng, ma trận phương sai - hiệp phương sai của vector sai số trở thành:

$$\text{Var}(\boldsymbol{\varepsilon}) = \begin{bmatrix} \sigma^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sigma^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sigma^2 \end{bmatrix} = \sigma^2 I$$

Trong đó I là ma trận đơn vị:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

Công thức này có hai ý nghĩa. Thứ nhất, các phần tử trên đường chéo chính đều bằng σ^2 , nghĩa là các sai số có cùng phương sai. Thứ hai, các phần tử ngoài đường chéo đều bằng 0, nghĩa là sai số giữa các quan trắc khác nhau không tương quan với nhau.

Khi giả định này đúng, phương sai của vector hệ số OLS được tính bằng:

$$\text{Var}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \sigma^2 (X'X)^{-1}$$

Tuy nhiên, khi có tự tương quan, các sai số trong vector $\boldsymbol{\varepsilon}$ có quan hệ với nhau. Nói cách khác, sai số ở quan trắc này có thể tương quan với sai số ở quan trắc khác.

Ví dụ, trong dữ liệu chuỗi thời gian, sai số tại thời điểm t có thể tương quan với sai số tại thời điểm $t - 1$:

$$\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-1}) \neq 0$$

Tổng quát hơn, khi có tự tương quan:

$$\text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) \neq 0 \quad \text{với một số } i \neq j$$

Điều này làm cho các phần tử ngoài đường chéo của ma trận phương sai - hiệp phương sai không còn bằng 0. Khi đó, ma trận phương sai - hiệp phương sai của vector sai số không còn là:

$$\text{Var}(\varepsilon) = \sigma^2 I = \begin{bmatrix} \sigma^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sigma^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sigma^2 \end{bmatrix}$$

mà phải được viết tổng quát hơn là:

$$\text{Var}(\varepsilon) = \Omega = \begin{bmatrix} \omega_{11} & \omega_{12} & \cdots & \omega_{1n} \\ \omega_{21} & \omega_{22} & \cdots & \omega_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \omega_{n1} & \omega_{n2} & \cdots & \omega_{nn} \end{bmatrix}$$

Trong đó, Ω là ma trận chứa toàn bộ phương sai và hiệp phương sai của các sai số. Các phần tử trên đường chéo chính của Ω là phương sai của từng sai số, còn các phần tử ngoài đường chéo là hiệp phương sai giữa các sai số khác nhau.

Do đó:

$$\text{Var}(\varepsilon) \neq \sigma^2 I$$

Nói cách khác, $\sigma^2 I$ chỉ là một trường hợp đặc biệt của Ω . Trường hợp này chỉ đúng khi sai số có phương sai không đổi và không có tự tương quan. Khi có tự tương quan, các phần tử ngoài đường chéo khác 0, nên ta không thể dùng $\sigma^2 I$ để mô tả cấu trúc sai số nữa.

Lúc này, công thức phương sai đúng của OLS có dạng tổng quát:

$$\text{Var}(\hat{\beta}) = (X'X)^{-1}X'\Omega X(X'X)^{-1}$$

Vì vậy, nếu mô hình có tự tương quan nhưng ta vẫn dùng công thức cũ:

$$\text{Var}(\hat{\beta}) = \sigma^2(X'X)^{-1}$$

thì sai số chuẩn của các hệ số hồi quy có thể bị tính sai.

5.3.2 3.2. Sai số chuẩn sai làm kiểm định t và p-value không đáng tin cậy

Kiểm định t cho từng hệ số hồi quy có dạng:

$$t = \frac{\hat{\beta}_j - b_j}{\text{SE}(\hat{\beta}_j)}$$

Trong đó:

- $\hat{\beta}_j$ là hệ số hồi quy ước lượng của biến X_j .
- b_j là giá trị của hệ số theo giả thuyết kiểm định, thường bằng 0.
- $\text{SE}(\hat{\beta}_j)$ là sai số chuẩn của hệ số ước lượng $\hat{\beta}_j$.

Do sai số chuẩn nằm trực tiếp ở mẫu số của thống kê t, sai số chuẩn bị tính sai sẽ làm giá trị t tính được khác với giá trị t đúng:

$$\widehat{\text{SE}}(\hat{\beta}_j) \text{ sai} \Rightarrow |t| \text{ sai}$$

Vì p-value được xác định từ giá trị của thống kê t, nên:

$$|t| \text{ sai} \Rightarrow p\text{-value sai}$$

Khi đó, dẫn đến việc kết luận một biến có ý nghĩa thống kê trong khi bằng chứng thực tế chưa đủ mạnh, hoặc bỏ qua một biến thực sự có ý nghĩa.

5.3.3 3.3. Ước lượng phương sai sai số và hệ số R^2 cần được diễn giải thận trọng

Trong mô hình OLS thông thường, phương sai của sai số được ước lượng từ tổng bình phương phần dư:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{SSE}{n - p} = \frac{\sum_{i=1}^n e_i^2}{n - p}$$

Trong đó:

- σ^2 là phương sai sai số được ước lượng.
- $SSE = \sum_{i=1}^n e_i^2$ là tổng bình phương thặng dư.
- n là số quan trắc.
- p là số tham số được ước lượng trong mô hình, bao gồm hệ số chặn.

Công thức trên được xây dựng dựa trên các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, trong đó các sai số giữa những quan trắc khác nhau không tương quan với nhau.

Khi có tự tương quan, công thức OLS thông thường có thể không phản ánh đúng độ biến động thực tế của sai số. Khi đó, ước lượng phương sai sai số có thể bị đánh giá cao hoặc thấp, tùy thuộc vào cấu trúc tự tương quan và đặc điểm của dữ liệu. Vì σ^2 được sử dụng để tính sai số chuẩn của các hệ số hồi quy, sai lệch này tiếp tục ảnh hưởng đến các kết quả suy luận thống kê.

Hệ số xác định được tính bằng:

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{TSS}$$

Trong đó:

- SSE là tổng bình phương phần dư.
- TSS là tổng bình phương độ lệch của biến phụ thuộc so với giá trị trung bình.

Giá trị R^2 chỉ phản ánh tỷ lệ biến động của biến phụ thuộc được mô hình giải thích trong mẫu. R^2 không cho biết các sai số có độc lập với nhau hay không.

Vì vậy, một mô hình vẫn có thể có R^2 cao nhưng đồng thời tồn tại tự tương quan trong phần dư. Do đó, không nên chỉ dựa vào R^2 để kết luận rằng mô hình đã được đặc tả phù hợp hoặc các kết quả suy luận thống kê là đáng tin cậy.

5.3.4 3.4. Kiểm định F, khoảng tin cậy và khoảng dự báo bị ảnh hưởng

Kiểm định F thường được sử dụng để kiểm tra ý nghĩa thống kê chung của các biến độc lập trong mô hình:

$$F = \frac{MSR}{MSE} = \frac{SSR/k}{SSE/(n-p)}$$

Trong đó:

- SSR là tổng bình phương hồi quy.
- SSE là tổng bình phương phần dư.
- $MSR = SSR/k$ là trung bình bình phương hồi quy.
- $MSE = SSE/(n-p)$ là trung bình bình phương sai số.
- n là số quan trắc.
- k là số biến độc lập.
- $p = k + 1$ là số tham số được ước lượng trong mô hình, bao gồm hệ số chặn.

Kiểm định F thông thường được xây dựng dựa trên giả định về cấu trúc phương sai–hiệp phương sai của sai số:

$$\text{Var}(\varepsilon) = \sigma^2 I$$

Khi có tự tương quan, giả định này bị vi phạm. Khi đó, MSE có thể không phản ánh đúng phương sai của sai số và thống kê F được tính theo công thức thông thường có thể không còn tuân theo phân phối F như giả định.

Do đó:

Cấu trúc sai số bị xác định sai $\Rightarrow F$ và p-value của kiểm định F không đáng tin cậy

Hướng sai lệch của giá trị F không cố định: kiểm định có thể đánh giá quá cao hoặc quá thấp ý nghĩa thống kê chung của các biến độc lập, tùy thuộc vào cấu trúc tự tương quan.

Khoảng tin cậy cho một hệ số hồi quy thường có dạng:

$$\hat{\beta}_j \pm t_{1-\alpha/2} \text{SE}(\hat{\beta}_j)$$

Do độ rộng của khoảng tin cậy phụ thuộc trực tiếp vào sai số chuẩn, khi sai số chuẩn bị tính sai thì biên sai số và khoảng tin cậy cũng bị tính sai:

$$SE(\hat{\beta}_j) \text{ sai} \Rightarrow \text{khoảng tin cậy sai}$$

Khoảng tin cậy có thể quá rộng hoặc quá hẹp, làm mức độ chính xác của hệ số ước lượng không được phản ánh đúng.

Tương tự, khoảng dự báo phụ thuộc vào phương sai sai số và cấu trúc phụ thuộc giữa các sai số. Khi tự tương quan bị bỏ qua, mức độ bất định của dự báo có thể bị đánh giá không chính xác, làm khoảng dự báo quá rộng hoặc quá hẹp.

5.4 4. Phát hiện tự tương quan

Do sai số ngẫu nhiên thực tế ε_i không thể quan sát trực tiếp, việc phát hiện tự tương quan thường được thực hiện dựa trên các thặng dư e_i thu được sau khi ước lượng mô hình.

Việc lựa chọn phương pháp phát hiện phụ thuộc vào mối liên hệ tự nhiên giữa các quan sát. Đối với dữ liệu chuỗi thời gian, các quan sát có thứ tự theo thời gian. Đối với dữ liệu không gian, các quan sát có thể liên hệ với nhau thông qua vị trí địa lý, khoảng cách hoặc việc cùng thuộc một khu vực.

Phương pháp đồ thị được sử dụng để nhận diện các mẫu hình ban đầu trong thặng dư. Kiểm định runs kiểm tra xem thứ tự dấu của các thặng dư có mang tính ngẫu nhiên hay không. Đối với dữ liệu chuỗi thời gian, có thể sử dụng thêm kiểm định Durbin–Watson và Breusch–Godfrey để đưa ra kết luận định lượng.

5.4.1 4.1. Phương pháp đồ thị

Phương pháp đồ thị được sử dụng để kiểm tra xem các thặng dư có phân bố ngẫu nhiên hay tạo thành mẫu hình có hệ thống giữa các quan sát hay không.

Cách biểu diễn đồ thị phụ thuộc vào loại dữ liệu và mối liên hệ giữa các quan sát.

4.1.1. Vẽ thặng dư theo thời gian Đối với dữ liệu chuỗi thời gian, ta vẽ thặng dư e_t theo thời điểm t và quan sát sự phân bố của chúng quanh đường 0.

Nếu không có tự tương quan, các thặng dư thường phân bố tương đối ngẫu nhiên quanh đường 0, không tạo thành xu hướng hoặc mẫu hình rõ ràng.

Nếu nhiều thặng dư dương hoặc nhiều thặng dư âm xuất hiện liên tiếp thành từng nhóm theo dạng:


$$+, +, +, -, -, -$$

ta nghi ngờ có tự tương quan dương. Khi đó, thặng dư tại các thời điểm gần nhau có xu hướng cùng dấu.

Nếu các thặng dư thường xuyên đảo dấu theo dạng:

$$+, -, +, -, +, -$$

ta nghi ngờ có tự tương quan âm.



4.1.2. Vẽ thặng dư theo vị trí hoặc khu vực Đối với dữ liệu không gian, có thể biểu diễn thặng dư theo vị trí địa lý hoặc theo từng khu vực.

Nếu các quan sát ở gần nhau hoặc thuộc cùng một khu vực có thặng dư tương tự nhau, chẳng hạn cùng dương hoặc cùng âm, ta nghi ngờ có tự tương quan theo không gian.

Nếu thặng dư phân bố ngẫu nhiên giữa các vị trí và không tạo thành các cụm rõ ràng, ta chưa thấy dấu hiệu tự tương quan theo không gian.

Tuy nhiên, phương pháp đồ thị chỉ giúp nhận diện sơ bộ mẫu hình của thặng dư và có thể mang tính chủ quan. Vì vậy, kết luận chính thức cần dựa thêm trên các kiểm định thống kê phù hợp với loại dữ liệu.

5.4.2 4.2. Kiểm định Durbin-Watson

Kiểm định Durbin-Watson dùng để phát hiện tự tương quan bậc 1 trong thặng dư của mô hình hồi quy. Nói cách khác, kiểm định này xem thặng dư hiện tại có liên hệ tuyến tính với thặng dư ngay kỳ trước hay không.

Giả thuyết kiểm định thường được viết là:

$$H_0 : \rho = 0 \quad (\text{không có tự tương quan bậc 1})$$

$$H_1 : \rho \neq 0, \quad \text{hoặc} \quad \rho > 0, \quad \text{hoặc} \quad \rho < 0$$

tùy mục tiêu kiểm định

Trong đó:

- ρ là hệ số tự tương quan bậc 1 của sai số.
- H_0 biểu thị trường hợp không có tự tương quan bậc 1.
- H_1 biểu thị trường hợp có tự tương quan bậc 1; nếu kiểm định một phía thì có thể xét tự tương quan dương hoặc tự tương quan âm.

Sau khi ước lượng mô hình, ta lấy thặng dư e_t và tính thống kê Durbin-Watson:

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2}$$

Trong đó:

- d là thống kê Durbin-Watson.
- e_t là thặng dư tại thời điểm t .
- e_{t-1} là thặng dư tại thời điểm liền trước.
- n là số quan trắc.
- Tử số $\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2$ đo mức thay đổi giữa hai thặng dư liên tiếp.

- Mẫu số $\sum_{t=1}^n e_t^2$ là tổng bình phương thặng dư, dùng để chuẩn hóa thống kê d .

Thống kê d có giá trị trong khoảng:

$$0 \leq d \leq 4$$

Quan hệ gần đúng giữa thống kê d và hệ số tự tương quan mẫu bậc 1 là:

$$d \approx 2(1 - \hat{\rho})$$

Trong đó $\hat{\rho}$ là hệ số tự tương quan mẫu bậc 1 của thặng dư. Vì vậy:


- Nếu $\hat{\rho} \approx 0$ thì $d \approx 2$, tức chưa có dấu hiệu tự tương quan bậc 1 rõ ràng.
- Nếu $\hat{\rho} > 0$ thì $d < 2$, tức nghi ngờ tự tương quan dương.
- Nếu $\hat{\rho} < 0$ thì $d > 2$, tức nghi ngờ tự tương quan âm.
- Nếu d gần 0 thì tự tương quan dương càng mạnh; nếu d gần 4 thì tự tương quan âm càng mạnh.

5.4.3 Cách đọc kết quả bằng bảng Durbin-Watson

Trong kiểm định Durbin-Watson, để kết luận chính thức theo bảng, ta so sánh thống kê d với hai giá trị tới hạn d_L và d_U .

Trong đó:

- d_L là cận dưới của bảng Durbin-Watson.
- d_U là cận trên của bảng Durbin-Watson.
- Hai giá trị này phụ thuộc vào số quan trắc n , số biến độc lập k trong mô hình và mức ý nghĩa α .



Hình minh họa vùng quyết định của kiểm định Durbin-Watson.

Dựa vào sơ đồ vùng quyết định, ta đọc kết quả như sau:

- Nếu $0 < d < d_L$: bác bỏ H_0 , kết luận có tự tương quan dương.
- Nếu $d_L \leq d \leq d_U$: vùng không kết luận được.
- Nếu $d_U < d < 4 - d_U$: không bác bỏ H_0 , chưa có bằng chứng về tự tương quan.
- Nếu $4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$: vùng không kết luận được.
- Nếu $4 - d_L < d < 4$: bác bỏ H_0 , kết luận có tự tương quan âm.

Nói cách khác, nếu d nằm gần 0 thì nghiêng về tự tương quan dương; nếu d nằm gần 2 thì chưa có bằng chứng tự tương quan; nếu d nằm gần 4 thì nghiêng về tự tương quan âm. Với kiểm định Durbin-Watson theo bảng, cần tra d_L và d_U theo n , k và α .

Khi sử dụng R, hàm `dwtest()` trong gói `lmtest` cung cấp trực tiếp thống kê d và p -value. Vì vậy, có thể kết luận dựa trên p -value thay vì tra bảng thủ công.

Quy tắc đọc p -value là:

Nếu $p\text{-value} < \alpha$ thì bác bỏ H_0 ; nếu $p\text{-value} \geq \alpha$ thì chưa đủ cơ sở bác bỏ H_0 .

5.4.4 Hạn chế của kiểm định Durbin-Watson

Kiểm định Durbin-Watson chủ yếu phù hợp để phát hiện tự tương quan bậc 1. Nếu nghi ngờ tự tương quan bậc cao hơn, hoặc mô hình có biến phụ thuộc trễ ở vế phải, kiểm định Durbin-Watson có thể không còn phù hợp. Khi đó, kiểm định Breusch-Godfrey thường được sử dụng vì tổng quát hơn.

5.4.5 4.3. Kiểm định Breusch-Godfrey

Kiểm định Breusch-Godfrey tổng quát hơn Durbin-Watson vì có thể kiểm tra tự tương quan đến bậc p và phù hợp hơn với các mô hình động. Giả sử sai số có thể phụ thuộc vào p độ trễ:

$$\varepsilon_t = \rho_1 \varepsilon_{t-1} + \rho_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \rho_p \varepsilon_{t-p} + v_t$$

Trong đó $\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_p$ là các hệ số tự tương quan từ bậc 1 đến bậc p ; p là số độ trễ kiểm tra; v_t là nhiễu mới.

Giả thuyết kiểm định:

$$H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_p = 0$$

$$H_1 : \text{có ít nhất một } \rho_j \neq 0, \quad j = 1, 2, \dots, p$$

Vì không quan sát được ε_t , ta dùng thặng dư e_t từ mô hình gốc và chạy hồi quy phụ:

$$e_t = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1t} + \dots + \alpha_k X_{kt} + \rho_1 e_{t-1} + \dots + \rho_p e_{t-p} + v_t$$

Trong đó hồi quy phụ đưa lại các biến độc lập của mô hình gốc, rồi thêm các thặng dư trễ. Mục tiêu là kiểm tra liệu các thặng dư trễ còn giải thích được thặng dư hiện tại hay không.

Sau khi chạy hồi quy phụ, lấy R_{aux}^2 là hệ số xác định của hồi quy phụ. Thống kê LM là:

$$LM = nR_{aux}^2$$

Dưới H_0 và với mẫu đủ lớn:

$$LM \sim \chi^2(p)$$

Trong đó $\chi^2(p)$ là phân phối Chi-bình phương với p bậc tự do. Bác bỏ H_0 nếu LM lớn hơn giá trị tới hạn $\chi_{1-\alpha, p}^2$ hoặc p-value nhỏ hơn α . Khi bác bỏ H_0 , ta kết luận có bằng chứng thống kê về tự tương quan đến bậc p .

Việc chọn p không nên tùy ý. p nên dựa vào tần suất dữ liệu, bản chất bài toán hoặc đồ thị ACF/PACF của thặng dư. Ví dụ với dữ liệu tháng, $p = 12$ có thể dùng để kiểm tra phụ thuộc theo cùng tháng của năm trước, tức cấu trúc mùa vụ hằng năm.

5.4.6 4.4. Kiểm định tự tương quan trên R

Để minh họa việc phát hiện tự tương quan, mô hình hồi quy doanh thu bán hàng được ước lượng như sau:

$$\text{sales_revenue}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{advertising_cost}_t + \beta_2 \text{discount_rate}_t + \varepsilon_t$$

Trong đó, sales_revenue_t là doanh thu bán hàng tại tháng t , $\text{advertising_cost}_t$ là chi phí quảng cáo và discount_rate_t là tỷ lệ giảm giá.

Mô hình được ước lượng bằng hàm `lm()` trong R:

```
sales_model <- lm(
  sales_revenue ~ advertising_cost + discount_rate,
  data = sales_data
)
```

```
summary(sales_model)
```

```
res <- residuals(sales_model)
```

```
Call:
lm(formula = sales_revenue ~ advertising_cost + discount_rate,
    data = sales_data)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-50.104 -16.046  -1.324   13.757   58.818

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   492.9143    14.5563   33.86  <2e-16 ***
advertising_cost    4.0662     0.1399   29.07  <2e-16 ***
discount_rate    11.9758     0.2963   40.42  <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 23.72 on 117 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9556,    Adjusted R-squared:  0.9548
F-statistic: 1259 on 2 and 117 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Kết quả ước lượng thu được phương trình:

$$\widehat{\text{sales_revenue}}_t = 492.9143 + 4.0662 \text{ advertising_cost}_t + 11.9758 \text{ discount_rate}_t$$

Khi giữ các yếu tố khác không đổi, kết quả có thể được diễn giải như sau:

- Khi chi phí quảng cáo tăng một đơn vị, doanh thu ước lượng tăng trung bình khoảng 4.0662 đơn vị.
- Khi tỷ lệ giảm giá tăng một điểm phần trăm, doanh thu ước lượng tăng trung bình khoảng 11.9758 đơn vị.

Đối với từng hệ số, các p-value đều nhỏ hơn 2×10^{-16} . Vì vậy, ở mức ý nghĩa 5%, các hệ số của chi phí quảng cáo và tỷ lệ giảm giá đều có ý nghĩa thống kê.

Hệ số xác định của mô hình là:

$$R^2 = 0.9556$$

Điều này có nghĩa là khoảng 95.56% biến động của doanh thu trong dữ liệu mẫu được giải thích bởi chi phí quảng cáo và tỷ lệ giảm giá.

Kiểm định F về ý nghĩa thống kê chung của mô hình cho kết quả:

$$F = 1259$$

với p-value nhỏ hơn 2.2×10^{-16} . Do đó, ta bác bỏ giả thuyết:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$$

và kết luận rằng xét chung, chi phí quảng cáo và tỷ lệ giảm giá có ý nghĩa thống kê trong việc giải thích doanh thu bán hàng.

Sai số chuẩn thặng dư của mô hình là:

$$23.72$$

cho biết mức chênh lệch điển hình giữa doanh thu thực tế và doanh thu được mô hình ước lượng vào khoảng 23.72 đơn vị.

Nhìn chung, kết quả ban đầu cho thấy mô hình phù hợp tốt với dữ liệu mô phỏng: các hệ số ước lượng gần với giá trị được đặt trước, các biến độc lập đều có ý nghĩa thống kê, R^2 cao và kiểm định F cho thấy mô hình có ý nghĩa chung.

Kiểm định Durbin–Watson Kiểm định Durbin–Watson được thực hiện bằng hàm `dwtest()` trong gói `lmtest`:

```
library(lmtest)
```

```
dwtest(sales_model)
```

Giả thuyết kiểm định là:

$$H_0 : \rho = 0 \quad (\text{không có tự tương quan dương bậc 1})$$

$$H_1 : \rho > 0 \quad (\text{có tự tương quan dương bậc 1})$$

Kết quả kiểm định thu được:

```
Durbin-Watson test
data: sales_model
DW = 0.85328, p-value = 1.238e-10
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
```

Do p-value nhỏ hơn mức ý nghĩa 5%, ta bác bỏ giả thuyết H_0 . Ngoài ra, giá trị Durbin–Watson nhỏ hơn 2 và tương đối gần 0, cho thấy thặng dư có dấu hiệu tự tương quan dương.

Như vậy, kiểm định Durbin–Watson cung cấp bằng chứng thống kê rằng thặng dư của mô hình có tự tương quan dương bậc 1.

Kiểm định Breusch–Godfrey Để kiểm tra tự tương quan tổng quát hơn, kiểm định Breusch–Godfrey được thực hiện bằng hàm `bgtest()`.

Kiểm định tự tương quan đến bậc 1 được thực hiện như sau:

```
bgtest(sales_model, order = 1)
```

Giả thuyết kiểm định là:

$$H_0 : \rho_1 = 0$$

$$H_1 : \rho_1 \neq 0$$

Kết quả thu được:

```
Breusch-Godfrey test for serial correlation of order up to 1
data: sales_model
LM test = 39.363, df = 1, p-value = 3.519e-10
```

Do p-value nhỏ hơn 0.05, ta bác bỏ H_0 và kết luận có bằng chứng về tự tương quan đến bậc 1.

Tiếp theo, kiểm định tự tương quan đến bậc 2 được thực hiện bằng:

```
bgtest(sales_model, order = 2)
```

Giả thuyết kiểm định là:

$$H_0 : \rho_1 = \rho_2 = 0$$

$$H_1 : \text{có ít nhất một hệ số } \rho_j \neq 0, \quad j = 1, 2$$

Kết quả thu được:

```
Breusch-Godfrey test for serial correlation of order up to 2
data: sales_model
LM test = 41.823, df = 2, p-value = 8.285e-10
```

Do p-value nhỏ hơn 0.05, ta bác bỏ giả thuyết không có tự tương quan đến bậc 2.

Kết quả kiểm định bậc 2 cho thấy trong các hệ số tự tương quan ρ_1 và ρ_2 , có ít nhất một hệ số khác 0. Kết quả này không có nghĩa là riêng hệ số tự tương quan bậc 2 chắc chắn có ý nghĩa thống kê.

Kết luận Cả kiểm định Durbin–Watson và Breusch–Godfrey đều bác bỏ giả thuyết không có tự tương quan. Vì vậy, có bằng chứng thống kê mạnh cho thấy thặng dư của mô hình doanh thu bán hàng tồn tại tự tương quan dương.

Mặc dù mô hình có R^2 cao và các biến độc lập đều có ý nghĩa thống kê, sự tồn tại của tự tương quan làm cho các sai số chuẩn, p-value và kết quả suy luận OLS thông thường có thể không còn đáng tin cậy.

5.5 Tài liệu tham khảo

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic Econometrics (5th ed.). McGraw-Hill. Chapter 12: Autocorrelation: What Happens If the Error Terms Are Correlated?

Tổng Kết

Sau bốn nhóm giả định, điểm quan trọng nhất không phải là ghi nhớ thêm nhiều kiểm định, mà là biết **giả định nào đang bảo vệ phần nào của phân tích**. Giả định tuyến tính bảo vệ hàm trung bình và bản thân hệ số OLS. Giả định chuẩn tắc chủ yếu

bảo vệ suy diễn mẫu nhỏ. Giả định đồng nhất phương sai và tính độc lập của sai số bảo vệ công thức sai số chuẩn cổ điển, từ đó bảo vệ p-value, kiểm định và khoảng tin cậy.

Giả định	Phát biểu	Nếu vi phạm	Phản ứng hợp lý
Tuyến tính	$E(Y X)$ được mô tả đúng bởi dạng tuyến tính đã chọn.	Hệ số có thể chệch vì mô hình sai hàm trung bình.	Đổi mean function: thêm biến, tương tác, biến đổi, đa thức, spline hoặc mô hình phù hợp hơn.
Chuẩn của sai số	Sai số thật ε có phân phối chuẩn, thường viết $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2 I)$.	Suy diễn cổ điển có thể kém tin cậy, nhất là mẫu nhỏ hoặc có đuôi dày/ngoại lai.	Dùng Q-Q plot, kiểm định chuẩn tắc, HC3, bootstrap, robust regression hoặc mô hình khác tùy nguyên nhân.
Đồng nhất phương sai	$\text{Var}(\varepsilon_i X) = \sigma^2$ với mọi quan sát.	SE cổ điển có thể sai, làm p-value và khoảng tin cậy không đáng tin.	Dùng residuals vs fitted, Breusch–Pagan, White test, HC3/robust SE hoặc mô hình hóa lại phương sai.
Tính độc lập của sai số	$\varepsilon_i \perp \varepsilon_j X$, thường kiểm tra qua $\text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j X) = 0$ với $i \neq j$.	SE, kiểm định t/F , khoảng tin cậy và khoảng dự báo có thể sai khi sai số phụ thuộc theo thời gian/không gian.	Vẽ phần dư theo thứ tự tự nhiên, dùng Durbin–Watson/Breusch–Godfrey, thêm biến xu hướng/mùa vụ/độ trễ hoặc dùng HAC/GLS khi phù hợp.

Quy Tắc Thực Hành

Một workflow kỷ luật nên đi theo thứ tự sau:

1. Kiểm tra dạng hàm trung bình trước. Nếu residual plot còn pattern rõ ràng, đừng vội bàn sâu về normality.

2. Dùng Q-Q plot để đọc hình dạng vi phạm: lệch, đuôi nặng, outlier hay chỉ vài điểm ở đuôi.
3. Nếu normality bị reject, hỏi tiếp: mẫu nhỏ hay lớn, hệ số có ổn định không, HC3/Bootstrap CI có đổi kết luận không.
4. Nếu phần dư có hình phễu hoặc kiểm định phương sai thay đổi có p-value nhỏ, so sánh kết luận giữa SE cổ điển và HC3.
5. Nếu dữ liệu có thứ tự thời gian, không gian hoặc nhóm, vẽ phần dư theo thứ tự đó và dùng Durbin–Watson/Breusch–Godfrey khi phù hợp.
6. Nếu kết luận phụ thuộc vào một vài quan sát, kiểm tra leverage, Cook’s distance và cân nhắc robust regression hoặc mô hình khác.

Thông điệp cuối. OLS không cần normality để tính hệ số, và heteroscedasticity hay autocorrelation không tự động làm hệ số OLS bị chệch nếu hàm trung bình đúng. Tuy nhiên, các vi phạm này có thể làm suy diễn cổ điển kém tin cậy. Khi giả định yếu đi, ta không vứt mô hình ngay; ta kiểm tra nguyên nhân, đánh giá hậu quả và dùng công cụ suy diễn phù hợp hơn như HC3, bootstrap, HAC hoặc mô hình có cấu trúc phụ thuộc rõ ràng.

Tài liệu tham khảo

- [1] Trevor S. Breusch and Adrian R. Pagan. A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. *Econometrica*, 47(5):1287–1294, 1979.
- [2] Annette J. Dobson and Adrian G. Barnett. *An Introduction to Generalized Linear Models*. Chapman and Hall/CRC, 4 edition, 2018.
- [3] Julian J. Faraway. *Linear Models with R*. Chapman and Hall/CRC, 2 edition, 2016.
- [4] Francis Galton. Regression towards mediocrity in hereditary stature. *The Journal of the Anthropological Institute*, 15:246–263, 1886.
- [5] Peter J. Huber. The behavior of maximum likelihood estimates under nonstandard conditions. In *Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, volume 1, pages 221–233, 1967.
- [6] Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, and Robert Tibshirani. *An Introduction to Statistical Learning*. Springer, 2013.
- [7] Roger Koenker. A note on studentizing a test for heteroscedasticity. *Journal of Econometrics*, 17(1):107–112, 1981.
- [8] James G. MacKinnon and Halbert White. Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties. *Journal of Econometrics*, 29(3):305–325, 1985.
- [9] G. S. Maddala. *Introduction to Econometrics*. Wiley, 3 edition, 2001.
- [10] Alvin C. Rencher and G. Bruce Schaalje. *Linear Models in Statistics*. Wiley, 2 edition, 2008.
- [11] Simon Sheather. *A Modern Approach to Regression with R*. Springer, 2009.
- [12] Sanford Weisberg. *Applied Linear Regression*. Wiley, 4 edition, 2014.
- [13] Halbert White. A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. *Econometrica*, 48(4):817–838, 1980.
- [14] Jeffrey M. Wooldridge. *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. Cengage Learning, 6 edition, 2015.