TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LÂM SÀNG BÁC SĨ NHI KHOA

LÂM SÀNG NHI & Y6

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC TIỀN SỬ TIÊM CHỦNG Ở TRẺ EM VIỆT NAM

Phiên bản: 2026.1

Bộ câu hỏi lâm sàng từng bước theo mốc lứa tuổi • Kỹ thuật đối soát ngôn ngữ phụ huynh • Nhận diện cờ đỏ

3 NGUYÊN TẮC VÀNG KHI HỎI TIỀN SỬ TIÊM CHỦNG:

1. **Không hỏi tắt bằng tên chuyên môn:** Phụ huynh không nhớ DPT, Hib, IPV hay PCV. Phải dùng từ gợi tả: "*mũi bắp tay*", "*nhỏ giọt vào miệng*", "*mũi tiêm ở đùi*".
2. **Phân luồng nguồn tiêm ngay từ đầu:** Tiêm Trạm Y tế xã/phường (TCMR mở rộng - miễn phí) hay Tiêm Dịch vụ (VNVC, Potec, Safpo, viện Pasteur).
3. **Tìm kiếm sẹo BCG trên cơ delta trái:** Mọi cuộc khám lâm sàng đều phải trực tiếp quan sát vết sẹo tiêm phòng lao.

BƯỚC 1: THIẾT LẬP KHUNG NGUỒN TIÊM & BẰNG CHỨNG XÁC THỰC

BƯỚC ĐẦU TIÊN

1.1. "Gia đình có mang theo Sổ tiêm chủng của bé hoặc có cài ứng dụng 'Sổ sức khỏe điện tử / App VNVC' trên điện thoại không?"

🎯 **Ý nghĩa:** Nếu có sổ/app, đối soát trực tiếp ngày tháng và tên thương mại vắc xin, tránh mất thời gian hỏi suy đoán.

1.2. "Từ bé đến giờ, bé được tiêm ở Trạm y tế phường/xã (ngày tiêm cố định hàng tháng) hay tiêm tại các trung tâm dịch vụ như VNVC, phòng tiêm dịch vụ?"

🎯 **Ý nghĩa:** Phân định nhanh phác đồ vắc xin: Trạm Y tế dùng 5 trong 1 (DPT-VGB-Hib) + uống OPV; Dịch vụ dùng 6 trong 1 (Infanrix Hexa/Hexaxim) + phế cầu + rota.

BƯỚC 2: MỐC SƠ SINH (TRONG 24 GIỜ ĐẦU & THÁNG ĐẦU SAU SINH)

SƠ SINH

2.1. (Viêm gan B sơ sinh): "Sau khi sinh trong 24 giờ đầu tại viện sản, bé có được tiêm 1 mũi ở bắp đùi trước khi về phòng nằm với mẹ không?"

🎯 **Ý nghĩa:** Đánh giá nguy cơ lây truyền virus viêm gan B chu sinh từ mẹ sang con.

2.2. (Lao - BCG): "Lúc mới sinh trong tháng đầu, bé có được tiêm 1 mũi ở bắp tay trái không? Cho bác sĩ xem bắp tay trái của bé xem có vết sẹo nhỏ nào không?"

🎯 **Ý nghĩa & Khám:** Sau 3-4 tuần nốt tiêm mưng mủ rồi tạo sẹo lõm. Không có sẹo + không rõ tiền sử = Trẻ chưa có miễn dịch bảo vệ Lao màng não/Lao kê!

BƯỚC 3: MỐC 2 – 3 – 4 THÁNG TUỔI (TRỤC MIỄN DỊCH BẢO VỆ THEN CHỐT)

2 - 3 - 4 THÁNG

3.1. (Mũi phối hợp 5 trong 1 hoặc 6 trong 1):

- *Nếu tiêm Dịch vụ:* "Lúc bé 2, 3, 4 tháng tuổi, mỗi tháng có tiêm 1 mũi 6 trong 1 ở đùi không? Đã tiêm đủ 3 mũi chưa?"
- *Nếu tiêm Trạm Y tế:* "Lúc 2, 3, 4 tháng, bé có tiêm mũi 5 trong 1 ở đùi và có NHỎ THUỐC BẠI LIỆT vào miệng không?"

🎯 **Ý nghĩa:** Phòng Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, VGB, Hib (và Bại liệt). Cực kỳ quan trọng ở trẻ viêm phổi: Hib gây viêm nắp thanh môn, viêm phổi hoại tử.

3.2. (Bại liệt tiêm IPV - Với trẻ tiêm Trạm y tế): "Lúc bé được 5 tháng tuổi, trạm có tiêm thêm 1 mũi bại liệt ở bắp đùi không?"

🎯 **Ý nghĩa:** Đối soát mũi tiêm bại liệt bất hoạt (IPV) theo lịch của Bộ Y tế.

3.3. (Phế cầu khuẩn - Synflorix / Prevenar 13): "Gia đình có tiêm mũi ngừa Phế cầu (viêm tai giữa, viêm phổi, viêm màng não do phế cầu) cho bé không? Đã tiêm mấy mũi?"

🎯 **Ý nghĩa cốt lõi:** Trẻ viêm phổi đã tiêm phế cầu ít nguy cơ nhiễm *S. pneumoniae* kháng thuốc thể xâm lấn.

3.4. (Rota virus): "Trước 6 tháng tuổi, bé có được cho uống vắc xin phòng tiêu chảy do Rota virus (loại 2 liều Rotarix hoặc 3 liều RotaTeq) không?"

BƯỚC 4 & 5: MỐC 6 – 9 – 12 – 18 THÁNG (SỞI, CÚM, VIÊM NÃO NHẬT BẢN & MŨI NHẮC) 6 ĐẾN 24 THÁNG

4.1. (Mốc 9 tháng - Sởi đơn / Sởi phối hợp): "Lúc tròn 9 tháng, bé có được tiêm mũi Sởi đơn ở trạm y tế hay mũi 3 trong 1 Sởi - Quai bị - Rubella ở trung tâm dịch vụ không?"

🚨 **Cờ đỏ viêm phổi:** Trẻ sốt phát ban, viêm long kèm tổn thương phổi chưa tiêm sởi $ ightarrow$ Cảnh giác ngay Sởi biến chứng viêm phổi nặng!

4.2. (Viêm não Nhật Bản - Lúc 12 tháng): "Lúc bé tròn 1 tuổi, gia đình có tiêm mũi Viêm não Nhật Bản không? Tiêm loại của nhà nước 3 mũi (Jevax) hay loại dịch vụ 1 mũi (Imojev)?"

5.1. (Mũi nhắc lại lúc 18-24 tháng): "Lúc 18 tháng đến 2 tuổi, bé có tiêm nhắc lại mũi Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván (DPT) và mũi Sởi - Rubella (MR) chưa?"

🎯 **Ý nghĩa:** Kháng thể từ 3 mũi đầu giảm sau 1 năm; thiếu mũi nhắc này trẻ rất dễ bùng phát Ho gà hoặc Bạch hầu ác tính.

BƯỚC 6: TẦM SOÁT PHẢN ỨNG NẶNG SAU TIÊM & LÝ DO CHẬM LỊCH AN TOÀN TIÊM CHỦNG

6.1. "Những lần tiêm trước, bé có từng bị sốt co giật, tím tái, khó thở, nổi mày đay khắp người, khóc thét không dỗ được nhiều giờ hay phải vào viện cấp cứu không?"

🎯 **Ý nghĩa:** Nhận diện tiền sử phản vệ, co giật sau tiêm ho gà toàn tế bào để chuyển sang vắc xin vô bào hoặc xử trí chống chỉ định.

6.2. "Gần đây bé có bị bỏ lỡ hay hoãn mũi tiêm nào không? Lý do vì sao (trẻ ốm, trạm hết vắc xin, hay gia đình quên)?"

BẢNG TRA CỨU ĐỐI CHIẾU: TỪ NGỮ PHỤ HUYNH ↔ THUẬT NGỮ Y KHOA

Mô tả từ phụ huynh	Thuật ngữ / Tên vắc xin	Bệnh phòng ngừa	Chương trình
"Mũi tiêm bắp tay trái lúc mới đẻ, có sẹo"	**BCG**	Lao (Lao màng não, Lao kê)	TCMR
"Mũi tiêm ở đùi ngày đầu sau đẻ tại viện sản"	**HepB sơ sinh**	Viêm gan virus B chu sinh	TCMR
"Mũi 5 trong 1 của trạm y tế + uống thuốc"	**DPT - VGB - Hib + OPV**	Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, VGB, Hib + Bại liệt	TCMR
"Mũi 6 trong 1 tiêm dịch vụ ở đùi"	**Infanrix Hexa / Hexaxim**	6 bệnh (thêm Bại liệt dạng tiêm IPV)	Dịch vụ
"Mũi ngừa phế cầu / viêm tai / viêm phổi"	**Synflorix / Prevenar 13**	*Streptococcus pneumoniae* (phế cầu)	Dịch vụ
"Thuốc nhỏ tiêu chảy uống trước 6 tháng"	**Rotarix / RotaTeq / Rotavin**	Tiêu chảy cấp do Rota virus	Dịch vụ / TCMR mới
"Mũi sởi lúc 9 tháng ở trạm"	**MV (Measles Vaccine)**	Sởi đơn chủng	TCMR
"Mũi sởi - quai bị - rubella lúc 1 tuổi"	**MMR / MMR II / Priorix**	Sởi, Quai bị, Rubella	Dịch vụ
"Mũi viêm não tiêm 3 mũi / tiêm 1 mũi dịch vụ"	**Jevax (3 liều) / Imojev (sống)**	Viêm não Nhật Bản	TCMR & DV
"Mũi tiêm nhắc lại 18 tháng ở trạm"	**DPT4 + MR (Sởi - Rubella)**	Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván + Sởi, Rubella	TCMR