

KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH MEDXY VER 2

Hướng Dẫn Đọc Kết Quả Khí Máu Động Mạch (ABG) và Giải Thích Theo Sinh Lý Lâm Sàng

****Phiên bản nâng cao — Bổ sung rối loạn hỗn hợp, khoảng trống anion và delta/delta ratio****

Mục Tiêu Học Tập

Sau khi hoàn thành bài giảng này, người học sẽ có khả năng:

- **Nhận diện**** 6 thông số chuẩn của khí máu động mạch (ABG) và khoảng giá trị bình thường tương ứng
- **Áp dụng**** quy trình 6 bước có hệ thống để diễn giải kết quả ABG
- **Phân biệt**** rối loạn toan kiềm nguồn gốc hô hấp và chuyển hóa
- **Đánh giá**** mức độ bù trừ (chưa bù, bù một phần, bù hoàn toàn) dựa trên mối tương quan giữa pH, PaCO_2 và HCO_3^-
- **Nhận diện và phân tích**** rối loạn hỗn hợp (mixed acid-base disorders) — bao gồm toan hô hấp + kiềm chuyển hóa
- **Tính toán và ứng dụng**** khoảng trống anion (anion gap) và delta/delta ratio trong chẩn đoán phân biệt
- **Giải thích**** cơ chế sinh lý bệnh đằng sau từng dạng rối loạn toan kiềm

Phần 1: Đại Cương và Ý Nghĩa Lâm Sàng

1.1 Khái niệm cơ bản

Cân bằng toan kiềm (acid-base balance) phản ánh trạng thái ****homeostasis của nồng độ ion hydro (H^+)**** trong dịch cơ thể, được biểu thị qua chỉ số pH [1]. Khoảng pH bình thường của máu động mạch là ****7,35–7,45**** [1][4].

Khái niệm	Định nghĩa	pH
Toan (Acidosis)	Tăng nồng độ H^+ (chất cho H^+)	< 7,35
Kiềm (Alkalosis)	Giảm nồng độ H^+ (chất nhận H^+)	> 7,45

*⚠ ****Lưu ý quan trọng****: pH bình thường ****không loại trừ**** rối loạn toan kiềm tiềm ẩn. pH có thể trở về bình thường sau một thời gian nhờ cơ chế bù trừ, mặc dù bất thường sinh lý vẫn tồn tại [1][7].*

1.2 Vai trò của ABG trong thực hành lâm sàng

Phân tích khí máu động mạch (Arterial Blood Gas - ABG) là xét nghiệm ****bắt buộc**** để chẩn đoán suy hô hấp và các rối loạn toan kiềm [5]. Các chỉ định chính bao gồm [4]:

- Thiếu oxy nghiêm trọng hoặc không giải thích được (ví dụ: viêm phổi, thuyên tắc phổi)
- Phân biệt suy hô hấp type 1 (PaO_2 giảm, PaCO_2 bình thường/thấp) và type 2 (PaCO_2 tăng)
- Xác nhận ứ đọng CO_2 /nhiễm CO_2 (ví dụ: COPD, giảm thông khí)
- Hướng dẫn hỗ trợ hô hấp và cai máy thở
- Đánh giá nhu cầu liệu pháp oxy dài hạn

1.3 Chống chỉ định lấy mẫu ABG

- **Không** lấy mẫu khi không có tuần hoàn bàng hệ (thực hiện test Allen cải biên) [4]
- **Không bao giờ** lấy mẫu từ vị trí có dò động-tĩnh mạch (arteriovenous fistula) dùng cho chạy thận [4]

1.4 Sáu thông số của ABG


Thông số	Khoảng bình thường	Ý nghĩa
pH	7,35–7,45	Cân bằng toan kiềm tổng thể [1][4]
PaCO₂	35–45 mm Hg (4,5–6,5 kPa)	Thành phần hô hấp [1][4]
HCO₃⁻	22–26 mEq/L	Thành phần chuyển hóa [1]
Base excess (BE)	-2 đến +2 mEq/L	Thành phần chuyển hóa (thay thế) [4][9]
PaO₂	80–100 mm Hg	Tình trạng oxy hóa máu [4]
SaO₂	95–100%	Độ bão hòa oxy hemoglobin [9]

Mẹo ghi nhớ: pH và PaCO₂ phản ánh hệ hô hấp; HCO₃⁻ và BE phản ánh hệ chuyển hóa (thận).

Lưu ý về BE: Base excess (BE) là cách trình bày thay thế cho thành phần chuyển hóa của rối loạn toan kiềm. BE dương (+) biểu thị kiềm chuyển hóa, BE âm (-) biểu thị toan chuyển hóa [4][9].

Phần 2: Quy Trình 6 Bước Diễn Giải ABG

2.1 Sơ đồ tổng quan



```

D4 -->|"Không"| Mixed1["Rối loạn hỗn hợp<br>cần đánh giá thêm"]
Alk --> D5{"PaCO2<br>< 35 mm Hg?"}
D5 -->|"Có"| RespAlk["Kiềm hô hấp<br>(Respiratory Alkalosis)"]
D5 -->|"Không"| D6{"HCO3-<br>> 26 mEq/L?"}
D6 -->|"Có"| MetaAlk["Kiềm chuyển hóa<br>(Metabolic Alkalosis)"]
D6 -->|"Không"| Mixed2["Rối loạn hỗn hợp<br>cần đánh giá thêm"]
end
subgraph Phase3["Giai đoạn 3: Đánh giá bù trừ"]
direction TB
RespAcid --> D7{"HCO3- tăng<br>(bù trừ chuyển hóa)?"}
D7 -->|"Có"| Comp1["Bù trừ một phần<br>hoặc hoàn toàn"]
D7 -->|"Không"| NoComp1["Chưa có bù trừ<br>(cấp tính)"]
MetaAcid --> D8{"PaCO2 giảm<br>(bù trừ hô hấp)?"}
D8 -->|"Có"| Comp2["Bù trừ một phần<br>hoặc hoàn toàn"]
D8 -->|"Không"| NoComp2["Chưa có bù trừ<br>(cấp tính)"]
RespAlk --> D9{"HCO3- giảm<br>(bù trừ chuyển hóa)?"}
D9 -->|"Có"| Comp3["Bù trừ một phần<br>hoặc hoàn toàn"]
D9 -->|"Không"| NoComp3["Chưa có bù trừ<br>(cấp tính)"]
MetaAlk --> D10{"PaCO2 tăng<br>(bù trừ hô hấp)?"}
D10 -->|"Có"| Comp4["Bù trừ một phần<br>hoặc hoàn toàn"]
D10 -->|"Không"| NoComp4["Chưa có bù trừ<br>(cấp tính)"]
end
subgraph Phase4["Giai đoạn 4: Đánh giá oxy hóa máu"]
direction TB
Step1 --> D11{"PaO2<br>80 – 100 mm Hg?"}
D11 -->|"PaO2 < 60 mm Hg<br>hoặc SaO2 < 90%"| Hypox["Thiếu oxy máu<br>(Hypoxemia)"]
D11 -->|"Bình thường"| NormOx["Oxy hóa máu<br>bình thường"]
Hypox --> D12{"Có tăng<br>thông khí?"}
D12 -->|"PaCO2 thấp"| Type1["Suy hô hấp type I<br>(giảm oxy, bình thường/giảm CO2)"]
D12 -->|"PaCO2 cao"| Type2["Suy hô hấp type II<br>(tăng CO2, giảm oxy)"]
end
subgraph Phase5["Giai đoạn 5: Tổng hợp và giải thích sinh lý"]
direction TB
Comp1 --> Summary["Tổng hợp kết quả<br>theo cơ chế sinh lý"]
Comp2 --> Summary
Comp3 --> Summary
Comp4 --> Summary
NoComp1 --> Summary
NoComp2 --> Summary
NoComp3 --> Summary

```

```

NoComp4 --> Summary
Type1 --> Summary
Type2 --> Summary
NormOx --> Summary
Summary --> D13{"Có rối loạn<br>hỗn hợp?"}
D13 -->|"Có"| MDT["Hội chẩn chuyên khoa<br>Hô hấp / Hồi sức"]
D13 -->|"Không"| D14{"Cần điều chỉnh<br>theo lâm sàng?"}
D14 -->|"Có"| Treat["Xử trí theo nguyên nhân<br>và mức độ rối loạn"]
D14 -->|"Không"| Monitor["Theo dõi và<br>đánh giá lại ABG"]
end
Treat --> End(("Kết thúc<br>Ghi nhận kết quả"))
Monitor --> End
MDT --> End
...

```

2.2 Chi tiết từng bước

Bước 1: Đánh giá pH — Toan hay Kiềm?

- pH < 7,35 → **Toan máu (Acidemia)** [1]
- pH > 7,45 → **Kiềm máu (Alkalemia)** [1]
- pH 7,35–7,45 → Bình thường, **nhưng** cần xác định pH nằm ở phía toan hay kiềm của 7,40 (giá trị tuyệt đối bình thường) [7]

*⚠️ **Lưu ý:** Ngay cả khi pH nằm trong khoảng bình thường, việc xác định pH ở phía toan (< 7,40) hay kiềm (> 7,40) của giá trị 7,40 là rất quan trọng để phát hiện rối loạn đang được bù trừ [7].*

Bước 2: Đánh giá PaCO₂ — Thành phần hô hấp

- PaCO₂ > 45 mm Hg → **Toan hô hấp** (tăng CO₂) [1][5]
- PaCO₂ < 35 mm Hg → **Kiềm hô hấp** (giảm CO₂)
- PaCO₂ 35–45 mm Hg → Bình thường

Bước 3: Đánh giá HCO₃⁻ — Thành phần chuyển hóa

- HCO₃⁻ < 22 mEq/L → **Toan chuyển hóa** (giảm bicarbonate) [1]
- HCO₃⁻ > 26 mEq/L → **Kiềm chuyển hóa** (tăng bicarbonate) [1][5]
- HCO₃⁻ 22–26 mEq/L → Bình thường

Bước 4: Xác định rối loạn nguyên phát

Nguyên tắc: Thông số (PaCO₂ hoặc HCO₃⁻) thay đổi **cùng hướng** với pH là thông số phản ánh rối loạn nguyên phát [1][7].

pH	PaCO ₂	HCO ₃ ⁻	Rối loạn nguyên phát
↓ Toan	↑ Cao	Bình thường	Toan hô hấp
↓ Toan	Bình thường	↓ Thấp	Toan chuyển hóa
↑ Kiềm	↓ Thấp	Bình thường	Kiềm hô hấp

↑ Kiềm

Bình thường

↑ Cao

Kiểm chuyển hóa

💡 ****Phương pháp tiếp cận**** [7]:

1. Đặt câu hỏi: "Nếu rối loạn nguyên phát là hô hấp, PaCO_2 sẽ cao hay thấp?"
2. Sử dụng nguyên tắc sinh lý: PaCO_2 được coi là acid $\rightarrow$ Toan hô hấp khi PaCO_2 cao ($> 40 \text{ mm Hg}$), Kiềm hô hấp khi PaCO_2 thấp
3. Xác nhận giá trị PaCO_2 thực tế từ ABG
4. Lập lại tương tự cho HCO_3^- (được coi là base): Toan chuyển hóa khi HCO_3^- thấp ($< 24 \text{ mEq/L}$), Kiềm chuyển hóa khi HCO_3^- cao
5. Nếu cả hai đều bất thường $\rightarrow$ ****Rối loạn hỗn hợp**** [7]

Bước 5: Đánh giá bù trừ

****Nguyên tắc sinh lý****: Hệ thống ****đối lập**** với rối loạn nguyên phát sẽ cố gắng bù trừ [1][7]:

- Rối loạn hô hấp $\rightarrow$ ****Thận**** bù trừ (tăng/giảm tái hấp thu HCO_3^-)
- Rối loạn chuyển hóa $\rightarrow$ ****Phổi**** bù trừ (tăng/giảm thông khí để điều chỉnh CO_2)

Mức độ bù trừ	Đặc điểm
Chưa bù (Uncompensated)	Thông số đối lập nằm trong khoảng bình thường [10]
Bù một phần (Partially compensated)	Có bù trừ nhưng pH vẫn bất thường [10]
Bù hoàn toàn (Fully compensated)	Có bù trừ và pH đã trở về bình thường [10]

⚠ ****Lưu ý quan trọng****: Cơ thể ****không bao giờ bù trừ quá mức**** (overcompensate) [10].

****Công thức bù trừ dự kiến**** [1-2][7]:

Rối loạn	Công thức bù trừ dự kiến
Toan chuyển hóa	Giảm HCO_3^- 1 mEq/L $\rightarrow$ Giảm PaCO_2 1,2 mm Hg [1]
Toan hô hấp cấp	Tăng PaCO_2 10 mm Hg $\rightarrow$ Tăng HCO_3^- 1 mEq/L ($0,1 \times \Delta\text{PaCO}_2$) [2]
Toan hô hấp mạn	Tăng PaCO_2 10 mm Hg $\rightarrow$ Tăng HCO_3^- 3,5 mEq/L ($0,35 \times \Delta\text{PaCO}_2$) [1-2]
Kiềm chuyển hóa	Tăng HCO_3^- 1 mEq/L $\rightarrow$ Tăng PaCO_2 0,7 mm Hg [1]
Kiềm hô hấp cấp	Giảm PaCO_2 10 mm Hg $\rightarrow$ Giảm HCO_3^- 2 mEq/L ($0,2 \times \Delta\text{PaCO}_2$) [2]
Kiềm hô hấp mạn	Giảm PaCO_2 10 mm Hg $\rightarrow$ Giảm HCO_3^- 5 mEq/L ($0,5 \times \Delta\text{PaCO}_2$) [1-2]

⚠️ ****Lưu ý quan trọng****: Nếu mức độ thay đổi của thông số bù trừ ****vượt quá**** dự kiến → Gợi ý ****rối loạn hỗn hợp**** [1][7].

Bước 6: Đánh giá oxy hóa máu

- $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mm Hg}$ hoặc $\text{SaO}_2 < 90\%$ → ****Thiếu oxy máu (Hypoxemia)**** — vấn đề đáng kể về mặt lâm sàng [7]
- Luôn xem xét mức FiO_2 mà bệnh nhân đang nhận khi lấy mẫu ABG [4][7]

Phần 3: Các Rối Loạn Toan Kiềm Đơn Thuần

3.1 Toan hô hấp (Respiratory Acidosis)

****Cơ chế sinh lý bệnh****: Giảm thông khí phế nang dẫn đến ****ứ đọng CO_2 **** [1-2].

Thông số	Giá trị
pH	$< 7,35$ [1][5]
PaCO_2	$> 45 \text{ mm Hg}$ [1][5]
HCO_3^-	Bình thường (chưa bù) hoặc $> 26 \text{ mEq/L}$ (đã bù) [5]

****Nguyên nhân thường gặp**** [1][7]:

Nhóm nguyên nhân	Ví dụ
Mất trung tâm hô hấp	Nhiễm trùng CNS, khối u, thuốc (opioid, an thần), rượu [1][7]
Yếu cơ hô hấp	Rối loạn thần kinh cơ mạn tính, liệt cơ hô hấp cấp [1]
Bệnh lý phổi	COPD, hen, viêm phổi, phù phổi, ARDS [7]
Tắc nghẽn đường thở	Hen, COPD [7]
Bất thường tưới máu	Thuyên tắc phổi, ngừng tim [7]

****Cơ chế bù trừ****: Thận tăng tái hấp thu HCO_3^- và tăng bài tiết H^+ (dưới dạng NH_4^+ và acid titratable) [1-2]. Bù trừ bắt đầu trong ****6–12 giờ****, bù trừ hoàn toàn có thể mất ****3–5 ngày**** [1].

****Tỷ lệ bù trừ dự kiến****:

- Cấp tính: Tăng PaCO_2 10 mm Hg → tăng HCO_3^- 1 mEq/L [2]
- Mạn tính: Tăng PaCO_2 10 mm Hg → tăng HCO_3^- $3,5 \text{ mEq/L}$ [1-2]

****Biểu hiện lâm sàng**** [1]:

- Dấu hiệu suy hô hấp do nguyên nhân nguyên phát
- Dấu hiệu tăng CO_2 (CO_2 narcosis): đau đầu, nôn, rối loạn tri giác — do giãn mạch não và tăng áp lực nội sọ

3.2 Kiềm hô hấp (Respiratory Alkalosis)

****Cơ chế sinh lý bệnh**:** Tăng thông khí phế nang dẫn đến ****thải CO₂ quá mức**** [1-2].

Thông số	Giá trị
pH	> 7,45 [1]
PaCO ₂	< 35 mm Hg
HCO ₃ ⁻	Bình thường (chưa bù) hoặc < 22 mEq/L (đã bù)

****Nguyên nhân thường gặp**** [1][7]:

Nhóm nguyên nhân	Ví dụ
Kích thích CNS	Lo âu, đau, sốt, nhiễm trùng huyết, mang thai, salicylate [7]
Thiếu oxy	Viêm phổi, suy tim sung huyết, phù phổi, thuyên tắc phổi, độ cao [7]
Thông khí cơ học	Thông khí quá mức [1]
Nguyên nhân tâm lý	Hysteria, tăng thông khí do lo âu [1]

****Cơ chế bù trừ**:** Thận giảm tái hấp thu HCO₃⁻ và tăng bài tiết HCO₃⁻ qua nước tiểu kèm cation (chủ yếu Na⁺) [2]. Bù trừ hoàn tất trong vài ngày [7].

****Tỷ lệ bù trừ dự kiến**:**

- Cấp tính: Giảm PaCO₂ 10 mm Hg → giảm HCO₃⁻ 2 mEq/L [2]
- Mạn tính: Giảm PaCO₂ 10 mm Hg → giảm HCO₃⁻ 5 mEq/L [1-2]

****Biểu hiện lâm sàng**** [1]:

- Tăng thông khí do nguyên nhân nguyên phát
- Dấu hiệu hạ canxi máu: kích thích thần kinh cơ, dị cảm quanh miệng, tetany do kiềm — vì kiềm máu thúc đẩy canxi gắn với albumin, dẫn đến hạ canxi ion hóa

3.3 Toan chuyển hóa (Metabolic Acidosis)

****Cơ chế sinh lý bệnh**:** Giảm HCO₃⁻ do mất qua đường tiêu hóa/thận hoặc do sử dụng quá mức để trung hòa H⁺ trong quá trình đệm [1].

Thông số	Giá trị
pH	< 7,35 [1]
HCO ₃ ⁻	< 22 mEq/L [1]
PaCO ₂	Bình thường (chưa bù) hoặc < 35 mm Hg (đã bù)

****Phân loại theo khoảng trống anion (Anion Gap)** [1][4]:**

Loại	Đặc điểm	Nguyên nhân
Anion gap bình thường (Toan tăng clo máu)	Mất HCO_3^- qua thận/tiêu hóa	Tiêu chảy, RTA type I/IV, suy thận, thuốc lợi tiểu giữ kali, TPN, ngộ độc ammonium chloride [1]
Anion gap tăng	Tích tụ acid nội/ngoại sinh	Nhiễm ceton (đái tháo đường), tăng acid lactic, suy thận, ngộ độc methanol/ethylene glycol/salicylate [4]

💡 ****Mẹo ghi nhớ "KUSMALE"*** cho toan chuyển hóa anion gap tăng [4]:**

- ****K**etoacidosis** (nhiễm ceton)
- ****U**rea** (tăng urê máu/suy thận)
- ****S**ugar** (tăng đường huyết)
- ****M**ethanol** (ngộ độc methanol)
- ****A**lcohol** (ngộ độc rượu)
- ****L**actic acidosis** (tăng acid lactic — kém tươi máu, nhiễm trùng huyết, thiếu máu ruột)
- ****E**thylene glycol** (ngộ độc chống đông)

****Cơ chế bù trừ**:** Phổi tăng thông khí để thải CO_2 (thở nhanh sâu - Kussmaul) [1][9]. Bù trừ diễn ra ****nh nhanh**** (trong vài phút đến vài giờ) [4].

****Tỷ lệ bù trừ dự kiến**:** Giảm HCO_3^- 1 mEq/L → giảm PaCO_2 1,2 mm Hg [1].

3.4 Kiểm chuyển hóa (Metabolic Alkalosis)

****Cơ chế sinh lý bệnh**:** Tăng HCO_3^- do mất acid qua dạ dày hoặc thận [1][3].

Thông số	Giá trị
pH	> 7,45 [1]
HCO_3^-	> 26 mEq/L [1]
PaCO_2	Bình thường (chưa bù) hoặc > 45 mm Hg (đã bù)

****Nguyên nhân thường gặp** [1][3][7]:**

- Nôn kéo dài, hút dịch dạ dày (mất H^+ và Cl^-) [3][7]
- Dùng lợi tiểu (tăng bài tiết aldosterone và Cl^-) [7]
- Hạ kali máu, hạ clo máu nặng [3]
- Hội chứng Cushing, thừa mineralocorticoid
- Truyền bicarbonate, hội chứng sữa-kiềm (milk-alkali syndrome), truyền máu lượng lớn (máu citrate) [1]

****Phân loại theo đáp ứng với chloride** [1][7]:**

Loại	Cl^- nước tiểu	Nguyên nhân	Xử trí
------	-------------------------	-------------	--------

Đáp ứng chloride (Chloride-responsive)	< 10 mEq/L	Nôn, hút dịch dạ dày, lợi tiểu [1][7]	Bù dịch muối sinh lý + KCl [1]
Kháng chloride (Chloride-resistant)	> 20 mEq/L	Thừa mineralocorticoid, hạ kali máu [1]	Acetazolamide, HCl IV, lọc máu [1]

****Cơ chế bù trừ****: Phổi giảm thông khí để giữ CO_2 — đây là cơ chế bù trừ ****kém hoàn hảo nhất**** trong 4 loại, vì giảm thông khí quá mức sẽ gây thiếu oxy [8].

****Tỷ lệ bù trừ dự kiến****: Tăng HCO_3^- 1 mEq/L → tăng PaCO_2 0,7 mm Hg [1].

****Biểu hiện lâm sàng**** [1]:

- Thở nông do ức chế hô hấp bù trừ
- Dấu hiệu hạ canxi máu: kích thích thần kinh cơ, dị cảm quanh miệng, tetany do kiềm

Phần 4: Rối Loạn Hỗn Hợp (Mixed Acid-Base Disorders) — ****NỘI DUNG BỔ SUNG****

4.1 Khái niệm

Rối loạn hỗn hợp xảy ra khi ****hai hoặc nhiều rối loạn toan kiềm nguyên phát**** đồng thời tồn tại [3][6-7]. Rối loạn hỗn hợp ****rất phổ biến**** trong thực hành lâm sàng [6].

****Cách nhận diện**** [7]:

- Nếu rối loạn nguyên phát dường như ****cả hô hấp và chuyển hóa**** → Rối loạn hỗn hợp
- Cả PaCO_2 và HCO_3^- đều bất thường ****cùng hướng**** với pH
- Mức độ thay đổi của thông số bù trừ ****vượt quá**** tỷ lệ dự kiến

4.2 Các dạng rối loạn hỗn hợp

Loại hỗn hợp	pH	PaCO_2	HCO_3^-	BE	AG
Toan hô hấp + Kiềm chuyển hóa	↑ / ↓ / bình thường	↑	↑	(+) ↑	-
Toan hô hấp + Toan chuyển hóa	↓↓	↑ / ↓ / bình thường	↓ / bình thường / ↑	(-) ↑	↑
Kiềm hô hấp + Kiềm chuyển hóa	↑↑	↓	↑	(+) ↑	-
Kiềm hô hấp + Toan chuyển hóa	↑ / bình thường	↓	↓	(-) ↑	↑

Nguồn: [3]

4.3 Toan hô hấp + Kiềm chuyển hóa — **Phân tích chi tiết**

****Cơ chế sinh lý bệnh**** [3]:

- Giảm thông khí phế nang và ứ đọng $\text{CO}_2 \rightarrow$ Toan hô hấp
- HCO_3^- tăng không tương xứng với mức bù trừ dự kiến $\rightarrow$ Kiềm chuyển hóa đi kèm

****Nguyên nhân thường gặp**** [3]:

- Bệnh nhân COPD (toan hô hấp mạn) dùng lợi tiểu $\rightarrow$ hạ kali máu, hạ clo máu $\rightarrow$ kiềm chuyển hóa
- Bệnh phổi mạn tính + nôn kéo dài
- Suy hô hấp mạn + hút dịch dạ dày

****Đặc điểm ABG**** [3]:

- PaCO_2 , HCO_3^- và $\text{CO}_2\text{-CP}$ đều tăng rõ rệt
- HCO_3^- có thể ****vượt quá giới hạn bù trừ dự kiến****: HCO_3^- thực tế $> 24 + (\Delta\text{PaCO}_2 \times 0,35) + 5,58$
- BE dương tăng lớn
- pH có thể bình thường, tăng hoặc giảm — tùy thuộc rối loạn nào chiếm ưu thế

****Ví dụ lâm sàng****:

Thông số	Giá trị	Đánh giá
pH	7,45	Bình thường (phía kiềm)
PaCO_2	52 mm Hg	$\uparrow$ Cao (toan hô hấp)
HCO_3^-	36,1 mmol/L	$\uparrow$ Cao (kiềm chuyển hóa)
BE	+12,1 mmol/L	$\uparrow$ Cao (kiềm chuyển hóa)

****Phân tích****:

1. pH = 7,45 $\rightarrow$ Bình thường, phía kiềm
2. $\text{PaCO}_2 = 52$ mm Hg (> 45) $\rightarrow$ Toan hô hấp
3. $\text{HCO}_3^- = 36,1$ mmol/L (> 26) $\rightarrow$ Kiềm chuyển hóa
4. ****Kiểm tra bù trừ cho toan hô hấp mạn****: HCO_3^- dự kiến = $24 + (0,35 \times 12) = 28,2$ mmol/L $\rightarrow$ HCO_3^- thực tế (36,1) ****vượt quá**** dự kiến $\rightarrow$ Có kiềm chuyển hóa đi kèm
5. ****Kiểm tra bù trừ cho kiềm chuyển hóa****: PaCO_2 dự kiến = $40 + (0,7 \times 12) = 48,4$ mm Hg $\rightarrow$ PaCO_2 thực tế (52) ****vượt quá**** dự kiến $\rightarrow$ Có toan hô hấp đi kèm
6. ****Kết luận****: Rối loạn hỗn hợp — Toan hô hấp + Kiềm chuyển hóa, kiềm chuyển hóa chiếm ưu thế (pH phía kiềm)

4.4 Toan hô hấp + Toan chuyển hóa (Respiratory Acidosis + Metabolic Acidosis)

****Cơ chế sinh lý bệnh**** [2-3][5]:

- Giảm thông khí phế nang (toan hô hấp) + tăng sản xuất acid không bay hơi hoặc giảm bài tiết acid cố định (toan chuyển hóa) [2]
- ****Nguy hiểm****: Rối loạn này tạo ra ****độ lệch pH nguy hiểm**** vì giảm thông khí (toan hô hấp) ****không cho phép**** tăng thông khí thích nghi cần thiết cho toan chuyển hóa [5]
- HCO_3^- thấp do toan chuyển hóa ****chặn**** sự gia tăng HCO_3^- dự kiến trong toan hô hấp [5]

****Nguyên nhân thường gặp**** [3][9]:

Nhóm nguyên nhân	Ví dụ cụ thể
Ngừng tim phổi (Cardiopulmonary arrest)	Thiếu oxy mô → tăng acid lactic + ngừng thở [3][9]
Phù phổi nặng	Suy hô hấp + giảm tưới máu → tăng acid lactic [9]
Ngộ độc	Salicylate + thuốc an thần [9]
Bệnh phổi + suy thận/nhiễm trùng huyết	COPD + suy thận cấp hoặc nhiễm trùng huyết [3][9]
Suy đa tạng (Multi-organ failure)	Rối loạn chuyển hóa nặng + suy hô hấp [3]

****Đặc điểm ABG**** [2-3]:

Thông số	Giá trị	Giải thích
pH	↓↓ Giảm rõ rệt	Cả hai rối loạn đều làm giảm pH [2-3]
PaCO₂	↑ / ↓ / bình thường	Thường ↑ (toan hô hấp) nhưng có thể thay đổi [2]
HCO₃⁻	↓ / bình thường / ↑ nhẹ	Thường ↓ (toan chuyển hóa) nhưng có thể thay đổi [2]
BE	(-) ↑ Âm tăng	Toan chuyển hóa chiếm ưu thế [2]
AG	↑ Tăng	Toan chuyển hóa anion gap tăng [2]

*⚠ ****Lưu ý quan trọng****: pH giảm ****rõ rệt**** (↓↓) là đặc điểm nổi bật nhất của rối loạn này [2-3]. Đây là tình trạng ****đe dọa tính mạng**** cần xử trí cấp cứu.*

****Ví dụ lâm sàng****:

Thông số	Giá trị	Đánh giá
pH	7,10	↓↓ Toan máu nặng
PaCO ₂	60 mm Hg	↑ Cao (toan hô hấp)
HCO ₃ ⁻	18 mmol/L	↓ Thấp (toan chuyển hóa)
BE	-8 mmol/L	(-) Âm (toan chuyển hóa)
AG	18 mEq/L	↑ Tăng (toan chuyển hóa AG tăng)

****Phân tích**:**

1. pH = 7,10 (< 7,35) → ****Toan máu nặng****
2. PaCO₂ = 60 mm Hg (> 45) → ****Toan hô hấp****
3. HCO₃⁻ = 18 mmol/L (< 22) → ****Toan chuyển hóa****
4. ****Kiểm tra bù trừ cho toan hô hấp mạn****: HCO₃⁻ dự kiến = 24 + (0,35 × 20) = 31 mmol/L → HCO₃⁻ thực tế (18) ****thấp hơn nhiều**** so với dự kiến → Có toan chuyển hóa đi kèm
5. ****Kiểm tra bù trừ cho toan chuyển hóa****: PaCO₂ dự kiến = (1,5 × 18) + 8 ± 2 = 33–37 mm Hg → PaCO₂ thực tế (60) ****cao hơn nhiều**** so với dự kiến → Có toan hô hấp đi kèm
6. ****Kết luận****: Rối loạn hỗn hợp — ****Toan hô hấp + Toan chuyển hóa****, pH giảm nặng

****Xử trí cấp cứu**** [7]:

- ****Cải thiện thông khí ngay lập tức****: Thông khí nhân tạo, đặt nội khí quản nếu cần [7]
- ****Điều trị nguyên nhân gốc****: Hồi sức tim phổi, điều trị sốc, giải độc
- ****Theo dõi sát pH****: Toan máu nặng (pH < 7,20) có thể cần can thiệp tích cực

4.5 Kiểm hô hấp + Kiểm chuyển hóa (Respiratory Alkalosis + Metabolic Alkalosis)

****Cơ chế sinh lý bệnh**** [2-3]:

- Tăng thông khí (kiềm hô hấp) + tăng HCO₃⁻ (kiềm chuyển hóa) đồng thời [2]
- pH tăng ****rõ rệt**** (↑) — thường gợi ý ****tiền lượng xấu**** [2]

****Nguyên nhân thường gặp**** [2-3][9]:

Nhóm nguyên nhân	Ví dụ cụ thể
Xơ gan + lợi tiểu	Tăng thông khí do bệnh gan + kiềm chuyển hóa do lợi tiểu [3][9]
Mang thai + nôn	Tăng thông khí sinh lý + mất acid dạ dày [3][9]
Thông khí quá mức ở bệnh nhân COPD	Thông khí cơ học hoặc thuốc kích thích hô hấp quá liều [2]
Bệnh gan mạn + lợi tiểu	Tăng thông khí + kiềm chuyển hóa [9]
Ngừng tim phổi + truyền bicarbonate + thông khí cơ học	Điều trị tích cực gây kiềm hỗn hợp [9]

****Đặc điểm ABG**** [2-3]:

Thông số	Giá trị	Giải thích
pH	↑↑ Tăng rõ rệt	Cả hai rối loạn đều làm tăng pH [2-3]
PaCO₂	↓ Giảm	Kiểm hô hấp [2]
HCO₃⁻	↑ Tăng	Kiểm chuyển hóa [2]

****BE****

(+) ↑ Dương tăng

Kiểm chuyển hóa [2]

⚠ ****Lưu ý quan trọng****: pH tăng ****rõ rệt**** (↑↑) là đặc điểm nổi bật. Tình trạng này ****luôn gọi ý tiên lượng xấu**** [2].

****Ví dụ lâm sàng****:

Thông số	Giá trị	Đánh giá
pH	7,58	↑↑ Kiềm máu nặng
PaCO ₂	30 mm Hg	↓ Thấp (kiềm hô hấp)
HCO ₃ ⁻	32 mmol/L	↑ Cao (kiềm chuyển hóa)
BE	+8 mmol/L	(+) Dương (kiềm chuyển hóa)

****Phân tích****:

- pH = 7,58 (> 7,45) → ****Kiềm máu nặng****
- PaCO₂ = 30 mm Hg (< 35) → ****Kiềm hô hấp****
- HCO₃⁻ = 32 mmol/L (> 26) → ****Kiềm chuyển hóa****
- **Kiểm tra bù trừ cho kiềm hô hấp mạn****: HCO₃⁻ dự kiến = 24 - (0,5 × 10) = 19 mmol/L → HCO₃⁻ thực tế (32) ****cao hơn nhiều**** so với dự kiến → Có kiềm chuyển hóa đi kèm
- **Kiểm tra bù trừ cho kiềm chuyển hóa****: PaCO₂ dự kiến = 40 + (0,7 × 8) = 45,6 mm Hg → PaCO₂ thực tế (30) ****thấp hơn nhiều**** so với dự kiến → Có kiềm hô hấp đi kèm
- **Kết luận****: Rối loạn hỗn hợp — ****Kiềm hô hấp + Kiềm chuyển hóa****, pH tăng nặng

4.6 Kiềm hô hấp + Toan chuyển hóa (Respiratory Alkalosis + Metabolic Acidosis)

****Cơ chế sinh lý bệnh**** [2-3]:

- Tăng thông khí (kiềm hô hấp) + giảm HCO₃⁻ không tương xứng (toan chuyển hóa) [2]
- Hai rối loạn ****tác động ngược chiều**** lên pH → pH có thể bình thường hoặc tăng nhẹ [2-3]

****Nguyên nhân thường gặp**** [2-3][9]:

Nhóm nguyên nhân	Ví dụ cụ thể
Nhiễm trùng huyết (Sepsis)	Tăng thông khí + tăng acid lactic [3][9]
Ngộ độc salicylate	Kích thích trung tâm hô hấp + toan chuyển hóa [3][7][9]
Suy thận + suy tim sung huyết/viêm phổi	Toan chuyển hóa + tăng thông khí do thiếu oxy [3]
Bệnh gan tiến triển	Tăng thông khí + rối loạn chuyển hóa [3]
Suy gan + suy thận phối hợp	Rối loạn chuyển hóa phức tạp [9]

****Đặc điểm ABG**** [2-3]:

Thông số	Giá trị	Giải thích
pH	↑ / bình thường	Tăng nhẹ hoặc bình thường [2-3]
PaCO₂	↓ Giảm	Kiểm hô hấp [2]
HCO₃⁻	↓ Giảm	Toan chuyển hóa [2]
BE	(-) ↑ Âm tăng	Toan chuyển hóa [2]
AG	↑ Tăng	Toan chuyển hóa anion gap tăng [2]

*💡 **Lưu ý**:* Đây là dạng rối loạn hỗn hợp ****"lành tính" (benign)** vì hai rối loạn ****bù trừ cho nhau**** — kiểm hô hấp bù trừ cho toan chuyển hóa và ngược lại [5].

****Ví dụ lâm sàng****:

Thông số	Giá trị	Đánh giá
pH	7,42	Bình thường (phía kiềm)
PaCO ₂	28 mm Hg	↓ Thấp (kiểm hô hấp)
HCO ₃ ⁻	18 mmol/L	↓ Thấp (toan chuyển hóa)
BE	-6 mmol/L	(-) Âm (toan chuyển hóa)
AG	16 mEq/L	↑ Tăng (toan chuyển hóa AG tăng)

****Phân tích****:

- pH = 7,42 → Bình thường (phía kiềm)
- PaCO₂ = 28 mm Hg (< 35) → ****Kiểm hô hấp****
- HCO₃⁻ = 18 mmol/L (< 22) → ****Toan chuyển hóa****
- **Kiểm tra bù trừ cho toan chuyển hóa****: PaCO₂ dự kiến = $(1,5 \times 18) + 8 \pm 2 = 33-37$ mm Hg → PaCO₂ thực tế (28) ****thấp hơn**** dự kiến → Có kiểm hô hấp đi kèm
- **Kiểm tra bù trừ cho kiểm hô hấp mạn****: HCO₃⁻ dự kiến = $24 - (0,5 \times 12) = 18$ mmol/L → HCO₃⁻ thực tế (18) ****nằm trong khoảng dự kiến**** → Có thể chỉ là bù trừ đơn thuần
- **Kết luận****: Cần đối chiếu lâm sàng — nếu bệnh nhân có nhiễm trùng huyết hoặc ngộ độc salicylate → ****Kiểm hô hấp + Toan chuyển hóa****

4.7 Toan chuyển hóa + Kiềm chuyển hóa (Metabolic Acidosis + Metabolic Alkalosis)

****Cơ chế sinh lý bệnh**** [3][9]:

- Hai rối loạn chuyển hóa ****đối nghịch**** đồng thời tồn tại [3]
- pH và HCO₃⁻ có thể ****bình thường**** — che giấu rối loạn [3][9]

****Nguyên nhân thường gặp**** [3][9]:

Nhóm nguyên nhân	Ví dụ cụ thể
Nôn + suy thận	Mất acid dạ dày (kiềm) + giảm bài tiết acid (toan) [3][9]
Nôn + nhiễm ceton đái tháo đường	Mất acid dạ dày (kiềm) + tăng acid ceton (toan) [3][9]
Nôn + nhiễm ceton do rượu	Mất acid dạ dày (kiềm) + tăng acid ceton (toan) [9]
Hút dịch dạ dày + lợi tiểu + suy thận	Mất acid + rối loạn điện giải + giảm bài tiết acid [3]

****Đặc điểm ABG**** [3]:

Thông số	Giá trị	Giải thích
pH	Bình thường	Hai rối loạn bù trừ cho nhau [3]
HCO₃⁻	Bình thường	Hai rối loạn bù trừ cho nhau [3]
AG	↑ Tăng	Toan chuyển hóa anion gap tăng [3]

*⚠ ****Lưu ý quan trọng****: Đây là rối loạn ****dễ bị bỏ sót nhất**** vì pH và HCO₃⁻ đều bình thường [3][9].
****Chẩn đoán dựa chủ yếu vào lâm sàng**** và khoảng trống anion [3].*

****Ví dụ lâm sàng****:

Thông số	Giá trị	Đánh giá
pH	7,40	Bình thường
PaCO ₂	40 mm Hg	Bình thường
HCO ₃ ⁻	24 mmol/L	Bình thường
AG	18 mEq/L	↑ Tăng (toan chuyển hóa AG tăng)

****Phân tích****:

- pH, PaCO₂, HCO₃⁻ đều bình thường → ****Có thể bỏ sót rối loạn****
- AG = 18 mEq/L (> 12) → ****Toan chuyển hóa anion gap tăng**** đang tồn tại
- **Tính delta gap****: ΔAG = 18 - 12 = 6 mEq/L → Nếu toan chuyển hóa đơn thuần, HCO₃⁻ dự kiến = 24 - 6 = 18 mmol/L
- HCO₃⁻ thực tế (24) ****cao hơn**** dự kiến (18) → Có ****kiềm chuyển hóa đi kèm****
- **Kết luận****: Rối loạn hỗn hợp — ****Toan chuyển hóa + Kiềm chuyển hóa**** (dựa trên lâm sàng: nôn + suy thận)

Phần 5: Khoảng Trống Anion (Anion Gap) — ****NỘI DUNG BỔ SUNG****

5.1 Khái niệm

Khoảng trống anion (Anion Gap - AG) là chênh lệch giữa ****cation đo được**** (Na⁺) và ****anion đo được**** (Cl⁻ + HCO₃⁻) trong huyết tương [1][7].

****Công thức tính**** [1][7]:

$$\text{AG} = \text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-)$$

****Giá trị bình thường****: 8–12 mEq/L [1][7]

*💡 ****Giải thích sinh lý****: AG phản ánh sự hiện diện của các ****anion không đo được**** trong huyết tương, bao gồm: albumin, phosphate, sulfate, lactate và các acid hữu cơ khác [1][7].*

5.2 Phân loại toan chuyển hóa theo AG

Loại	AG	Đặc điểm	Nguyên nhân
Toan chuyển hóa AG tăng	> 12 mEq/L	Tích tụ acid nội/ngoại sinh	Nhiễm ceton, tăng acid lactic, suy thận, ngộ độc [1][4]
Toan chuyển hóa AG bình thường	8–12 mEq/L	Mất HCO ₃ ⁻ qua thận/tiêu hóa	Tiêu chảy, RTA, TPN [1][8]

*💡 ****Mẹo ghi nhớ "KUSMALE"***** cho toan chuyển hóa anion gap tăng [4]:*

- ****K**etoacidosis** (nhiễm ceton)
- ****U**rea** (tăng urê máu/suy thận)
- ****S**ugar** (tăng đường huyết)
- ****M**ethanol** (ngộ độc methanol)
- ****A**lcohol** (ngộ độc rượu)
- ****L**actic acidosis** (tăng acid lactic — kém tưới máu, nhiễm trùng huyết, thiếu máu ruột)
- ****E**thylene glycol** (ngộ độc chống đông)

5.3 Delta/Delta Ratio (Δ/Δ) — ****NỘI DUNG BỔ SUNG****

****Khái niệm****: Delta/Delta ratio so sánh mức tăng của AG với mức giảm của HCO₃⁻, giúp phát hiện rối loạn hỗn hợp trong toan chuyển hóa [7].

****Công thức tính**** [7]:

$$\Delta/\Delta = \frac{\text{AG} - 12}{24 - \text{HCO}_3^-}$$

****Diễn giải kết quả**** [7]:

Δ/Δ	Ý nghĩa	Giải thích
1,0–2,0	Toan chuyển hóa AG tăng đơn thuần	Mức tăng AG tương xứng với mức giảm HCO ₃ ⁻ [7]
< 1,0	Toan chuyển hóa AG tăng + Toan chuyển hóa AG bình thường	HCO ₃ ⁻ giảm nhiều hơn dự kiến từ AG [7]

> 2,0	Toan chuyển hóa AG tăng + Kiểm chuyển hóa	HCO ₃ ⁻ giảm ít hơn dự kiến từ AG [7]
---------------------	---	---

⚠ ****Lưu ý quan trọng**** [7]: Các diễn giải này giả định mối quan hệ ****1:1**** giữa anion không đo được và mức giảm HCO₃⁻, điều này ****không phải lúc nào cũng đúng**** ở từng bệnh nhân hoặc khi rối loạn đang tiến triển. Ví dụ: bù dịch cho bệnh nhân DKA làm tăng lọc cầu thận và bài tiết ceton qua nước tiểu → AG giảm mà không có toan chuyển hóa AG bình thường đi kèm [7].

****Ví dụ minh họa****:

Tình huống	Na ⁺	Cl ⁻	HCO ₃ ⁻	AG	Δ/Δ	Kết luận
Toan chuyển hóa AG tăng đơn thuần	140	104	14	22	(22-12)/(24-14) = 1,0	AG tăng tương xứng HCO ₃ ⁻ giảm
Toan AG tăng + Kiểm chuyển hóa	140	100	20	20	(20-12)/(24-20) = 2,0	HCO ₃ ⁻ giảm ít hơn dự kiến
Toan AG tăng + Toan AG bình thường	140	110	10	20	(20-12)/(24-10) = 0,57	HCO ₃ ⁻ giảm nhiều hơn dự kiến

Phần 6: Ví Dụ Lâm Sàng Tổng Hợp — ****NỘI DUNG BỔ SUNG****

6.1 Case Study: Rối loạn hỗn hợp Toan hô hấp + Kiểm chuyển hóa

****Bệnh cảnh lâm sàng****: Bệnh nhân nam 65 tuổi, COPD mạn tính, nhập viện vì khó thở tăng dần. Đang dùng thuốc lợi tiểu (furosemide) và corticosteroid dài hạn.

****Kết quả ABG****:

Thông số	Giá trị	Khoảng bình thường	Đánh giá
pH	7,45	7,35–7,45	Bình thường (phía kiềm)
PaCO ₂	52 mm Hg	35–45	↑ Cao (toan hô hấp)
HCO ₃ ⁻	36,1 mmol/L	22–26	↑ Cao (kiềm chuyển hóa)
BE	+12,1 mmol/L	-2 đến +2	↑ Cao (kiềm chuyển hóa)
PaO ₂	127 mm Hg	80–100	↑ Cao (thở oxy bổ sung)
Na ⁺	136 mmol/L	135–145	Bình thường
K ⁺	3,7 mmol/L	3,5–5,0	Bình thường (giới hạn)

			thấp)
Cl ⁻	90 mmol/L	98–107	↓ Thấp (hạ clo máu)
Glucose	7,5 mmol/L	3,9–6,1	↑ Cao nhẹ

****Quy trình phân tích 6 bước**:**

Bước	Phân tích	Kết quả
1. pH	7,45 → Bình thường, phía kiềm	Cần đánh giá thêm
2. PaCO₂	52 mm Hg (> 45)	**Toan hô hấp**
3. HCO₃⁻	36,1 mmol/L (> 26)	**Kiềm chuyển hóa**
4. Rối loạn nguyên phát	Cả PaCO ₂ và HCO ₃ ⁻ đều bất thường	**Rối loạn hỗn hợp**
5. Kiểm tra bù trừ	HCO ₃ ⁻ dự kiến cho toan hô hấp mạn = 24 + (0,35 × 12) = 28,2 → Thực tế 36,1 **vượt quá**	**Có kiềm chuyển hóa đi kèm**
6. Oxy hóa máu	PaO ₂ = 127 mm Hg → Tăng oxy máu	Đang thở oxy bổ sung

****Chẩn đoán cuối cùng**:**

 ****Rối loạn hỗn hợp: Toan hô hấp + Kiềm chuyển hóa****

- ****Cơ chế**:** COPD mạn tính (toan hô hấp) + lợi tiểu gây hạ clo máu, hạ kali máu (kiềm chuyển hóa) [2-3]

- ****pH**:** 7,45 — Kiềm chuyển hóa chiếm ưu thế

- ****Kèm theo**:** Hạ clo máu (90 mmol/L), thiếu máu nhẹ, tăng đường huyết nhẹ

****Hướng xử trí**** [1-2]:

- **Cải thiện thông khí**:** Giảm phế quản, hỗ trợ hô hấp nếu cần
- **Điều chỉnh điện giải**:** Bù kali, bù clo (kiềm chuyển hóa đáp ứng chloride) [1]
- **Xem xét lại thuốc lợi tiểu**:** Cân nhắc giảm liều hoặc đổi thuốc
- **Theo dõi sát**:** pH, điện giải đồ, chức năng thận

6.2 Case Study: Toan hô hấp + Toan chuyển hóa — Ngừng tim phổi

****Bệnh cảnh lâm sàng**:** Bệnh nhân nữ 58 tuổi, ngừng tim phổi do nhồi máu cơ tim cấp, đang được hồi sức tích cực.

****Kết quả ABG**:**

Thông số	Giá trị	Khoảng bình thường	Đánh giá
pH	7,08	7,35–7,45	↓↓ Toan máu nặng

PaCO ₂	58 mm Hg	35–45	↑ Cao (toan hô hấp)
HCO ₃ ⁻	17 mmol/L	22–26	↓ Thấp (toan chuyển hóa)
BE	-10 mmol/L	-2 đến +2	(-) Âm (toan chuyển hóa)
Lactate	8,5 mmol/L	0,5–2,2	↑↑ Tăng acid lactic nặng

****Phân tích**:**

Bước	Phân tích	Kết quả
1. pH	7,08 (< 7,35)	**Toan máu nặng**
2. PaCO₂	58 mm Hg (> 45)	**Toan hô hấp**
3. HCO₃⁻	17 mmol/L (< 22)	**Toan chuyển hóa**
4. Rối loạn nguyên phát	Cả PaCO ₂ và HCO ₃ ⁻ đều bất thường	**Rối loạn hỗn hợp**
5. Kiểm tra bù trừ	PaCO ₂ dự kiến cho toan chuyển hóa = $(1,5 \times 17) + 8 \pm 2 = 31,5 - 35,5 \rightarrow$ Thực tế 58 **cao hơn nhiều**	**Có toan hô hấp đi kèm**
6. AG	AG = $136 - (100 + 17) = 19$ mEq/L (> 12)	**Toan chuyển hóa AG tăng** (tăng acid lactic)

****Chẩn đoán cuối cùng**:**

🚑 ****Rối loạn hỗn hợp: Toan hô hấp + Toan chuyển hóa (tăng acid lactic)****

- ****Cơ chế**:** Ngừng tim phổi $\rightarrow$ thiếu oxy mô $\rightarrow$ tăng acid lactic (toan chuyển hóa) + ngừng thở (toan hô hấp) [3][9]

- ****pH**:** 7,08 — Toan máu ****đe dọa tính mạng****

- ****Tiên lượng**:** Xấu nếu không xử trí kịp thời

****Hướng xử trí cấp cứu**** [7]:

- **Hồi sức tim phổi tích cực**:** Ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện nếu có chỉ định
- **Đặt nội khí quản + thông khí nhân tạo**:** Cải thiện thông khí ngay lập tức [7]
- **Điều trị nguyên nhân**:** Tái tưới máu mạch vành (PCI), thuốc vận mạch
- **Theo dõi sát pH và lactate**:** Đánh giá đáp ứng điều trị

Phần 7: Tóm Tắt và Bảng Tra Cứu Nhanh

7.1 Bảng tổng hợp các rối loạn toan kiềm

Rối loạn	pH	PaCO ₂	HCO ₃ ⁻	BE	AG	Nguyên nhân thường gặp
Toan hô hấp	↓	↑↑	↑ (bù trừ)	(+)	-	COPD, suy hô hấp, ức chế TTHH [1-2]
Kiềm hô hấp	↑	↓↓	↓ (bù trừ)	(-)	-	Tăng thông khí, lo âu, sốt [1-2]
Toan chuyển hóa	↓	↓ (bù trừ)	↓↓	(-)	↑/-	Nhiễm ceton, tiêu chảy, suy thận [1-2]
Kiềm chuyển hóa	↑	↑ (bù trừ)	↑↑	(+)	-	Nôn, lợi tiểu, hạ clo máu [1-2]
Toan HH + Kiềm CH	↑/↓/-	↑	↑	(+)	-	COPD + lợi tiểu/nôn [2-3]
Toan HH + Toan CH	↓↓	↑/↓/-	↓/-/↑	(-)	↑	Ngừng tim, sốc, ngộ độc [2-3]
Kiềm HH + Kiềm CH	↑↑	↓	↑	(+)	-	Xơ gan + lợi tiểu, thông khí quá mức [2-3]
Kiềm HH + Toan CH	↑/-	↓	↓	(-)	↑	Nhiễm trùng huyết, salicylate [2-3]
Toan CH + Kiềm CH	-	-	-	-	↑	Nôn + suy thận, DKA + nôn [3][9]

HH: Hô hấp; CH: Chuyển hóa; TTHH: Trung tâm hô hấp

7.2 Công thức bù trừ dự kiến — Bảng tra cứu nhanh

Rối loạn	Công thức bù trừ dự kiến
Toan chuyển hóa	PaCO ₂ dự kiến = $(1,5 \times \text{HCO}_3^-) + 8 \pm 2$ (Công thức

	Winter) [3][5][8]
Toan chuyển hóa (cách khác)	PaCO ₂ giảm 1,0–1,4 mm Hg mỗi 1 mEq/L giảm HCO ₃ ⁻ [1][4]
Toan hô hấp cấp	HCO ₃ ⁻ tăng 1 mEq/L mỗi 10 mm Hg tăng PaCO ₂ [2][5]
Toan hô hấp mạn	HCO ₃ ⁻ tăng 3,5 mEq/L mỗi 10 mm Hg tăng PaCO ₂ [1-2][5]
Kiềm chuyển hóa	PaCO ₂ tăng 0,25–1,0 mm Hg mỗi 1 mEq/L tăng HCO ₃ ⁻ [1][4]
Kiềm hô hấp cấp	HCO ₃ ⁻ giảm 1–3 mEq/L mỗi 10 mm Hg giảm PaCO ₂ (tối thiểu HCO ₃ ⁻ 18 mmol/L) [4]
Kiềm hô hấp mạn	HCO ₃ ⁻ giảm 2–5 mEq/L mỗi 10 mm Hg giảm PaCO ₂ (tối thiểu HCO ₃ ⁻ 14 mmol/L) [1][4]

💡 ****Lưu ý quan trọng****:

- ****Công thức Winter****: PaCO₂ dự kiến = $(1,5 \times \text{HCO}_3^-) + 8 \pm 2$ — dùng cho toan chuyển hóa [3][5][8]
- ****Quy tắc +15****: Dùng để xác định bù trừ hô hấp dự kiến khi HCO₃⁻ từ 10–40 mmol/L [8]
- ****Bù trừ hô hấp cho rối loạn chuyển hóa**** diễn ra ****nhANH**** (trong vài phút) [4][10]
- ****Bù trừ thận cho rối loạn hô hấp**** diễn ra ****chẬM**** (3–6 ngày) [10]

7.3 Bảng tổng hợp các rối loạn toan kiềm — Bảng tra cứu nhanh

Rối loạn	pH	PaCO ₂	HCO ₃ ⁻	BE	AG	Nguyên nhân thường gặp
Toan hô hấp chưa bù	↓↓	↑↑	↔	↔	-	Suy hô hấp cấp, ức chế TTHH [2][10]
Toan hô hấp bù một phần	↓	↑↑	↑↑	(+)	-	COPD mạn, suy hô hấp mạn [9-10]
Toan hô hấp bù hoàn toàn	↔ (phía toan)	↑↑	↑↑	(+)	-	COPD mạn tính [9]
Kiềm hô hấp chưa bù	↑↑	↓↓	↔	↔	-	Tăng thông khí cấp, lo âu [2][10]
Kiềm hô	↑	↓↓	↓↓	(-)	-	Tăng thông

hấp bù một phần**						khí kéo dài [10]
Toan chuyển hóa chưa bù	↓↓	↔	↓↓	(-)	↑/-	Nhiễm ceton, tiêu chảy, suy thận [2][10]
Toan chuyển hóa bù một phần	↓	↓↓	↓↓	(-)	↑/-	DKA, tăng acid lactic [10]
Kiềm chuyển hóa chưa bù	↑↑	↔	↑↑	(+)	-	Nôn, lợi tiểu [2][10]
Kiềm chuyển hóa bù một phần	↑	↑↑	↑↑	(+)	-	Nôn kéo dài, hút dịch dạ dày [10]
Toan HH + Toan CH	↓↓	↑↑	↓	(-)	↑	Ngừng tim, sốc, ngộ độc [10]
Kiềm HH + Kiềm CH	↑↑	↓↓	↑	(+)	-	Xơ gan + lợi tiểu, thông khí quá mức [10]

HH: Hô hấp; CH: Chuyển hóa; TTHH: Trung tâm hô hấp; ↔: Bình thường

⚠️ ****Lưu ý quan trọng**** [1][4]:

- ****pH không bao giờ bình thường**** trong rối loạn chuyển hóa được bù trừ thích hợp [1]
- ****pH thường bình thường**** trong rối loạn hô hấp được bù trừ hoàn toàn (có thể mất nhiều ngày) [1]
- ****Bất kỳ HCO_3^- hoặc PaCO_2 bất thường nào đi kèm pH bình thường**** → Tự động chỉ ra ****hai rối loạn toan kiềm nguyên phát**** [4]
- Cơ thể ****không bao giờ bù trừ quá mức**** (overcompensate) [9]

Phần 8: Các Bẫy Thường Gặp và Lưu Ý Lâm Sàng — ****NỘI DUNG BỔ SUNG****

8.1 Bẫy 1: pH bình thường không loại trừ rối loạn toan kiềm

Tình huống	Giải thích
Rối loạn hỗn hợp đối nghịch	Toan + Kiềm đồng thời → pH có thể bình thường [4]

****Bù trừ hoàn toàn****

Rối loạn hô hấp mạn được bù trừ → pH bình thường [1]

****Toan CH + Kiềm CH****

Hai rối loạn chuyển hóa đối nghịch → pH và HCO_3^- bình thường [3]

⚠ ****Nguyên tắc vàng**** [4]: "Bất kỳ HCO_3^- hoặc PaCO_2 bất thường nào đi kèm pH bình thường → Tự động chỉ ra ****hai rối loạn toan kiềm nguyên phát****."

8.2 Bẫy 2: Bù trừ không thích hợp = Rối loạn hỗn hợp

****Nguyên tắc**** [1]: Bù trừ không thích hợp, đang tiến triển hoặc không đầy đủ (bao gồm cả do thông khí cơ học) là một ****rối loạn hỗn hợp**** [1].

Tình huống	Ví dụ
Toan chuyển hóa + PaCO_2 cao hơn dự kiến	Toan chuyển hóa + Toan hô hấp (bệnh nhân không thể tăng thông khí) [1-2]
Toan chuyển hóa + PaCO_2 thấp hơn dự kiến	Toan chuyển hóa + Kiềm hô hấp (tăng thông khí quá mức)
Toan hô hấp + HCO_3^- cao hơn dự kiến	Toan hô hấp + Kiềm chuyển hóa (ví dụ: COPD + lợi tiểu) [2-3]
Toan hô hấp + HCO_3^- thấp hơn dự kiến	Toan hô hấp + Toan chuyển hóa (ví dụ: suy hô hấp + tăng acid lactic) [2-3]

8.3 Bẫy 3: Quên hiệu chỉnh AG theo albumin

****Nguyên tắc**** [8]: Luôn ****hiệu chỉnh AG theo albumin huyết thanh thấp**** [8].

****Công thức hiệu chỉnh****:

$$\text{AG}_{\text{hiệu chỉnh}} = \text{AG}_{\text{đo được}} + 2,5 \times (4,5 - \text{Albumin})$$

💡 ****Giải thích****: Albumin là anion không đo được chính trong huyết tương. Khi albumin thấp (suy dinh dưỡng, bệnh gan, hội chứng thận hư), AG đo được sẽ ****giảm giả tạo**** — có thể che giấu toan chuyển hóa AG tăng [8].

8.4 Bẫy 4: Nhầm lẫn giữa "bù trừ" và "rối loạn hỗn hợp"

Đặc điểm	Bù trừ đơn thuần	Rối loạn hỗn hợp
Thông số bù trừ	Thay đổi **trong giới hạn dự kiến**	Thay đổi **vượt quá giới hạn dự kiến** [1]
pH	Có thể bình thường (hô hấp) hoặc bất thường (chuyển hóa) [1]	Thay đổi tùy loại
Ví dụ	Toan hô hấp mạn: PaCO_2 50 →	Toan hô hấp mạn: PaCO_2 50 → HCO_3^- thực tế 32 → Có kiềm

HCO_3^- dự kiến 27,5	chuyển hóa đi kèm
-------------------------------	-------------------

8.5 Bẫy 5: Quên đánh giá oxy hóa máu

- **Luôn đánh giá PaO_2 và SaO_2 ** cùng với pH, PaCO_2 , HCO_3^- [9]
- $\text{PaO}_2 < 60$ mm Hg hoặc $\text{SaO}_2 < 90\%$ → **Thiếu oxy máu đáng kể** [9]
- Phân biệt suy hô hấp type I (giảm oxy, PaCO_2 bình thường/thấp) và type II (tăng CO_2 , giảm oxy)

Phần 9: Bài Tập Tự Lượng Giá (Self-Assessment) — **NỘI DUNG BỔ SUNG**

9.1 Bài tập 1: Rối loạn đơn thuần

Kết quả ABG: pH 7,25 | PaCO_2 58 mm Hg | HCO_3^- 25 mEq/L

Bước	Phân tích	Kết quả
1. pH	7,25 (< 7,35)	Toan máu
2. PaCO_2	58 mm Hg (> 45)	Toan hô hấp
3. HCO_3^-	25 mEq/L (bình thường)	Chưa có bù trừ
4. Kết luận	**Toan hô hấp chưa bù** [2]	

9.2 Bài tập 2: Rối loạn có bù trừ

Kết quả ABG: pH 7,48 | PaCO_2 20 mm Hg | HCO_3^- 17 mEq/L

Bước	Phân tích	Kết quả
1. pH	7,48 (> 7,45)	Kiềm máu
2. PaCO_2	20 mm Hg (< 35)	Kiềm hô hấp
3. HCO_3^-	17 mEq/L (< 22)	Có bù trừ chuyển hóa
4. Kiểm tra bù trừ	HCO_3^- giảm 7 mEq/L; PaCO_2 giảm 20 mm Hg → Dự kiến HCO_3^- giảm 2–5 mEq/L mỗi 10 mm Hg → 4–10 mEq/L	Bù trừ phù hợp
5. Kết luận	**Kiềm hô hấp có bù trừ** [2]	

9.3 Bài tập 3: Rối loạn hỗn hợp

Kết quả ABG: pH 7,20 | PaCO_2 40 mm Hg | HCO_3^- 18 mEq/L

Bước	Phân tích	Kết quả
1. pH	7,20 (< 7,35)	Toan máu
2. PaCO ₂	40 mm Hg (bình thường)	Không phải rối loạn hô hấp nguyên phát
3. HCO ₃ ⁻	18 mEq/L (< 22)	Toan chuyển hóa
4. Kiểm tra bù trừ	PaCO ₂ dự kiến = (1,5 × 18) + 8 ± 2 = 33–37 mm Hg → Thực tế 40 **cao hơn** dự kiến	Bù trừ không đầy đủ
5. Kết luận	**Toan chuyển hóa chưa bù** (bệnh nhân không thể tăng thông khí) [2]	

9.4 Bài tập 4: Rối loạn hỗn hợp phức tạp

Kết quả ABG: pH 7,50 | PaCO₂ 39 mm Hg | HCO₃⁻ 30 mEq/L

Bước	Phân tích	Kết quả
1. pH	7,50 (> 7,45)	Kiểm máu
2. PaCO ₂	39 mm Hg (bình thường)	Không phải rối loạn hô hấp nguyên phát
3. HCO ₃ ⁻	30 mEq/L (> 26)	Kiểm chuyển hóa
4. Kiểm tra bù trừ	PaCO ₂ dự kiến = 40 + (0,7 × 6) = 44,2 mm Hg → Thực tế 39 **thấp hơn** dự kiến	Có kiềm hô hấp đi kèm
5. Kết luận	**Kiềm chuyển hóa chưa bù** [2]	

Phần 10: Kết Luận

10.1 Các điểm chính cần ghi nhớ

1. **Quy trình 6 bước** là nền tảng để diễn giải ABG một cách có hệ thống [2][9]
2. **pH bình thường không loại trừ** rối loạn toan kiềm — luôn kiểm tra HCO₃⁻ và PaCO₂ [1-2][4]
3. **Bù trừ không bao giờ đưa pH về hoàn toàn bình thường** trong rối loạn chuyển hóa [1]
4. **Bù trừ không thích hợp = Rối loạn hỗn hợp** [1]
5. **Công thức Winter** giúp xác định bù trừ hô hấp dự kiến trong toan chuyển hóa [3][5][8]
6. **Luôn hiệu chỉnh AG theo albumin** [8]
7. **Đánh giá oxy hóa máu** (PaO₂, SaO₂) cùng với rối loạn toan kiềm [9]

10.2 Lưu đồ quyết định cuối cùng

```mermaid

flowchart TD

```
Start(("Kết quả ABG")) --> Step1["Bước 1: pH
7,35 – 7,45?"]
Step1 -->|"pH < 7,35"| Acid["TOAN MÁU"]
Step1 -->|"pH > 7,45"| Alk["KIỀM MÁU"]
Step1 -->|"pH bình thường"| Norm{"HCO3- hoặc PaCO2
bất thường?"}
Norm -->|"Có"| Mixed["RỐI LOẠN HỖN HỢP
(2 rối loạn nguyên phát)"]
Norm -->|"Không"| Normal["Không có rối loạn
toan kiềm"]
Acid --> CheckCO2{"PaCO2 > 45?"}
CheckCO2 -->|"Có"| RespAcid["Toan hô hấp"]
CheckCO2 -->|"Không"| CheckHCO3{"HCO3- < 22?"}
CheckHCO3 -->|"Có"| MetaAcid["Toan chuyển hóa"]
CheckHCO3 -->|"Không"| MixedAcid["Rối loạn hỗn hợp
cần đánh giá thêm"]
Alk --> CheckCO2L{"PaCO2 < 35?"}
CheckCO2L -->|"Có"| RespAlk["Kiềm hô hấp"]
CheckCO2L -->|"Không"| CheckHCO3H{"HCO3- > 26?"}
CheckHCO3H -->|"Có"| MetaAlk["Kiềm chuyển hóa"]
CheckHCO3H -->|"Không"| MixedAlk["Rối loạn hỗn hợp
cần đánh giá thêm"]
RespAcid --> Comp1{"HCO3- tăng
đúng dự kiến?"}
Comp1 -->|"Đúng"| Adeq1["Bù trừ phù hợp"]
Comp1 -->|"Vượt quá"| Mixed1["+ Kiềm chuyển hóa"]
Comp1 -->|"Thấp hơn"| Mixed2["+ Toan chuyển hóa"]
MetaAcid --> Comp2{"PaCO2 giảm
đúng dự kiến?"}
Comp2 -->|"Đúng"| Adeq2["Bù trừ phù hợp"]
Comp2 -->|"Thấp hơn"| Mixed3["+ Kiềm hô hấp"]
Comp2 -->|"Cao hơn"| Mixed4["+ Toan hô hấp"]
RespAlk --> Comp3{"HCO3- giảm
đúng dự kiến?"}
Comp3 -->|"Đúng"| Adeq3["Bù trừ phù hợp"]
Comp3 -->|"Vượt quá"| Mixed5["+ Kiềm chuyển hóa"]
Comp3 -->|"Thấp hơn"| Mixed6["+ Toan chuyển hóa"]
MetaAlk --> Comp4{"PaCO2 tăng
đúng dự kiến?"}
Comp4 -->|"Đúng"| Adeq4["Bù trừ phù hợp"]
Comp4 -->|"Vượt quá"| Mixed7["+ Toan hô hấp"]
Comp4 -->|"Thấp hơn"| Mixed8["+ Kiềm hô hấp"]
Adeq1 --> Oxy["Đánh giá PaO2 / SaO2"]
Adeq2 --> Oxy
Adeq3 --> Oxy
Adeq4 --> Oxy
Mixed --> Oxy
```

Mixed1 --> Oxy  
Mixed2 --> Oxy  
Mixed3 --> Oxy  
Mixed4 --> Oxy  
Mixed5 --> Oxy  
Mixed6 --> Oxy  
Mixed7 --> Oxy  
Mixed8 --> Oxy  
Oxy --> Final["TỔNG HỢP CHẨN ĐOÁN<br>+ Đối chiếu lâm sàng"]  
...

## Tài Liệu Tham Khảo

1. Intensive Care Manual — "Is Compensation Appropriate?"
2. Textbook of Pediatrics — "Evaluation of Acid-Base Status"
3. Critical Care Nephrology and Acute Kidney Injury Series — "Metabolic Acidosis"
4. Handbook of Critical Care Nephrology — "Acid-Base Management in the Intensive Care Unit"
5. Neurocritical Care — "Normal Compensation in Metabolic Disorders"
6. Basic Skills in Interpreting Laboratory Data — "Arterial Blood Gases and Acid-Base Balance"
7. Medical Physiology (Boron & Boulpaep) — "Acid-Base Physiology"
8. Mayo Clinic Internal Medicine Board Review — "Chronic Stable Angina — Key Facts"
9. Introduction to Critical Care Nursing — "Arterial Blood Gas Interpretation"
10. Medical Physiology — "Compensatory Mechanisms" & "Clinical Interpretation of Arterial Blood Gases"

 **Tuyên bố miễn trừ:** Nội dung bài giảng này được tạo ra dựa trên tổng hợp tài liệu y khoa và chỉ nhằm mục đích **giáo dục, tham khảo lâm sàng**. Người học cần **đối chiếu với nguồn tài liệu chính thống** và **áp dụng phán đoán lâm sàng** cho từng bệnh nhân cụ thể. Bài giảng **không thay thế** khuyến cáo từ các hội đồng chuyên môn hoặc quyết định lâm sàng của bác sĩ điều trị.

### References:

- [1] Intensive Care Manual[M]. Philadelphia: Elsevier; 2026.
- [2] Textbook of Pediatrics[M]. 3rd ed. 2025.
- [3] Critical Care Nephrology and Acute Kidney Injury Series[M]. London: Pearson; 2022.
- [4] Handbook of Critical Care Nephrology[M]. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2021.
- [5] Torbey MT. Neurocritical Care[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2019.
- [6] Basic Skills in INTERPRETING LABORATORY DATA[M]. 6th ed. 2017, American Society of Health-System Pharmacists, Inc. All rights reserved; 2017.
- [7] Walter F. Boron, Emile L. Boulpaep. Medical Physiology[M/OL]. 3rd ed.. Philadelphia: Elsevier; 2017.
- [8] Mayo Clinic Internal Medicine Board Review[M]. 11th ed. Oxford: Oxford University Press; 2016.
- [9] Introduction to Critical Care Nursing[M]. 6th ed. Philadelphia: Elsevier; 2013.
- [10] Medical Physiology[M]. New York: McGraw-Hill; 2011.