iMath 0974.940.049

ĐỀ ÔN TẬP

Môn thi: TOÁN 10

Thời gian: phút

Mã đề: 159

Ho tên HS: Số báo danh PHÂN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. **Câu 1.** Tìm tọa độ đỉnh I của đồ thị hàm số $y = -2x^2 + 4x - 5$. **B.** I(-1;-11). **C.** I(2;-5). **D.** I(-2; -21). **A.** I(1; -3). Lời giải. Đồ thị hàm số $y = -2x^2 + 4x - 5$ có tọa độ đỉnh là $I\left(1; -3\right)$. Chọn đáp án old A Câu 2. Cho hàm số $f(x) = x^2 + x - 1$. Tính f(1). **A.** 5. B. 6. **D.** 1. Lời giải. Thay giá trị 1 và hàm số $f(x) = x^2 + x - 1$ ta được f(1) = 1. Câu 3. Cho hàm số $y = -3x^2 - 5x - 4$. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng **A.** $(-\infty; +\infty)$. **B.** $\left(-\frac{5}{6}; +\infty\right)$. **C.** $(-\infty; -1)$. **D.** $\left(-\infty; -\frac{5}{6}\right)$. Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{5}{6}; +\infty\right)$. Chọn đáp án (B) Câu 4. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 + 6x + 2 & \text{khi } x \ge 4 \\ 6x - 5 & \text{khi } x < 4 \end{cases}$. Tính f(-1). **A.** -3 . $B_{*} - 11$. **D.** 9. Lời giải. Vì -1 < 4 nên thay giá trị -1 và hàm số f(x) = 6x - 5 ta được f(-1) = -11. Câu 5. Tìm tập xác định của hàm số $y = \sqrt{x} - \sqrt{8 - 5x}$.

A.
$$D = [0; +\infty)$$

B.
$$D = \left[0; \frac{8}{5}\right]$$

A.
$$D = [0; +\infty)$$
. **B.** $D = \left[0; \frac{8}{5}\right]$. **C.** $D = \left(-\infty; \frac{8}{5}\right]$. **D.** $D = \left(0; \frac{8}{5}\right)$.

D.
$$D = \left(0; \frac{8}{5}\right)$$
.

Điều kiện xác định: .
$$\left\{ \begin{array}{l} x \geq 0 \\ 8 - 5x \geq 0 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x \geq 0 \\ x \leq \frac{8}{5} \end{array} \right.$$
 Tập xác định là: $D = \left[0; \frac{8}{5}\right]$.

Chọn đáp án (B)

Câu 6. Tìm tập xác định của hàm số $y = \frac{4-2x}{3-8x}$

A.
$$D = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{3}{8}\}$$
 . B. $D = \left(-\infty; \frac{3}{8}\right)$. C. $D = \mathbb{R} \setminus \{\frac{3}{8}\}$. D. $D = \left(\frac{3}{8}; +\infty\right)$. Lời giải.

Hàm số xác định khi $3 - 8x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{3}{8}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = -4x^2 - 2x - 8$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau.


- a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb R$.
- **b)** Đồ thị hàm số đi qua điểm D(-4; -64).
- c) Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{1}{4}; +\infty\right)$.
- d) Đồ thị hàm số có hoành độ đỉnh là $x_0 = \frac{3}{4}$.

Lời giải.

- a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb R$ là khẳng định đúng vì đây là hàm số đa thức.
- b) Đồ thị hàm số đi qua điểm D(-4, -64) là khẳng định đúng vì có f(-4) = -64.
- c) Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{1}{4};+\infty\right)$ là khẳng định sai vì Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{1}{4};+\infty\right)$.
- d) Đồ thị hàm số có hoành độ đỉnh là $x_0 = \frac{3}{4}$ là khẳng định sai vì hoành độ đỉnh là $x_0 = -\frac{1}{4}$.

Chọn đáp án a đúng b đúng c sai d sai

Câu 2. Cho parabol $(P): y = ax^2 + bx = c, (a \neq 0)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây.



Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Đồ thị hàm số nhận đường thẳng $x=-\frac{1}{10}$ làm trực đối xứng .
- b) Hàm số có hệ số a>0 .
- c) Trên khoảng $\left(\frac{29}{10}; +\infty\right)$ thì hàm số đồng biến .
- d) Đồ thị hàm số có tung độ đỉnh bằng $-\frac{1}{10}$.

Lời giải.

- a) Đồ thị hàm số nhận đường thẳng $x=-\frac{1}{10}$ làm trục đối xứng là khẳng định đúng.
- b) Dựa vào dáng của bảng biến thiên, hàm số có hệ số a>0 là khẳng định đúng.
- c) Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(\frac{29}{10}; +\infty\right)$ là khẳng định đúng.
- d) Đồ thị hàm số có tung độ đỉnh bằng $-\frac{1}{10}$ là khẳng định sai vì tung độ đỉnh là $\frac{19}{10}$

Câu 3. Cho tam giác ABC có c = 5, a = 5, b = 3. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\cos C = \frac{3}{20}$.		X
b) $S = \frac{3\sqrt{14}}{4}$.		X
c) $\widehat{A} = 81,37^{\circ}$.		X
d) $r = \frac{3\sqrt{91}}{52}$.		X

Lời giải.

a) Khẳng định đã cho là khẳng định sai.

$$\cos C = \frac{5^2 + 3^2 - 5^2}{2.5.3} = \frac{3}{10}.$$

b) Khẳng định đã cho là khẳng định sai.

$$p = \frac{5+5+3}{2} = \frac{13}{2}.$$

$$S = \sqrt{\frac{13}{2} \cdot (\frac{13}{2} - 5) \cdot (\frac{13}{2} - 5) \cdot (\frac{13}{2} - 3)} = \frac{3\sqrt{91}}{4}.$$

c) Khẳng định đã cho là khẳng định sai.

$$\cos A = \frac{5^2 + 3^2 - 5^2}{2.5.3} = \frac{3}{10} \Rightarrow \widehat{A} = 72,54^{\circ}.$$

d) Khẳng định đã cho là khẳng định sai.

$$r = \frac{S}{p} = \frac{\frac{3\sqrt{91}}{4}}{\frac{13}{2}} = \frac{3\sqrt{91}}{26}.$$

...... Chọn đáp án a sai b sai c sai d sai

PHÂN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1. Biết đồ thị hàm số $y = ax^2 - x + c$ đi qua các điểm B(-5, -42) và I(4, -33). Tính P = 2a - 2c.

Dáp án: | - | 1

Lời giải.

Dồ thị hàm số đi qua
$$B(-5; -42)$$
 và $I(4; -33)$ nên ta có:
$$\begin{cases} 25a + c + 5 = -42 \\ 16a + c - 4 = -33 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 25a + c = -47 \\ 16a + c = -29 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -2 \\ c = 3 \end{cases}$$
 $P = 2a - 2c = -10.$

Câu 2. Một quả bóng được cầu thủ sút lên rồi rơi xuống theo quỹ đạo là một parabol. Biết rằng ban đầu quả bóng được sút lên từ độ cao 0.4 m, sau đó 1 giây quả bóng đạt độ cao $\frac{12}{25}$ m và sau 4,5 giây quả bóng đạt độ cao $\frac{13}{100}$ m. Hỏi độ cao cao nhất mà quả bóng đạt được là bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

Đáp án: 0

Lời giải.

Giả sử $h(t) = at^2 + bt + c$ là độ cao của quả bóng theo thời gian t.

$$\begin{cases} h(0) = 0, 4 \\ h(1) = \frac{12}{25} \\ h(4,5) = \frac{13}{100} \end{cases} \begin{cases} c = 0, 4 \\ a.1^2 + b.1 + 0, 4 = \frac{12}{25} \\ a.4, 5^2 + b.4, 5 + 0, 4 = \frac{13}{100} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{25} \\ b = \frac{3}{25} \\ c = \frac{2}{5} \end{cases}$$
$$h(t) = -\frac{1}{25}t^2 + \frac{3}{25}t + \frac{2}{5}.$$

Độ cao của quả bóng đạt được bằng $h_{max}=\frac{49}{100}=0,5$ m khi $t=\frac{3}{2}$. Đáp án: 0,5

Câu 3. Biết đồ thị hàm số $y=-x^2+bx+c$ có đỉnh là điểm $I(-\frac{5}{2};\frac{13}{4})$. Tính P=b+c.


Lời giải.

Đồ thị hàm số đi qua A(4; -39) và H(1; -9) nên ta có:

$$\begin{cases} 4b+c-16=-39\\ \frac{b}{2}=-\frac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4b+c=-23\\ b=-5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b=-5\\ c=-3 \end{cases}$$


Đáp án: <mark>-8</mark>

Câu 4. Một mô hình mô phỏng cây cầu treo có trụ tháp đôi cao $BD = AC = \frac{128}{5}$ m và cách nhau AB = 16 m. Các dây cáp có dạng đồ thị là một Parabol như hình. Một dây nối hai điểm M và N trên dây cáp như hình. Biết dây nối cách mặt của cây cầu là $\frac{18}{5}$. Người ta muốn chăng một đoạn dây đèn trang trí nối thẳng từ điểm A đến M đến N đến B. Chiều dài đoạn dây đèn là bao nhiêu. (Chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến chữ số thập phân thứ nhất)



Đáp án: 51, 1

Lời giải.



Đặt hệ trục toạ độ Oxy vào hình vẽ sao cho đỉnh Parabol trùng với gốc toạ độ.

Parabol đi qua điểm $B\left(8; \frac{128}{5}\right)$ nên tìm được hệ số $a = \frac{2}{5}$

Điểm M, N có tung độ là $\frac{18}{5}$ suy ra hoành độ của N là 3 và hoành độ của M là -3

Độ dài
$$MN = 6$$
m, $AM = BN = \sqrt{(8-3)^2 + \left(\frac{128}{5} - \frac{18}{5}\right)^2}$

Chiều dài dây đèn là $MN + AM + BN \approx 51, 1$

Câu 5. Cho tam giác ABC có $c=4, a=5, \widehat{A}=66^{\circ}$. Tính độ dài cạnh b (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Lời giải.


$$\frac{c}{\sin C} = \frac{a}{\sin A} \Rightarrow \sin C = \frac{c \sin A}{a} = 0,731$$

$$\Rightarrow \widehat{C} = 46,96^{\circ}$$

$$\widehat{B} = 180^{\circ} - 46,96^{\circ} - 66^{\circ} = 67,04^{\circ}$$


$$\frac{b}{\sin B} = \frac{a}{\sin A} \Rightarrow b = \frac{a \sin B}{\sin A} = 5,0$$
Đáp án: 5.0

Câu 6. Bạn Quân đứng ở đỉnh của tòa nhà và quan sát chiếc diều, nhận thấy góc nâng (góc nghiêng giữa phương từ mắt của bạn Quân tới chiếc diều và phương nằm ngang) là $\alpha=32^{\circ}$; khoảng cách từ đỉnh tòa nhà tới mắt bạn Quân là 1,1m. Cùng lúc đó ở dưới chân tòa nhà, bạn Nga cũng quan sát chiếc diều và thấy góc nâng là $\beta=71^{\circ}$; khoảng cách từ mặt đất tới mắt bạn Nga cũng là 1,1m. Biết chiều cao của tòa nhà là h=21m (minh họa ở hình bên). Chiếc diều bay cao bao nhiêu mét so với mặt đất (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



Đáp án: 27,9

Lời giải.



Kí hiệu C là vị trí của chiếc diều.

Từ điểm B vẽ đường thẳng Bx vuông góc với AB.

Từ điểm C kẻ $CH \perp Bx$ (H thuộc Bx).

Từ điểm A kẻ $AK \perp CH$ (K thuộc CH).

Khi đó $\widehat{CAK} = \alpha$ và $\widehat{CBH} = \beta$.

Chiều cao của diều so với mặt đất chính là độ dài đoạn thẳng CH.

Vì khoảng cách từ đỉnh tòa nhà tới mắt bạn A và khoảng cách từ mặt đất tới mắt bạn B đều là 1, 1m nên AB = h = 21m.

Tứ giác ABHK là hình chữ nhật.

$$\widehat{CAB} = \widehat{CAK} + \widehat{KAB} = 32^{\circ} + 90^{\circ} = 122^{\circ}.$$

$$\widehat{CBA} = \widehat{ABH} - \widehat{CBH} = 90^{\circ} - 71^{\circ} = 19^{\circ}.$$

Trong tam giác ABC ta có

$$\widehat{C} = 180^{\circ} - (\widehat{A} + \widehat{B}) = 180^{\circ} - (122^{\circ} + 19^{\circ}) = 39^{\circ}.$$

Áp dụng định lí sin trong tam giác
$$ABC$$
 ta có
$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow BC = \frac{AB\sin A}{\sin C} = \frac{21\sin 122^{\circ}}{\sin 39^{\circ}} \approx 28$$

Trong tam giác CBH vuông tại H ta có

 $CH = BC \sin B \approx 28 \sin 71^{\circ} \approx 27 \text{ m}$

Vậy chiếc diều bay cao khoảng 27,9 mét so với mặt đất.

Đáp án: 27,9

—HÉТ—