


Stagione influenzale 2004/2005

Sorveglianza epidemiologica

Il rapporto presenta i risultati nazionali, elaborati dall'Istituto superiore di sanità, relativi alla sorveglianza epidemiologica dell'influenza. L'obiettivo è stimare l'incidenza settimanale della sindrome influenzale durante la stagione invernale, in modo da descrivere durata e intensità dell'epidemia. L'incidenza è espressa come numero di sindromi influenzali (casi) per 1000 assistiti per settimana.

Il grafico sottostante riporta l'incidenza totale e per singole fasce di età.



Le fasce di età maggiormente colpite sono quelle tra 0 e 4 anni e tra 5 e 14 anni in cui il livello di massima incidenza è stato, rispettivamente, di 30,01 e di 29,78 casi per mille assistiti. Nella fascia di età 15-64 anni è stato invece di 12,38 e tra gli individui di età pari o superiori a 65 anni di 8,45 per mille assistiti.

La tabella seguente mostra il numero totale di casi e i tassi d'incidenza in Italia nella stagione influenzale 2004/2005.


Settimana	Totale Medici	Totale Casi	Totale Assistiti	Incidenza Totale	0 - 4		5 - 14		15 - 64		65 e oltre	
					Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc
2004-42	650	210	845492	0,25	40	0,80	28	0,28	109	0,21	33	0,20
2004-43	697	332	907066	0,37	67	1,23	74	0,67	158	0,28	33	0,19
2004-44	755	284	985895	0,29	51	0,89	45	0,38	159	0,26	29	0,15
2004-45	809	386	1054900	0,37	60	0,98	73	0,57	203	0,31	50	0,25
2004-46	842	508	1095060	0,46	64	0,99	86	0,64	278	0,41	80	0,38
2004-47	863	715	1118847	0,64	107	1,62	122	0,89	395	0,56	91	0,42
2004-48	870	739	1128794	0,65	90	1,35	131	0,94	431	0,61	87	0,40
2004-49	862	869	1118415	0,78	142	2,20	135	0,99	500	0,71	92	0,42
2004-50	876	956	1135350	0,84	153	2,33	175	1,27	517	0,72	111	0,51
2004-51	872	1402	1130134	1,24	202	3,11	299	2,17	734	1,04	167	0,77
2004-52	859	1989	1116857	1,78	288	4,59	456	3,44	1020	1,45	225	1,03
2004-53	851	3195	1102496	2,90	421	6,39	559	4,15	1735	2,52	480	2,26
2005-01	859	3901	1116650	3,49	411	6,31	545	4,07	2369	3,37	576	2,67
2005-02	876	5749	1135002	5,07	603	8,99	1005	7,26	3394	4,77	747	3,42
2005-03	871	8926	1131789	7,89	1175	17,81	2209	16,10	4295	6,05	1247	5,70
2005-04	870	12797	1128454	11,34	1527	23,16	3453	25,26	6362	8,98	1455	6,68
2005-05	863	15388	1120885	13,73	1770	27,34	4032	29,78	7820	11,11	1766	8,15
2005-06	867	16370	1122150	14,59	1933	30,01	3867	28,76	8725	12,38	1845	8,45
2005-07	852	14026	1103065	12,72	1768	27,89	3288	24,77	7131	10,28	1839	8,61
2005-08	842	10361	1089376	9,51	1332	21,03	2513	19,07	5278	7,73	1238	5,86
2005-09	813	7253	1050834	6,90	954	15,23	1765	13,61	3583	5,45	951	4,72
2005-10	801	5147	1039688	4,95	711	11,88	1236	9,80	2501	3,83	699	3,47
2005-11	731	3249	949596	3,42	417	7,88	662	5,97	1658	2,77	512	2,75
2005-12	728	1940	945662	2,05	258	4,81	367	3,23	1021	1,72	294	1,60
2005-13	709	1099	924574	1,19	139	2,67	174	1,59	565	0,97	221	1,23
2005-14	674	789	874554	0,90	98	1,87	104	0,98	416	0,76	171	1,01
2005-15	622	530	813623	0,65	68	1,39	71	0,72	329	0,65	62	0,39
2005-16	419	261	543499	0,48	48	1,54	39	0,61	158	0,46	16	0,15

La sorveglianza della stagione influenzale 2004/2005 è riferita ad una popolazione di assistiti così suddivisa per fascia di età:

Settimana	Assistiti 0 - 4	Assistiti 5 - 14	Assistiti 15 - 64	Assistiti 65 e oltre	Assistiti Totale
2004-42	50056	101365	530787	163284	845492
2004-43	54252	110099	568037	174678	907066
2004-44	57434	118497	619812	190152	985895
2004-45	61081	127790	662601	203428	1054900
2004-46	64379	133844	685807	211030	1095060
2004-47	65920	136687	700633	215607	1118847
2004-48	66429	138889	705692	217784	1128794
2004-49	64629	136480	700761	216545	1118415
2004-50	65726	137893	713189	218542	1135350
2004-51	64968	137972	708896	218298	1130134
2004-52	62685	132539	703559	218074	1116857
2004-53	65918	134826	689369	212383	1102496
2005-01	65114	133957	702112	215467	1116650
2005-02	67038	138490	710822	218652	1135002
2005-03	65986	137168	709956	218679	1131789
2005-04	65935	136678	708184	217657	1128454
2005-05	64730	135412	704100	216643	1120885
2005-06	64409	134464	704953	218324	1122150
2005-07	63394	132760	693348	213563	1103065
2005-08	63338	131808	683047	211183	1089376
2005-09	62660	129638	656931	201605	1050834
2005-10	59830	126082	652276	201500	1039688
2005-11	52898	110840	599378	186480	949596
2005-12	53592	113473	594895	183702	945662
2005-13	51987	109096	583778	179713	924574
2005-14	52331	106443	546157	169623	874554
2005-15	48872	98480	508416	157855	813623
2005-16	31214	63492	342131	106662	543499

In questa stagione hanno inviato i dati in media 792 medici sentinella a settimana, con un massimo di 876 e un minimo di 419. La popolazione in sorveglianza è stata, mediamente, di 1.029.597 assistiti.

Il grafico riporta l'incidenza delle sindromi influenzali nelle stagioni 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005.



La curva epidemica della stagione influenzale 2004/2005 ha raggiunto il picco alla sesta settimana del 2005.

Il livello massimo di incidenza raggiunto, in questa stagione influenzale, è stato superiore rispetto a quello delle stagioni precedenti.