


Stagione influenzale 2003/2004

Sorveglianza epidemiologica

Il rapporto presenta i risultati nazionali, elaborati dall'Istituto superiore di sanità, relativi alla sorveglianza epidemiologica dell'influenza. L'obiettivo è stimare l'incidenza settimanale della sindrome influenzale durante la stagione invernale, in modo da descrivere durata e intensità dell'epidemia. L'incidenza è espressa come numero di sindromi influenzali (casi) per 1000 assistiti per settimana.

Il grafico sottostante riporta l'incidenza totale e per singole fasce di età.



La fascia d'età maggiormente colpita è quella tra 0 e 4 anni in cui il livello di massima incidenza è stato di 14,50 casi per 1000 assistiti, nella fascia 5-14 anni di 9,09, in quella 15-64 anni di 4,04 e di 2,37 tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni.

La tabella seguente mostra il numero totale di casi e i tassi d'incidenza in Italia nella stagione influenzale 2003/2004.


Settimana	Totale Medici	Totale Casi	Totale Assistiti	Incidenza Totale	0 - 4		5 - 14		15 - 64		65 e oltre	
					Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc
2003-42	776	357	1000656	0,36	43	0,71	48	0,39	206	0,33	60	0,31
2003-43	824	500	1066723	0,47	61	0,96	66	0,50	299	0,45	74	0,36
2003-44	887	597	1150866	0,52	72	1,07	76	0,54	354	0,49	95	0,43
2003-45	922	723	1204797	0,60	90	1,33	98	0,68	431	0,57	104	0,45
2003-46	955	742	1251026	0,59	90	1,29	95	0,64	438	0,55	119	0,49
2003-47	952	866	1244433	0,70	113	1,60	119	0,80	523	0,67	111	0,46
2003-48	956	805	1250648	0,64	108	1,52	125	0,83	488	0,62	84	0,35
2003-49	949	990	1242983	0,80	142	2,04	175	1,19	562	0,71	111	0,46
2003-50	960	1238	1256363	0,99	207	2,96	211	1,42	690	0,87	130	0,54
2003-51	949	1615	1242043	1,30	225	3,22	293	1,99	898	1,14	199	0,83
2003-52	922	1589	1207104	1,32	208	3,13	313	2,23	880	1,15	188	0,80
2004-01	917	2058	1202319	1,71	169	2,63	308	2,22	1297	1,69	284	1,22
2004-02	940	2670	1227765	2,17	240	3,53	353	2,44	1755	2,25	322	1,36
2004-03	950	3512	1243420	2,82	440	6,39	586	4,00	2092	2,65	394	1,64
2004-04	947	4543	1237574	3,67	805	11,57	945	6,43	2391	3,05	402	1,70
2004-05	947	5440	1236811	4,40	851	12,48	1225	8,39	2925	3,73	439	1,84
2004-06	951	5988	1240307	4,83	968	13,95	1340	9,09	3172	4,04	508	2,14
2004-07	934	5809	1222902	4,75	963	14,50	1283	9,04	3005	3,86	558	2,37
2004-08	932	5618	1215472	4,62	878	12,82	1272	8,76	2960	3,85	508	2,18
2004-09	919	4793	1197005	4,00	718	10,66	1099	7,66	2521	3,33	455	1,99
2004-10	919	4267	1198232	3,56	612	9,25	1051	7,39	2200	2,89	404	1,76
2004-11	916	3922	1191925	3,29	614	9,30	976	6,88	2018	2,67	314	1,38
2004-12	899	3205	1168862	2,74	434	6,51	914	6,51	1566	2,12	291	1,30
2004-13	877	2458	1144868	2,15	391	5,95	761	5,50	1124	1,56	182	0,83
2004-14	850	1870	1110636	1,68	259	4,08	572	4,29	911	1,30	128	0,60
2004-15	818	1285	1067732	1,20	159	2,64	370	2,87	649	0,96	107	0,53
2004-16	778	782	1016345	0,77	96	1,72	196	1,62	405	0,63	85	0,44
2004-17	695	539	901833	0,60	74	1,49	124	1,16	273	0,48	68	0,39

La sorveglianza della stagione influenzale 2003/2004 è riferita ad una popolazione di assistiti così suddivisa per fascia di età:

Settimana	Assistiti 0 - 4	Assistiti 5 - 14	Assistiti 15 - 64	Assistiti 65 e oltre	Assistiti Totale
2003-42	60552	124369	624850	190885	1000656
2003-43	63246	130992	668897	203588	1066723
2003-44	67190	140176	724178	219322	1150866
2003-45	67698	144237	760942	231920	1204797
2003-46	69826	148325	792406	240469	1251026
2003-47	70630	149176	785088	239539	1244433
2003-48	70893	149869	789786	240100	1250648
2003-49	69728	147142	786028	240085	1242983
2003-50	69854	148522	796545	241442	1256363
2003-51	69775	146986	786760	238522	1242043
2003-52	66498	140657	766001	233948	1207104
2004-01	64167	138457	767556	232139	1202319
2004-02	68036	144499	779243	235987	1227765
2004-03	68895	146349	788509	239667	1243420
2004-04	69575	147078	784420	236501	1237574
2004-05	68181	145941	784564	238125	1236811
2004-06	69397	147342	785714	237854	1240307
2004-07	66420	141905	778672	235905	1222902
2004-08	68480	145206	768755	233031	1215472
2004-09	67357	143483	757337	228828	1197005
2004-10	66184	142221	760293	229534	1198232
2004-11	66033	141839	755914	228139	1191925
2004-12	66678	140349	737824	224011	1168862
2004-13	65752	138354	722765	217997	1144868
2004-14	63431	133216	701362	212627	1110636
2004-15	60200	128768	675375	203389	1067732
2004-16	55831	120664	645241	194609	1016345
2004-17	49767	107274	570423	174369	901833

In questa stagione hanno inviato dati in media 901 medici sentinella a settimana, con un massimo di 960 e un minimo di 695. La popolazione in sorveglianza è stata, mediamente, di 1.176.488 assistiti.

Il grafico riporta l'incidenza delle sindromi influenzali nelle stagioni 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004.



La curva epidemica della stagione influenzale 2003/2004 ha raggiunto il picco alla sesta settimana del 2004. Il livello massimo di incidenza raggiunto, in questa stagione influenzale, è stato inferiore rispetto a quello delle stagioni precedenti.