


Stagione influenzale 2005/2006

Sorveglianza epidemiologica

Il rapporto presenta i risultati nazionali, elaborati dall'Istituto superiore di sanità, relativi alla sorveglianza epidemiologica dell'influenza. L'obiettivo è stimare l'incidenza settimanale della sindrome influenzale durante la stagione invernale, in modo da descrivere durata e intensità dell'epidemia. L'incidenza è espressa come numero di sindromi influenzali (casi) per 1000 assistiti per settimana.

Il grafico sottostante riporta l'incidenza totale e per singole fasce di età.



La fascia di età maggiormente colpita è quella tra 0 e 14 anni anche se in questa stagione, a differenza delle precedenti, non si osserva una netta differenza con le altre fasce d'età. Il livello massimo raggiunto dall'incidenza nella fascia d'età 0-4 anni è stato 8,52, nella fascia 5-14 anni di 7,41, in quella 15-64 anni di 2,10 e tra gli individui di età pari o superiori a 65 anni di 1,21 casi per mille assistiti.

La tabella seguente mostra il numero totale di casi e i tassi d'incidenza in Italia nella stagione influenzale 2005/2006.


Settimana	Totale Medici	Totale Casi	Totale Assistiti	Incidenza Totale	0 - 4		5 - 14		15 - 64		65 e oltre	
					Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc
2005-42	835	276	1070858	0,26	40	0,60	44	0,32	160	0,24	32	0,15
2005-43	861	311	1110383	0,28	37	0,56	51	0,37	178	0,26	45	0,21
2005-44	904	361	1166611	0,31	51	0,74	49	0,34	211	0,29	50	0,22
2005-45	907	431	1170176	0,37	65	0,94	61	0,42	264	0,36	41	0,18
2005-46	908	567	1169337	0,48	88	1,26	102	0,70	312	0,43	65	0,28
2005-47	932	786	1205935	0,65	115	1,63	117	0,79	469	0,63	85	0,36
2005-48	921	869	1193932	0,73	139	2,00	144	0,99	483	0,65	103	0,43
2005-49	943	884	1219439	0,72	154	2,14	170	1,12	482	0,64	78	0,32
2005-50	936	1102	1213338	0,91	167	2,30	198	1,30	612	0,82	125	0,52
2005-51	921	1229	1198878	1,03	215	3,16	231	1,57	664	0,89	119	0,50
2005-52	909	1398	1173595	1,19	236	3,40	239	1,62	744	1,03	179	0,77
2006-01	922	1529	1195086	1,28	205	2,96	267	1,83	856	1,15	201	0,85
2006-02	940	1892	1214098	1,56	192	2,70	261	1,74	1226	1,63	213	0,89
2006-03	943	2230	1218285	1,83	302	4,20	388	2,56	1285	1,70	255	1,06
2006-04	938	2489	1215707	2,05	420	5,93	472	3,19	1336	1,77	261	1,08
2006-05	930	2773	1207067	2,30	494	7,12	647	4,41	1371	1,83	261	1,09
2006-06	938	2970	1212493	2,45	552	7,77	651	4,38	1489	1,98	278	1,15
2006-07	933	3029	1206890	2,51	503	7,18	661	4,50	1574	2,10	291	1,21
2006-08	924	3091	1196278	2,58	562	8,03	791	5,38	1460	1,97	278	1,17
2006-09	901	3029	1166752	2,60	570	8,52	724	5,14	1481	2,04	254	1,09
2006-10	906	2951	1171636	2,52	492	7,33	872	6,15	1381	1,89	206	0,88
2006-11	893	3102	1157701	2,68	532	8,09	983	7,04	1361	1,89	226	0,98
2006-12	880	3089	1142725	2,70	529	8,30	1013	7,41	1333	1,87	214	0,93
2006-13	855	2491	1108213	2,25	431	6,88	878	6,55	1021	1,48	161	0,72
2006-14	820	1846	1063264	1,74	307	5,09	665	5,11	761	1,15	113	0,54
2006-15	743	1104	967359	1,14	229	4,34	365	3,22	453	0,75	57	0,29
2006-16	692	668	899141	0,74	129	2,75	205	1,97	271	0,48	63	0,35
2006-17	598	382	791858	0,48	66	1,66	120	1,34	173	0,34	23	0,14

La sorveglianza della stagione influenzale 2005/2006 è riferita ad una popolazione di assistiti così suddivisa per fascia di età:

Settimana	Assistiti 0 - 4	Assistiti 5 - 14	Assistiti 15 - 64	Assistiti 65 e oltre	Assistiti Totale
2005-42	67212	138193	658030	207423	1070858
2005-43	66330	137933	689835	216285	1110383
2005-44	69358	145478	723565	228210	1166611
2005-45	69165	144888	725643	230480	1170176
2005-46	70064	146415	722665	230193	1169337
2005-47	70672	148324	749131	237808	1205935
2005-48	69501	146162	741404	236865	1193932
2005-49	72046	151584	755761	240048	1219439
2005-50	72520	151726	750130	238962	1213338
2005-51	68011	147544	745192	238131	1198878
2005-52	69340	147165	725513	231577	1173595
2006-01	69327	146255	742299	237205	1195086
2006-02	71149	149717	752891	240341	1214098
2006-03	71856	151320	754275	240834	1218285
2006-04	70849	148100	755386	241372	1215707
2006-05	69348	146849	750884	239986	1207067
2006-06	71060	148682	751861	240890	1212493
2006-07	70062	146976	749582	240270	1206890
2006-08	69993	147074	741953	237258	1196278
2006-09	66864	140731	726081	233076	1166752
2006-10	67141	141876	729308	233311	1171636
2006-11	65772	139601	721479	230849	1157701
2006-12	63766	136794	712878	229287	1142725
2006-13	62670	134146	689070	222327	1108213
2006-14	60368	130086	661847	210963	1063264
2006-15	52715	113508	607175	193961	967359
2006-16	46944	104071	570036	178090	899141
2006-17	39863	89301	502371	160323	791858

In questa stagione hanno inviato dati in media 883 medici sentinella a settimana, con un massimo di 943 e un minimo di 598. La popolazione in sorveglianza è stata, mediamente, di 1.143.823 assistiti.

Il grafico riporta l'incidenza delle sindromi influenzali nelle stagioni 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006.



La curva epidemica della stagione influenzale 2005/2006 ha raggiunto il picco alla 12 settimana del 2006. Il livello massimo di incidenza raggiunto, in questa stagione influenzale, è stato inferiore rispetto a quello delle stagioni precedenti.