SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TPHCM TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ

KÝ THI HỌC KÝ I – NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn thi: Vật Lí 12 (ban cơ bản)

Thời gian làm bài: 50 phút (không tính thời gian giao đề) (40 câu trắc nghiêm)

Thứ ngày ... tháng 12 năm 2016

Mã đề thi 122

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:....

Câu 1: Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ góc là π rad/s. Hình chiếu của vật trên một đường kính dao động điều hòa với tần số góc, chu kì và tần số bằng bao nhiều

A. 3π rad/s; 2s; 0,5Hz **B.** 2π rad/s; 0,5s; 2Hz **C.** π rad/s; 2s; 0,5Hz

D. 0.5π rad/s; 4s; 2Hz

Câu 2: Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiều

A. 9%

B. 6%

C. 97%

D. 91%

Câu 3: Một lá thép dao động với chu kì T = 50ms. Âm do lá thép phát ra có nghe được không

A. không thể nghe được vì âm có tần số quá bé nằm trong vùng hạ âm

B. nghe được vì âm có tần số nằm trong vùng của sóng âm

C. nghe được vì âm có tần số ở ngưỡng siêu âm

D. không thể nghe được vì âm có tần số quá lớn ở ngưỡng siêu âm

Câu 4: Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là ĐÚNG

A. Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ

B. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng

C. Mỗi chu kỳ dao đông của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng đông năng

D. Đông năng của vật đạt cực đại khi vật ở vi trí hai biên

Câu 5: Trong thí nghiệm giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp S₁S₂ cùng pha, biết sóng truyền với tốc độ 0,5m/s và cần rung dao động với tần số 40Hz. Khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn S₁S₂ là

A. $6,25.10^{-3}$ m

B. 6,25 cm

C. 62,50 cm

D. 0,625 m

Câu 6: Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh có R; $L = \frac{200}{\pi}$ (mH); $C = \frac{1000}{4\pi}$ (μ F). Biết biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là $i = 2\cos(100\pi t - \frac{\pi}{2})$ (A) và lệch pha so với điện áp hai đầu mạch một $góc \frac{\pi}{4}$. Giá trị điện trở R bằng

B. 40 Ω

 $\mathbf{C.}\ 20\ \Omega$

 \mathbf{D} , $80\,\Omega$

Câu 7: Dây AB dài ℓ = 87,5cm một đầu cố định – một đầu tự do đang có sóng dừng xảy ra. Tốc độ truyền sóng trên dây là 50m/s; tần số sóng là 100Hz. Tìm số nút – số bụng xuất hiện trên dây

 $\mathbf{A.4}$ nút -4 bung

B. 3 nút − 4 bung

 $\mathbf{C.4}$ nút -3 bung

D. 3 nút - 3 bung

Câu 8: Một nguồn phát sóng âm S coi như một nguồn điểm, đẳng hướng . Tại hai điểm M và N có mức cường độ âm lần lượt là 80 (dB) và 60 (dB). Biết khoảng cách từ nguồn S đến M là 1 (m), khoảng cách từ S đến điểm N là

A. 100 (m)

B. 10 (cm)

C. 100 (cm)

D. 10 (m)

Câu 9: Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp có điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các phần tử lần lượt là $U_R = 50$ (V); $U_L = 150$ (V); $U_C = 100$ (V). Điện áp hiệu dụng U giữa hai đầu đoạn mạch là

A. U = 100 (V)

B. U = $50\sqrt{2}$ (V)

C. U = 50 (V)

D. U = $100\sqrt{2}$ (V)

Câu 10: Một sóng cơ truyền từ nguồn O đến điểm M trên dây có phương trình tại M là $u_M = 2\cos(10\pi t - \frac{\pi x}{10})$ cm. Trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Vận tốc truyền sóng trên dây là

A. v = 1.0 m/s

B. v = 10 cm/s

C. v = 5.0 m/s

D. v = 50 cm/s

Câu 11: Dung kháng của một đoạn mạch RLC nối tiếp đang có giá trị lớn hơn cảm kháng. Ta làm thay đổi chỉ một trong các thông số của đoạn mạch bằng các cách nêu dưới đây, cách nào có thể làm cho hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra

A. Tăng tần số dòng điện

C. Giảm điện dung của tụ điện

B. Giảm tần số góc của dòng điện

D. Giảm hệ số tự cảm của cuộn dây

Câu 12: Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số sẽ cùng pha khi độ lệch pha Δφ

$$\mathbf{A.} \Delta \boldsymbol{\varphi} = (2k+1)\pi \ (k \in \mathbf{Z})$$

C.
$$\Delta \phi = (2k+1)^{\frac{\pi}{2}} (k \in \mathbb{Z})$$

B.
$$\Delta \varphi = 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$$

$$\mathbf{D.} \ \Delta \boldsymbol{\varphi} = (2k+1)^{\frac{\pi}{4}} \ (k \in \mathbf{Z})$$

Câu 13: Trong thí nghiệm sóng cơ với một cần rung, tạo bởi thanh thép mỏng, đàn hồi, một đầu được kẹp chặt bằng êtô, đầu kia có gắn một mũi nhọn S và dưới cần rung có một chậu nước rộng (hình vẽ). Cho mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước và tiến hành quan sát. Ở một thời điểm t, người ta đo được đường kính 5 gọn sóng hình tròn liên tiếp lần lượt bằng: 12,40cm; 14,30cm; 16,35cm; 18,30cm; 20,45cm. Hãy tính tốc độ truyền sóng biết rằng cần rung được cho dao động với tần số 50Hz

A.
$$v = 40 \text{ cm/s}$$

B.
$$v = 10 \text{ cm/s}$$

C.
$$v = 50 \text{ cm/s}$$

D.
$$v = 20 \text{ cm/s}$$

Câu 14: Đặt điện áp $u = 200\sqrt{2}\cos(100\pi t - \frac{\pi}{3})$ (V) vào hai đầu một đoạn mạch thì dòng điện trong mạch có biểu thức $i = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t)$ (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu 15: Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh có $R = 100 \, (\Omega)$; $L = \frac{1}{\pi} \, (H)$; $C = \frac{10^{-4}}{2\pi} \, (F)$. Biết biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là $i = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t + \frac{\pi}{4})$ (A). Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là

A.
$$u = 400\cos(100\pi t)$$
 (V)

B.
$$u = 400\cos(100\pi t + \frac{\pi}{2}) (V)$$

C.
$$u = 400\sqrt{2}\cos(100\pi t)$$
 (V)

D.
$$u = 400\sqrt{2}\cos(100\pi t - \frac{\pi}{2})$$
 (V)

Câu 16: Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L = \frac{500}{\pi}$ mH. Cho dòng điện xoay chiều có tần số f = 50Hz chạy qua cuộn dây. Cảm kháng của cuộn dây là

A.
$$Z_L = 250\Omega$$

B.
$$Z_L = 100\Omega$$

$$\mathbf{C.} \mathbf{Z_L} = 150\mathbf{\Omega}$$

$$\mathbf{D} \cdot \mathbf{Z}_{\mathrm{L}} = 50\Omega$$

Câu 17: Chu kỳ dao động là

A. Số dao động toàn phần vật thực hiện trong 1s

B. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ biên này đến biên kia của quỹ đạo chuyển động

C. Khoảng thời gian trung bình ngắn nhất để vật trở lại vị trí đầu

D. Khoảng thời gian vật thực hiện được 1 dao động toàn phần

Câu 18: Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều

A. chỉ được đo bằng các ampe kế xoay chiều

B. được xác định dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện xoay chiều

C. bằng giá trị trung bình chia cho $\sqrt{2}$

D. bằng giá trị cực đại chia cho 2

Câu 19: Điều kiện nào để hiện tượng cộng hưởng cơ xảy ra

A. Tần số f của lực cưỡng bức phải lớn hơn tần số riêng f_0 của hệ dao động

B. Tần số f của lực cưỡng bức phải nhỏ hơn tần số riêng f₀ của hệ dao động

C. Tần số f của lực cưỡng bức bắt buộc phải lớn hơn nhiều lần hoặc phải nhỏ hơn nhiều lần tần số riêng f_0 của hệ dao động

 \mathbf{D} . Tần số f của lực cưỡng bức bằng tần số riêng f_0 của hệ dao động

Câu 20: Hiện tượng giao thoa sóng là hiện tượng

A. hai sóng khi gặp nhau có những điểm chúng luôn luôn tăng cường nhau, có những điểm chúng luôn luôn triết tiêu nhau

B. tạo thành các gọn lồi lõm

C. tổng hợp của hai dao động

D. giao nhau của hai sóng tại một điểm của môi trường

Câu 21: Một vật tham gia đồng thời hai dao động	điều hòa cùng phương cùng tần số. Biết phương trình			
của dao động thứ nhất là $x_1 = 4\sqrt{3}\cos(10\pi t)$	$+\frac{\pi}{2}$) cm và phương trình dao động thứ hai là			
$x_2 = 4\cos(10\pi t - \frac{\pi}{3})$ cm. Phương trình dao động tổng hợp $x = x_1 + x_2$ là				
A. $x = 4\cos(10\pi t + \frac{\pi}{3})$ cm	B. $x = 4\sqrt{2}\cos(10\pi t - \frac{3\pi}{4})$ cm			
C. $x = 4\cos(10\pi t + \frac{\pi}{4})$ cm	D. $x = 4\sqrt{2}\cos(10\pi t - \frac{\pi}{12})$ cm			
Câu 22: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây SAI				
A. Tại mỗi điểm của môi trường có sóng truyền qua, biên độ của sóng là biên độ dao động của phần tử				
môi trường				

B. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng goi là sóng ngang

C. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha nhau

D. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi là sóng dọc

Câu 23: Sóng cơ là

A. sự truyền chuyển động của các phần tử trong một môi trường

B. dao động lan truyền trong một môi trường

C. một dạng chuyển động đặc biệt của môi trường

D. dao động của mọi điểm trong một môi trường

Câu 24: Các đặc trưng sinh lý của âm gồm

Câu 25: Một vật dao động điều hòa theo phương nằm ngang với quỹ đạo là đoạn thẳng dài 10 (cm). Gia tốc lớn nhất của vật trong quá trình dao động là 20 (m/s²). Vận tốc lớn nhất của vật trong quá trình dao động là

A.
$$v_{max} = 50 \text{ (cm/s)}$$

B.
$$v_{max} = 0.4 \text{ (m/s)}$$

$$C_{\bullet} v_{\text{max}} = 100 \text{ (cm/s)}$$

D.
$$v_{max} = 1,5 \text{ (m/s)}$$

Câu 26: Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng

A. hai bước sóng

B. một phần tư bước sóng

C. môt bước sóng

D. một nửa bước sóng

Câu 27: Điều kiện để có hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra là

$$A. \omega = \frac{1}{\pi LC}$$

$$\mathbf{B.}\;\boldsymbol{\omega^2} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$C. \omega^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\mathbf{D.} \omega = \frac{1}{\pi \sqrt{LC}}$$

Câu 28: Cường độ dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R thì

A. le pha hơn điện áp ở hai đầu mạch góc $\frac{\pi}{2}$

B. cùng pha với điện áp ở hai đầu mạch

C. chậm pha hơn điện áp ở hai đầu mạch gốc $\frac{\pi}{2}$ D. ngược pha với điện áp ở hai đầu mạch

Câu 29: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 500 vòng, cuộn thứ cấp gồm 1500 vòng. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 100 (V). Bỏ qua mọi hao phí. Máy biến áp này là tăng hay hạ áp và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là bao nhiêu

A. máy hạ áp với điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là $U_2 = 70$ (V)

B. máy hạ áp với điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là $U_2 = 50$ (V)

C. máy tăng áp với điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là $U_2 = 220$ (V)

D. máy tăng áp với điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là $U_2 = 300 \text{ (V)}$

Câu 30: Một con lắc lò xo có có độ cứng k = 40N/m. Treo một vật có khối lượng m vào lò xo, vật dao động điều hòa trên quỹ đạo có chiều dài 10cm. Tìm động năng của vật tại vị trí có li độ x = 2cm

A. 0,032J

B. 0,042J

C. 0,056J

D. 0,215J

Câu 31: Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chỉ chứa duy nhất một tụ điện có phương trình là $u = 200\sqrt{2}cos(100\pi t) \text{ (V) và cường độ hiệu dụng qua mạch là 2 (A). Điện dung C của tụ là }$ $\mathbf{A. C} = \frac{10^{-4}}{\pi} \text{ (F)} \qquad \mathbf{B. C} = \frac{10^{-8}}{2\pi} \text{ (F)} \qquad \mathbf{C. C} = \frac{10^{-8}}{\pi} \text{ (F)} \qquad \mathbf{D. C} = \frac{10^{-4}}{2\pi} \text{ (F)}$

A. C =
$$\frac{10^{-4}}{10^{-4}}$$
 (F)

B. C =
$$\frac{10^{-8}}{2}$$
 (F)

C.
$$C = \frac{10^{-8}}{}$$
 (F)

D. C =
$$\frac{10^{-4}}{2\pi}$$
 (F)

Câu 32: Một con lắc đơn có chiều dài $\ell = 2,00$ m; dao động điều hòa tại một nơi có gia tốc rơi tự do $g = 9.79 \text{m/s}^2$. Hỏi con lắc đơn thực hiện được bao nhiều dao động toàn phần N trong 568 giây

A.
$$N = 195,76$$

B.
$$N = 180,92$$

$$C. N = 250,13$$

D.
$$N = 200,00$$

•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50Hz. Quan sát sóng dừng	
trên dây, người ta thấy có 5				
A. $v = 50 \text{ m/s}$		C. v = 45 m/s	D. $v = 35 \text{ m/s}$	
_	điều hòa có quỹ đạo là m	ột đoạn thăng dài 20 cm.	Biên độ dao động của vật là	
bao nhiêu	D 20	C 5	D 10	
A. 4cm	B. 20cm	C. 5cm	D. 10cm	
Câu 35: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì $T = 0.5$ s và khối lượng của quả nặng là $m = 400$ g. Lấy $\pi^2 = 10$, độ cứng k của lò xo là				
A. 32 N/m	B. 50 N/m	C. 64 N/m	D. 45 N/m	
			_	
Câu 36: Cho đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp có các giá trị: điện trở thuần $R = 50\Omega$; cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Người ta đặt vào hai đầu mạch điện hiệu điện thế xoay chiều				
$u = 200\cos(100\pi t)$ (V) thì cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua mạch có giá trị lớn nhất. Hãy tính				
công suất tiêu thụ của mạch lúc này				
A. 400 W	B. 800 W	C. 500 W	D. 1000 W	
Câu 37: Con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình $x = 5\cos(20\pi t + \frac{\pi}{4})$ (cm). Thế năng và động				
năng của con lắc này dao động với chu kỳ bằng bao nhiêu				
$\mathbf{A.}\ 0.10\ (s)$	B. 0,20 (s)	C. 0,05 (s)	D. 0,15 (s)	
Câu 38: Chọn phát biểu ĐƯ				
A. Sóng dọc là sóng trong đó phương dao động của các phần tử của môi trường trùng với phương				
truyên				
B. Sóng dọc là sóng truyền dọc theo một sợi dây theo trục tung trong hệ trục tọa độ Oxy				
C. Sóng ngang là sóng trong đó phương dao động của các phần tử của môi trường trùng với phương truyền				
D. Sóng ngang là sóng truyền theo trục hoành Ox trong hệ trục tọa độ Oxy				
Câu 39: Đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa duy nhất một phần tử là cuộn dây thuần cảm thì				
A. Điện áp luôn chậm pha hơn dòng điện $\frac{\pi}{2}$ B. Dòng điện ngược pha với điện áp				
	4	D. Điện áp luôn sớm pha		
Câu 40: Trong cùng một khoảng thời gian, một con lắc đơn có chiều dài ℓ thực hiện được 30 dao động toàn phần. Giảm chiều dài của con lắc đi 20cm thì cũng trong khoảng thời gian đó nó thực hiện được 50 dao động toàn phần. Tính chiều dài ban đầu ℓ của con lắc đơn này				
A. $\ell = 0.03125$ (cm)	B. $\ell = 31,25 \text{ (m)}$	$C. \ell = 312,5 \text{ (cm)}$	D. $\ell = 0.3125 \text{ (m)}$	
HÉT				
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)				