

*Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề*

MÃ ĐỀ 472

Cho biết: hằng số Plăng  $h = 6,625 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$ ; độ lớn điện tích nguyên tố  $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ ; tốc độ ánh sáng trong chân không  $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ .

**Câu 1:** Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của electron trong nguyên tử hidro là  $r_0$ . Khi electron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo M thì bán kính quỹ đạo giảm bớt

- A.  $12 r_0$ .                      B.  $4 r_0$ .                      C.  $16 r_0$ .                      D.  $9 r_0$ .

**Câu 2:** Quang điện trở có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng

- A. quang phát quang.                      B. quang điện trong.                      C. quang điện ngoài.                      D. nhiệt điện.

**Câu 3:** Một kim loại có công thoát electron là  $7,2 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ . Chiếu lần lượt vào kim loại này các bức xạ có bước sóng  $\lambda_1 = 0,18 \mu\text{m}$ ,  $\lambda_2 = 0,21 \mu\text{m}$ ,  $\lambda_3 = 0,32 \mu\text{m}$  và  $\lambda_4 = 0,35 \mu\text{m}$ . Những bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện ở kim loại này có bước sóng là

- A.  $\lambda_2, \lambda_3$  và  $\lambda_4$ .                      B.  $\lambda_1$  và  $\lambda_2$ .                      C.  $\lambda_1, \lambda_2$  và  $\lambda_3$ .                      D.  $\lambda_3$  và  $\lambda_4$ .

**Câu 4:** Hiện nay, bức xạ được sử dụng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay là

- A. tia hồng ngoại.                      B. tia tử ngoại.                      C. tia X.                      D. tia gamma.

**Câu 5:** Một nguồn sáng đa sắc đặt tại khe F của ống chuẩn trực trong máy quang phổ lăng kính. Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong máy quang phổ lăng kính là

- A. một chùm tia phân kì có nhiều màu khác nhau.  
B. tập hợp nhiều chùm sáng song song, có hướng khác nhau.  
C. một chùm tia phân kì cùng màu với màu của nguồn sáng.  
D. một chùm tia sáng song song cùng màu với màu của nguồn sáng.

**Câu 6:** Trong thí nghiệm về giao thoa với khe lưỡng. Khoảng cách hai khe 3mm, hình ảnh giao thoa hứng trên màn cách hai khe 3m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng  $\lambda$ , khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp đo được 4mm. Bước sóng  $\lambda$  bằng

- A.  $0,50 \mu\text{m}$ .                      B.  $0,40 \mu\text{m}$ .                      C.  $0,55 \mu\text{m}$ .                      D.  $0,60 \mu\text{m}$ .

**Câu 7:** Chùm tia laze được tạo thành bởi các hạt gọi là

- A. prôtôn.                      B. notron.                      C. electron.                      D. phôtôn

**Câu 8:** Gọi  $v_1, v_2, v_3$  là tốc độ ánh sáng đơn sắc đỏ, lục, lam truyền trong một môi trường trong suốt. Ta có

- A.  $v_3 < v_2 < v_1$ .                      B.  $v_1 < v_2 < v_3$ .                      C.  $v_3 < v_1 < v_2$ .                      D.  $v_1 < v_3 < v_2$ .

**Câu 9:** Biết bán kính Bo là  $r_0 = 5,3 \cdot 10^{-11} \text{ m}$ . Bán kính quỹ đạo dừng M trong nguyên tử hidro là

- A.  $15,9 \cdot 10^{-11} \text{ m}$ .                      B.  $47,7 \cdot 10^{-11} \text{ m}$ .                      C.  $84,8 \cdot 10^{-11} \text{ m}$ .                      D.  $21,2 \cdot 10^{-11} \text{ m}$ .

**Câu 10:** Quang điện trở là một điện trở làm bằng

- A. sợi kim loại.                      B. sợi quang.                      C. chất quang dẫn.                      D. sợi thủy tinh.

**Câu 11:** Công thoát electron của một kim loại là 2,48 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là

- A. 800 nm.                      B. 500  $\mu\text{m}$ .                      C. 0,5  $\mu\text{m}$ .                      D. 0,5 nm.

**Câu 12:** Trong các bức xạ sau : ánh sáng nhìn thấy, tia X, tia  $\gamma$ , tia tử ngoại, bức xạ có tần số nhỏ nhất là

- A. tia tử ngoại.                      B. tia X.                      C. tia  $\gamma$ .                      D. ánh sáng nhìn thấy.

**Câu 13:** Tia hồng ngoại và tia tử ngoại **không** có tính chất chung sau đây ?

- A. Có bản chất là sóng điện từ.                      B. Là các tia không nhìn thấy.  
C. Có thể gây ra hiện tượng quang điện ngoài.                      D. Không bị lệch trong điện trường, từ trường.

**Câu 14:** Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng  $0,45\mu\text{m}$ . Khoảng vân giao thoa trên màn bằng

- A. 0,2 mm.                      B. 0,6 mm.                      C. 0,9 mm.                      D. 0,5 mm.

**Câu 15:** Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe Young được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng  $\lambda$ . Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân sáng thứ ba ( tính từ vân sáng trung tâm ) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe Young đến M có độ lớn bằng

- A.  $2\lambda$ .                      B.  $4\lambda$ .                      C.  $3\lambda$ .                      D.  $6\lambda$ .

**Câu 16:** Trong máy phân tích quang phổ hoạt động dựa vào hiện tượng

- A. phản xạ ánh sáng.                      B. tán sắc ánh sáng.                      C. giao thoa ánh sáng.                      D. khúc xạ ánh sáng.

**Câu 17:** Chiếu một chùm sáng đơn sắc mà mỗi photon mang năng lượng  $\varepsilon = E_N - E_K$ , trong đó  $E_N$ ,  $E_K$  là mức năng lượng của nguyên tử hidro ở trạng ở quỹ đạo dừng N và K, vào một đám khí hidro. Số quang phổ mà ta thu được bằng

- A. 6.                      B. 3.                      C. 5.                      D. 4.

**Câu 18:** Khi chiếu một bức xạ kích thích vào một chất lỏng thì chất lỏng này phát ra ánh sáng huỳnh quang màu lục. Bức xạ kích thích đó **không** thể là

- A. ánh sáng đơn sắc vàng.                      B. tia tử ngoại.  
C. ánh sáng đơn sắc chàm.                      D. ánh sáng đơn sắc lam.

**Câu 19:** Giới hạn quang điện của một kim loại là  $0,50\mu\text{m}$ . Giả sử một electron hấp thụ photon sử dụng một phần năng lượng làm công thoát, phần còn lại biến thành động năng K của nó. Chiếu vào tấm kim loại trên  $0,30\mu\text{m}$ , thì động năng ban đầu cực đại của electron (electron) quang điện là

- A. 1,656 eV.                      B. 1,456 eV.                      C. 2,656 eV.                      D. 2,456 eV.

**Câu 20:** Hiện tượng quang điện ngoài và hiện tượng quang điện trong đều

- A. là hiện tượng vật liệu dẫn điện kém trở thành dẫn điện tốt khi được chiếu ánh sáng thích hợp.  
B. được ứng dụng để chế tạo pin quang điện.  
C. là hiện tượng electron bức ra khỏi kim loại khi chiếu ánh sáng thích hợp.  
D. phải có điều kiện về bước sóng giới hạn cho ánh sáng kích thích để hiện tượng có thể xảy ra.

**Câu 21:** Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng ?

- A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion hóa mạnh các chất khí.  
B. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại.  
C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều gây ra hiện tượng quang điện đối với mọi kim loại.  
D. Một vật bị nung nóng phát ra tia tử ngoại, khi đó vật không phát ra tia hồng ngoại.

**Câu 22:** Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây đúng ?

- A. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.  
B. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống những vạch tối nằm trên nền màu quang phổ liên tục.  
C. Quang phổ vạch phát xạ do những chất rắn hoặc lỏng phát ra khi bị nung nóng.  
D. Trong quang phổ vạch phát xạ của hidro, ở vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là vạch đỏ, vạch cam, vạch chàm và vạch tím.

**Câu 23:** Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với khe Young, khoảng cách giữa hai khe là 2mm khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m, bước sóng dùng trong thí nghiệm là  $0,5\mu\text{m}$ . Khoảng cách từ vân sáng thứ 6 và vân tối thứ 9 nằm ở hai bên vân sáng trung tâm bằng

- A. 5,745mm.                      B. 5,425 mm.                      C. 4,635 mm                      D. 3,625 mm.

**Câu 24:** Một lăng kính thủy tinh có tiết diện thẳng là một tam giác cân đỉnh A. Khi chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp vuông góc với mặt bên AB thì vừa có hiện tượng phản xạ toàn phần đối tia sáng lục ở mặt bên AC. Tia ló ra khỏi mặt bên AC ( trừ tia lục ) là các tia có màu

- A. đỏ cam, chàm, tím.                      B. lam, chàm, tím.                      C. trắng.                      D. đỏ, cam, vàng.

**Câu 25:** Khi ánh sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì

- A. tần số không đổi nhưng màu thay đổi.                      B. màu không đổi nhưng tần số thay đổi.  
C. cả tần số lẫn màu đều không đổi.                      D. cả tần số lẫn màu đều thay đổi.

**Câu 26:** Chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đơn sắc là 1,6852. Tốc độ của ánh sáng này trong thủy tinh đó là

- A.  $1,59.10^8$  m/s.                      B.  $1,78.10^8$  m/s.                      C.  $1,87.10^8$  m/s.                      D.  $1,67.10^8$  m/s.

**Câu 27:** Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng đơn sắc với khe Young, hai vị trí M,N trên màn là vân sáng, giữa M và N còn có 9 vân sáng nữa. Khoảng cách MN = 40 mm, khoảng cách giữa hai khe Young là 0,2 mm, khoảng cách từ hai khe Young đến màn là 1,6 m. Bước sóng dùng trong thí nghiệm là

- A.  $0,45\mu\text{m}$ . B.  $0,50\mu\text{m}$ . C.  $,60\mu\text{m}$ . D.  $0,55\mu\text{m}$ .

**Câu 28:** Một nguồn sáng phát ra đồng thời 6 bức xạ có bước sóng lần lượt là 250 nm, 410 nm, 434 nm, 486 nm, 656 nm, 1875 nm. Dùng nguồn sáng này chiếu vào khe F của máy quang phổ lăng kính, số vạch màu quang phổ quan sát được trên tấm kính ảnh ( tấm kính mờ ) của buồng tối là

- A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

**Câu 29:** Trong chân không, tia tử ngoại có bước sóng trong khoảng

- A. từ vài milimét đến vài mét. B. từ 760 nm đến vài milimét.  
C. từ 380 nm đến 760 nm. D. từ vài nanomet đến 380 nm.

**Câu 30:** Với  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$  lần lượt là năng lượng của photon ứng với các bức xạ màu tử ngoại, bức xạ của đơn sắc lục và bức xạ hồng ngoại thì

- A.  $\varepsilon_1 > \varepsilon_2 > \varepsilon_3$ . B.  $\varepsilon_2 > \varepsilon_1 > \varepsilon_3$ . C.  $\varepsilon_2 > \varepsilon_3 > \varepsilon_1$ . D.  $\varepsilon_3 > \varepsilon_1 > \varepsilon_2$ .

**Câu 31:** Công thoát của Wolfram và natri lần lượt là 4,4 eV và 2,3 eV. Nếu giới hạn quang điện của natri là 546 nm thì giới hạn quang điện của Wolfram bằng

- A. 11236 nm. B. 800 nm. C. 285 nm. D. 600 nm.

**Câu 32:** Ánh sáng lân quang

- A. được phát ra bởi chất rắn, chất lỏng, lẫn chất khí.  
B. có thể tồn tại rất lâu sau khi tắt ánh sáng kích thích.  
C. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.  
D. có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng kích thích.

**Câu 33:** Tia LASER không có đặc điểm

- A. Độ đơn sắc cao. B. Độ định hướng cao. C. Công suất lớn. D. Cường độ lớn.

**Câu 34:** Khi chiếu ánh sáng vào một tấm kim loại cô lập, giả sử một electron hấp thụ photon sử dụng một phần năng lượng làm công thoát, phần còn lại biến thành động năng K của nó. Lần lượt chiếu các bức xạ có bước sóng trong chân không là  $\lambda_1$  và  $\lambda_2$  vào một tấm kim loại cô lập thì động năng ban đầu cực đại của các quang electron bị bứt ra khỏi tấm kim loại trên là  $K_1$  và  $K_2$ . Công thoát electron được xác định bởi

- A.  $\frac{\lambda_1 \lambda_2 K_1}{(\lambda_1 - \lambda_2) K_2}$ . B.  $\frac{K_1 K_2}{\lambda_2 - \lambda_1}$ . C.  $\frac{(K_1 - K_2) \lambda_1 \lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1}$ . D.  $\frac{K_1 \lambda_1 - K_2 \lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1}$ .

**Câu 35:** Một lăng kính có góc chiết quang  $A = 5^\circ$  ( coi là góc nhỏ ) được đặt trong không khí. Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc với phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác góc chiết quang 2 m. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là  $n_d = 1,50$  và đối với ánh sáng tím là  $n_t = 1,54$ . Độ rộng của quang phổ từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là

- A. 8,7 mm. B. 8,0 mm. C. 7,0 mm. D. 7,7 mm.

**Câu 36:** Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. Hai khe sáng được chiếu đồng thời 3 bức xạ có bước sóng lần lượt là  $0,5\mu\text{m}$ ;  $0,6\mu\text{m}$  và  $0,75\mu\text{m}$ . Vị trí 3 vân sáng của ba bức xạ trên trùng nhau gần vân sáng trung tâm nhất, cách vân sáng trung tâm một khoảng

- A. 2,66 mm. B. 6,0 mm. C. 5,0 mm. D. 4,0 mm.

**Câu 37:** Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 2 mm và cách màn quan sát 2 m. Hiện tượng giao thoa xảy ra với ánh sáng trắng có bước sóng từ 400 nm đến 750 nm. Tại vị trí M cách vân trung tâm 3,3 mm số bức xạ bị tắt là

- A. 4. B. 3. C. 5. D. 6.

**Câu 38:** Một ống Cu-lit-giơ ( Coolidge ) hoạt động dưới hiệu điện thế 10 kV. Bước sóng ngắn nhất mà ống Cu-lit-giơ trên phát ra gần bằng

- A. 124,2 pm. B. 1242 nm. C. 62,1 pm. D. 62,1 nm.

**Câu 39:** Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang  $A = 4^\circ$ , đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là 1,643. Chiếu một chùm tia sáng song song hẹp bức xạ đỏ nói trên vuông góc với bên của lăng kính này. Góc tạo lệch của tia này khi qua lăng kính là

- A.  $4,572^\circ$ . B.  $2,572^\circ$ . C.  $6,572^\circ$ . D.  $5,572^\circ$ .

**Câu 40:** Xét nguyên tử hidro theo mẫu nguyên tử Bo, trong các quỹ đạo dừng của electron có hai quỹ đạo có bán kính  $r_m$  và  $r_n$ . Biết  $r_m - r_n = 20r_0$ . Trong đó  $r_0$  là bán kính Bo. Giá trị  $r_m$  gần nhất với giá trị nào sau đây ?

- A.  $50r_0$ . B.  $30r_0$ . C.  $28r_0$ . D.  $40r_0$ .

----- HẾT -----