



LES CENTRES D'IMAGERIE MEDIKA

IRM-SCANNER - CONE BEAM - RADIOGRAPHIES - ECHOGRAPHIES – INFILTRATIONS - MAMMOGRAPHIES -
BIOPSIES SOUS STÉRÉOTAXIE - DENSITOMÉTRIE OSSEUSE - RADIOLOGIE VASCULAIRE ET INTERVENTIONNELLE

www.medika.fr

Ermont, le / /

Patient :

Date de Naissance :

ORDONNANCES

(Les 2 prescriptions ci-dessous peuvent être cumulables en fonction de votre situation)

➤ DANS TOUS LES CAS

- ✓ **HYDROCORTANCYL** 2.5% de 5ml (laboratoire SANOFI)
- ✓ **IOPAMIRON** 200 : 10 ml (laboratoire BRACCO)
- ✓ Une paire de GANTS STERILES n° 7.5 (type OR Standard du laboratoire Medline)
- ✓ 4 compresses Stériles
- ✓ 1 Dosette de Bétadine dermique (jaune)
- ✓ 2 seringues stériles 5 cc (laboratoire Braun)
- ✓ 1 aiguille 18G 1/2 x40 mm (rose type BD Microlane réf : 304622)
- ✓ 1 aiguille PL noire 0.70 mm x 88 mm 22g X 3 1/2 (Spinocan de Braun réf :4507908)

➤ SI VOUS ETES ALLERGIQUE

- **Si terrain atopique** : prémédication 2 jours avant et le matin de l'examen - principe de précaution -
 - ✓ 1 comprimé d'Aerius
- **si antécédent allergique grave** (choc anaphylactique, œdème de Quincke), il est préférable **d'éviter** cette injection sauf si votre médecin la juge indispensable (l'examen sera alors programmé dans un établissement d'hospitalisation, à la Clinique Claude Bernard).

Acte gratuit

Dr Bernard MEDIONI

06 - Radiodiagnostic et Imagerie Médicale
MEDIKA Radiologie - 9 avenue Louis Armand - 95120 Ermont
Numéro ADELI : 95 1 700 608 - Numéro RPPS : 10003748612

• REMARQUES IMPORTANTES

- ✓ Lire attentivement la fiche d'information qui vous a été remise et respectez les contres indications
 - ✓ **Une intervention chirurgicale sur le rachis constitue une contreindication à cet examen.**
 - ✓ Veuillez apporter le jour de l'examen votre ordonnance et vos anciens examens d'imagerie.
 - ✓ Prévoir un repos allongé sur le dos jusqu'au lendemain matin.
 - ✓ Venir si possible accompagné.
 - ✓ **SI VOUS PRENEZ UN TRAITEMENT ANTICOAGULANT (Dans tous les cas, l'avis de votre médecin traitant ou cardiologue est impératif)**
-
- Chez les patients sous **antiagrégant plaquettaire** (Plavix® ou Ticlid®), il est préconisé d'arrêter le traitement 8 jours avant le geste et en cas d'association Plavix-Aspirine, l'avis du cardiologue est indispensable pour savoir si l'état cardiaque du patient autorise l'arrêt du traitement pendant 8 jours. Reprise du traitement le lendemain du geste.
 - Pour les **anti-vitamines K** (Sintron®, Préviscan® etc.), leur arrêt est nécessaire 24 heures avant le geste de prélèvement avec relai par Héparine puis reprise 6 heures après le geste.
Il convient donc de se rapprocher de votre médecin traitant ou de votre cardiologue pour adapter le traitement.
 - En cas de traitement par **Héparine**, à dose préventive, elle doit être arrêtée 12 heures avant le geste.
Rapprochez-vous de votre médecin traitant ou cardiologue afin d'adapter le traitement.
Reprise du traitement le lendemain du geste.
 - Pour les nouveaux anticoagulants par voie orale (**Pradaxa, Xarelto, Eliquis**), une fenêtre thérapeutique (arrêt du traitement) peut être nécessaire selon le geste radiologique à pratiquer : rapprochez-vous là encore de votre médecin traitant ou cardiologue afin d'adapter le traitement.