\$

LES CENTRES D'IMAGERIE MEDIKA

IRM-SCANNER - CONE BEAM - RADIOGRAPHIES - ECHOGRAPHIES - INFILTRATIONS - MAMMOGRAPHIES - BIOPSIES SOUS STÉRÉOTAXIE - DENSITOMÉTRIE OSSEUSE - RADIOLOGIE VASCULAIRE ET INTERVENTIONNELLE www.medika.fr

Ermont, le	/	/

Patient:

Date de Naissance :

ORDONNANCE INFILTRATION SQUELETTE PERIPHERIQUE

(Les 2 prescriptions ci-dessous peuvent être cumulables en fonction de votre situation)

DANS TOUS LES CAS

✓ HYDROCORTANCYL 2.5% de 5ml (laboratoire SANOFI)

Ou 1 seringue pré-remplie de DIPROSTENE 7 mg/ml suspension injectable

✓ **IOPAMIRON** 300 : 10 ml (laboratoire BRACCO)

Ou IOMERON 300: 20 ml

- ✓ XYLOCAINE 1 % 1 flacon de 20 ml (laboratoire ASPEN)
- ✓ Une paire de GANTS STERILES n° 7.5 (type OR Standard du laboratoire Medline)
- √ 4 compresses Stériles
- √ 1 Dosette de Bétadine dermique (jaune)
- ✓ 2 seringues stériles 5 cc (laboratoire Braun)
- ✓ 1 aiguille 18G 1/2 x40 mm (rose type BD Microlane réf : 304622)
- √ 1 aiguille 21 G 2 0.8X 50 mm (verte type BD Microlance réf : 301155)

Aucun autre produit ne peut être substitué

> SI VOUS ETES ALLERGIQUE

- > Si terrain atopique : prémédication 2 jours avant et le matin de l'examen principe de précaution -
 - ✓ 1 comprimé d'Aerius
- > si antécédent allergique grave (choc anaphylactique, œdème de Quincke), il est préférable d'éviter cette injection sauf si votre médecin la juge indispensable (l'examen sera alors programmé dans un établissement d'hospitalisation, à la Clinique Claude Bernard).

Acte gratuit

Dr Bernard MEDIONI

06 - Radiodiagnostic et Imagerie Médicale MEDIKA Radiologie - 9 avenue Louis Armand - 95120 Ermont Numéro ADELI : 95 1 700 608 - Numéro RPPS : 10003748612