

Mua xăng

Điểm: 600 (p)

Thời gian: 0.5s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Bạn muốn mua N lít xăng, không thừa không thiếu. Tại một tiệm xăng nọ có hai phương thức mua xăng:

- 1L: Mua 1 lít với giá a đồng
- 2L: Mua 2 lít với giá b đồng

Cho ba số N, a, b . Hãy tính chi phí ít nhất cần để mua đúng **chính xác** N lít xăng.

Input

- Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10^9$)
- Dòng thứ hai chứa hai số nguyên dương lần lượt là a và b ($1 \leq a, b \leq 10^9$)

Output

In ra một số nguyên, là số tiền tối thiểu cần để mua đúng chính xác N lít xăng tại tiệm xăng đó.

Example

Test 1**Input**

5

1 1

Output

3

Note

- Để mua 5 lít xăng, bạn có thể chọn phương án mua: **2L, 2L, 1L** có tổng tiền sẽ là **3**, là kết quả tối ưu.

Test 2**Input**

7

1 7

Output

7

Note

- Tại trường hợp này, bạn có thể mua 7 lần 1L có tổng là 7 tiền. Nếu dù chỉ mua một lần 2L kia đủ để khiến đáp án là 7, nên ta không xét đến nó.