

Bài 2. Cân bằng (HSG 9 Hà Nội 2025-2026)

Điểm: 900 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho dãy số nguyên A gồm N phần tử phân biệt $A_1, A_2, \dots, A_N$ và số nguyên dương K . Phần tử A_i được gọi là "cân bằng K " nếu trong dãy xuất hiện phần tử có giá trị bằng $A_i + K$ và $A_i - K$. Ví dụ dãy số 5, 2, 4, 6 và $K = 1$ thì có 1 phần tử cân bằng là 5 vì dãy số có phần tử là $5 - 1 = 4$ và $5 + 1 = 6$.

Yêu cầu: Đếm số lượng phần tử "cân bằng K " của dãy số A .

Input

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N và K ($N \leq 10^5$; $K \leq 10^9$)
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($|A_i| \leq 10^9, 1 \leq i \leq N$)

Output

- In ra một số nguyên là kết quả của bài toán.

Example

Test 1

Input

```
6 1
4 1 7 8 5 6
```

Output

```
3
```

Note

Có 3 phần tử 5, 6 và 7 là "cân bằng K ".

Test 2**Input**

```
6 2
4 -1 7 8 5 6
```

Output

```
1
```

Note

Có 1 phần tử 6 là "cân bằng K ".

Scoring

- 70% số test ứng với 70% số điểm có $K = 1$; $N \leq 10^3$ và $0 \leq A_i \leq 10^3$
- 20% số test tiếp theo ứng với 20% số điểm có $K = 1$; $0 \leq A_i \leq 10^6$
- 10% số test còn lại ứng với 10% số điểm không có ràng buộc gì thêm