



SOLPET ANIMAL HOSPITAL

MEDICAL REPORT

Tên bệnh nhân: Chapo

Loài: Mèo nhà (Felis catus)

Giới tính: Đực (đã thiến)

Tuổi: 7 năm

Cân nặng: 6,5 kg

Ngày khám: 13-10-2025

Bác sĩ phụ trách: BS ĐẠT

1 Chẩn đoán sơ bộ

- Bệnh lý: Viêm khớp háng mạn tính (Feline Hip Osteoarthritis – Chronic form)
- Dạng: Thoái hóa – đau khớp mạn tính (degenerative osteoarthritis)
- Nguyên nhân có thể: Thoái hóa tự nhiên theo tuổi + trọng lượng cơ thể cao (6,5kg) gây áp lực khớp háng.
- Mức độ: Trung bình – chưa có dấu hiệu liệt hoặc mất khả năng vận động hoàn toàn.

2 Triệu chứng lâm sàng ghi nhận

- Dáng đi lắc hông, bước ngắn.
- Giảm nhảy lên cao, ngại vận động.

- Đau vùng hông khi sò, hạn chế duỗi khớp háng.
- Teo nhẹ cơ vùng đùi – mông hai bên.
- Hành vi thay đổi: nằm nhiều, giảm vệ sinh vùng lưng – đuôi.

3 Kết quả cận lâm sàng (gửi file qua zalo)

- X-quang khớp háng: khe khớp hẹp, xuất hiện gai xương nhỏ vùng ổ cối – chỏm đùi, phù hợp hình ảnh thoái hóa khớp mạn.
- Không thấy dấu hiệu nhiễm khuẩn hoặc trật khớp cấp.
 - Xét nghiệm máu: tăng nhẹ TBA (tổng số acid muối mật) và TC (cholesteron), Ttt4 (Hormone tuyến giáp) bình thường.

4 Phác đồ điều trị

- Meloxicam 0,05 mg/kg PO q24h x 15 ngày (Giảm đau – kháng viêm, dùng sau ăn)
- Gabapentin 10 mg/kg PO q12h = 65 mg/lần/ ngày x 1 tháng (Kiểm soát đau thần kinh mạn tính)
- Arthrovet (bổ khớp) ½ viên/ngày 1 tháng (Bổ sung glucosamine, chondroitin, vitamin E, hyaluronic acid).

5 Hướng dẫn chăm sóc tại nhà

- Duy trì trọng lượng lý tưởng (giảm 0,5–1 kg trong 2–3 tháng).
- Hạn chế nhảy cao, vận động quá sức.
- Chuẩn bị nệm mềm, nơi nghỉ ấm áp, dễ di chuyển.
- Tăng vận động nhẹ (đi lại trong nhà, chơi nhẹ 10–15 phút/ngày).
- Theo dõi: dáng đi, khả năng nhảy, mức độ đau.

6 Lịch tái khám

- Tái khám sau 1 tháng: Đánh giá đáp ứng điều trị.

- Nếu đỡ đau và vận động tốt hơn: tiếp tục duy trì bằng thuốc bổ khớp & giảm đau nhẹ định kỳ.

7 Tiên lượng

- Ngắn hạn (1–2 tháng): khả quan, có thể giảm đau rõ rệt nếu tuân thủ điều trị.
- Dài hạn: kiểm soát ổn định bằng dinh dưỡng, giảm cân và thuốc hỗ trợ; tiên lượng tốt sau phẫu thuật FHO nếu cần.

⚠ Lưu ý:

- Theo dõi dấu hiệu nôn, tiêu chảy, biếng ăn (tác dụng phụ NSAIDs).
- Không phối hợp thêm thuốc NSAIDs khác trong thời gian dùng Meloxicam.
- Có thể duy trì Arthrovet lâu dài (3–6 tháng/lần đợt).
- Nếu khớp thoái hóa tiến triển nặng hoặc không cải thiện sau 3 tháng: chỉ định phẫu thuật FHO (Femoral Head and Neck Osteotomy) để loại bỏ nguồn đau và phục hồi vận động.

Hotline & Zalo: 0869086558

Date: 13/10/2025

SOLPET
Animal Hospital

Veterinarian's signature

Bác sĩ thú y

Nguyễn Tiến Đạt