



BỆNH VIỆN THÚ Y VPET'S

BÁO CÁO KẾT QUẢ SINH HÓA



Tên thú cưng: boi
Loài: mèo
Mã số mẫu:

Tên chủ sở hữu:
Loại thú cưng: Đực
Loại mẫu:

Mã ID thú cưng:
Tuổi thú cưng: 0 Tuổi 0 Tháng
Thời gian xét nghiệm: 2026/06/02 18:27:24

Tên chỉ tiêu	Họ tên	Kết quả	Khoảng tham chiếu	Thấp	trung bình	Cao
ALB	Albumin	23g/L	22-40			
TP	Total protein	49g/L	53-86			
GLOB	Globulin	26g/L	23-52			
A/G	A/G	0.88				
TBA	Total bile acid	44umol/L	0-25			
ALP	Alkaline phosphatase	11U/L	5-107			
GGT	γ -Glutamyl-transferase	11U/L	0-10			
ALT	Alanine aminotransferase	267U/L	16-130			
AST	Aspartate aminotransferase	≥ 1100 U/L	10-60			
AST/ALT	AST/ALT	4.8				
TBIL	Total bilirubin	32umol/L	0-15			
PHOS	Phosphorus	4.29mmol/L	1-2.42			
UA	Uric acid	≤ 5 umol/L	0-60			
BUN	Blood urea nitrogen	34.3mmol/L	5.2-12.7			
CRE	Creatinine	602umol/L	71-212			
BUN/CRE	BUN/CRE	14.1				
AMY	Amylase	762U/L	500-1500			
CK	Creatine kinase	≥ 1100 U/L	0-353			
LDH	Lactate dehydrogenase	≥ 1100 U/L	0-659			
Ca	Calcium	1.89mmol/L	2.35-3.23			
C-Ca	Corrected Calcium	2.24mmol/L				
Ca*P	Ca*P	101mg ² /dL ²				
GLU	Glucose	9.1mmol/L	4.5-8.6			
TC	Total cholesterol	1.6mmol/L	1.55-5.4			
TG	Triglycerides	2.62mmol/L	0-1.35			
LPS	Lipase	31U/L	0-30			

Ý nghĩa lâm sàng

Total protein(TP)	Thấp	1. Viêm mãn tính và bông nặng 2. Suy dinh dưỡng và tăng tiêu thụ đạm 3. Hội chứng thận hư 4. Chó con mới sinh 5. Bệnh ruột mất protein
Total bile acid(TBA)	Cao	1. Tổn thương tế bào gan: viêm gan cấp tính, viêm gan mãn tính hoạt động 2. Tắc mật 3. Tổng axit mật (TBA) cao cũng có thể xảy ra trong thai kỳ
γ -Glutamyl-transferase(GGT)	Cao	1. Bệnh lý về gan 2. Tắc ống mật 3. Vàng da 4. Viêm tụy cấp
Alanine aminotransferase(ALT)	Cao	1. Các bệnh nguyên phát về tế bào gan và hệ thống gan mật (viêm gan siêu vi, viêm phúc mạc truyền nhiễm ở mèo, bệnh leptospirosis, bệnh nhiễm độc gan, viêm gan, bệnh tắc nghẽn, v.v.) 2. Rối loạn chuyển hóa và bệnh gan thứ phát 3. ảnh hưởng của thuốc
Aspartate aminotransferase(AST)	Cao	1. Bệnh hệ gan mật 2. Bệnh cơ xương khớp (chấn thương cơ bắp, tổn thương cơ) 3. Viêm cơ tim 4. Nhồi máu cơ tim 5. Tán huyết 6. Hấp thụ độc tố, viêm nhiễm, bệnh đường ruột và các rối loạn chuyển hóa khác
AST/ALT(AST/ALT)	Cao	AST và ALT đều tăng cao và tỷ lệ AST/ALT cao hơn bình thường, điều này thường cho thấy tổn thương gan nghiêm trọng
AST/ALT(AST/ALT)	Thấp	AST và ALT đều tăng và tỷ lệ AST/ALT nhỏ hơn tỷ lệ bình thường, thường chỉ ra mức độ tổn thương gan nhẹ
Total bilirubin(TBIL)	Cao	1, tăng do các nguyên nhân trước gan hoặc tán huyết (bệnh Eperythrozoon ở chó, bệnh babesiosis ở chó và mèo, ngộ độc hành và các bệnh tan máu khác) 2. tăng do các nguyên nhân ở tế bào gan (viêm gan truyền nhiễm ở chó, bệnh Leptospirosis, viêm gan do vi khuẩn, xơ gan, v.v.) 3. Tăng do các nguyên nhân sau gan hoặc tắc nghẽn (bệnh tắc mật, sỏi ống mật, v.v.)
Phosphorus(PHOS)	Cao	1. Chó con và mèo con đang lớn 2. Bệnh thận 3. Thời kỳ lành vết thương gãy xương 4. Hấp thụ quá nhiều Vitamin D 5. Suy tuyến cận giáp
Blood urea nitrogen(BUN)	Cao	1. Có khối u thận 2. Viêm cầu thận 3. Bệnh gây phân hủy protein quá mức 4. Tăng ure máu sau thận 5. Khẩu phần ăn giàu đạm
Creatinine(CRE)	Cao	1. Bệnh lý trước thận (tuổi máu thận không đủ, mất nước, tổn thương cơ nhiều, v.v.) 2. Bệnh thận (bệnh thận nặng) 3. Tắc nghẽn niệu đạo sau thận
BUN/CRE(BUN/CRE)	Cao	1. Sốt, dùng steroid, tetracycline và các loại thuốc khác 2. Chế độ ăn nhiều đạm (đặc biệt khi suy thận), xuất huyết tiêu hóa 3. Mất nước, suy tim, giảm protein máu, giảm thể tích máu, hội chứng gan thận 4. đường tiết niệu tắc nghẽn, thông nối niệu quản; tăng tính thấm bẩm sinh của ure trong ống thận
BUN/CRE(BUN/CRE)	Thấp	1. Đói, chế độ ăn ít protein 2. Suy gan nặng 3. Dùng thuốc lợi tiểu, v.v.
Creatine kinase(CK)	Cao	1. Loạn dưỡng cơ, teo cơ 2. Nhồi máu cơ tim



BỆNH VIỆN THÚ Y VPET'S

BÁO CÁO KẾT QUẢ SINH HÓA



Tên thú cưng: boi
Loài: mèo
Mã số mẫu:

Tên chủ sở hữu:
Loại thú cưng: Đực
Loại mẫu:

Mã ID thú cưng:
Tuổi thú cưng: 0 Tuổi 0 Tháng
Thời gian xét nghiệm: 2026/06/02 18:27:24

Lactate dehydrogenase(LDH)	Cao	1. Động vật chưa trưởng thành 2. Hoại tử mô (Tim, gan, cơ xương) 3. Khối u ác tính (đặc biệt là lymphosarcoma) bệnh bạch cầu, nhiễm toxoplasma, tán huyết (nhân tạo)
Calcium (Ca)	Thấp	1. Hạ canxi máu (Mang thai và cho con bú) 2. Kém hấp thu ở đường ruột 3. Còi xương 4. Ung thư tuyến giáp (tăng Calcitonin)
Ca*P(Ca*P)	Cao	Giá trị Ca*P có thể phản ánh tình trạng chuyển hóa xương. Khi giá trị Ca*P tăng lên, điều đó cho thấy quá trình chuyển hóa xương bất thường, có thể liên quan đến các bệnh về xương chuyển hóa như loãng xương và nhuyễn xương. Ngoài ra, giá trị Ca*P cao có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các biến cố tim mạch, bao gồm xơ vữa động mạch và nhồi máu cơ tim. Do đó, việc theo dõi giá trị Ca*P có thể giúp dự đoán nguy cơ mắc các biến cố tim mạch.
Glucose(GLU)	Thấp	Không có ý nghĩa lâm sàng quan trọng
Triglycerides(TG)	Cao	1. Thiếu hụt Insulin 2. Căng thẳng 3. Rối loạn nội tiết 4. Điều trị bằng thuốc (corticoid, morphine, hormone vỏ thượng thận, v.v.)"
Lipase(LPS)	Cao	Triglyceride tăng cao có ý nghĩa quan trọng đối với sự xuất hiện của bệnh tim mạch vành. Căng thẳng nhiều chất béo nguyên phát, phản ứng căng thẳng, xơ vữa động mạch, vàng da tắc mật, tiểu đường, thiếu máu trầm trọng, hội chứng thận hư, viêm tụy, suy giảm chức năng tuyến tụy, đói lâu ngày và tăng cao sau chế độ ăn nhiều chất béo.
		1. Thường gặp trong viêm tụy cấp và viêm tụy mạn, ung thư tụy và tắc ống tụy do sỏi 2. Suy thận, viêm phúc mạc thủng 3. Tắc ruột, loét hành tá tràng, v.v."

Người vận hành:

Người gửi mẫu:

Chẩn đoán:

Lưu ý: Do sự phức tạp và tính cá nhân riêng biệt của việc chẩn đoán bệnh trong các trường hợp cụ thể, việc giải thích kết quả xét nghiệm này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở một chiều cho chẩn đoán bệnh cụ thể.

Kết quả chỉ có ý nghĩa với mẫu bệnh phẩm này!