



BỆNH VIỆN THÚ Y VPET'S

BÁO CÁO KẾT QUẢ SINH HÓA



Tên thú cưng: TOM
Loài: chó
Mã số mẫu:

Tên chủ sở hữu:
Loại thú cưng: Đực
Loại mẫu:

Mã ID thú cưng:
Tuổi thú cưng: 0 Tuổi 0 Tháng
Thời gian xét nghiệm: 2026/07/14 11:28:58

Tên chỉ tiêu	Họ tên	Kết quả	Khoảng tham chiếu	Thấp	trung bình	Cao
ALB	Albumin	33g/L	22-40			
TP	Total protein	84g/L	48-78			
GLOB	Globulin	51g/L	20-43			
A/G	A/G	0.65				
TBA	Total bile acid	6umol/L	0-25			
ALP	Alkaline phosphatase	161U/L	9-219			
GGT	γ -Glutamyl-L-transferase	10U/L	0-11			
ALT	Alanine aminotransferase	163U/L	15-111			
AST	Aspartate aminotransferase	100U/L	10-60			
AST/ALT	AST/ALT	0.6				
TBIL	Total bilirubin	4umol/L	0-15			
PHOS	Phosphorus	2.59mmol/L	0.81-2.2			
UA	Uric acid	23umol/L	0-60			
BUN	Blood urea nitrogen	23.6mmol/L	1.9-9.3			
CRE	Creatinine	221umol/L	37-159			
BUN/CRE	BUN/CRE	26.4				
AMY	Amylase	687U/L	500-1500			
CK	Creatine kinase	605U/L	10-200			
LDH	Lactate dehydrogenase	450U/L	20-495			
Ca	Calcium	1.88mmol/L	2.38-3.4			
C-Ca	Corrected Calcium	2.04mmol/L				
Ca*P	Ca*P	61mg ² /dL ²				
GLU	Glucose	9.3mmol/L	4.5-7.8			
TC	Total cholesterol	5.6mmol/L	2.8-7.5			
TG	Triglycerides	1.78mmol/L	0-1.65			
LPS	Lipase	43U/L	0-270			

Ý nghĩa lâm sàng

Total protein(TP)	Cao	1.Mất nước 2.Tăng Immunoglobulin trong máu
Globulin(GLOB)	Cao	Mức độ GLOB cao có thể do các vấn đề viêm mãn tính, chẳng hạn như nhiễm giun tim, nhiễm virus, ký sinh trùng hoặc vi khuẩn
A/G(A/G)	Cao	Không có ý nghĩa lâm sàng quan trọng
	Thấp	1. Chức năng gan bất thường 2. Bệnh amyloidosis (có sự xâm nhập của các protein bất thường trong các lớp của đường tiêu hóa hoặc nhu mô gan) 3. Viêm và nhiễm trùng dạ dày ruột, suy gan do miễn dịch, kém hấp thu 4. Gợi ý viêm phúc mạc nhiễm trùng ở mèo'
Alanine aminotransferase(ALT)	Cao	1. Các bệnh nguyên phát về tế bào gan và hệ thống gan mật (viêm gan siêu vi, viêm phúc mạc truyền nhiễm ở mèo, bệnh leptospirosis, bệnh nhiễm độc gan, viêm gan, bệnh tắc nghẽn, v.v.) 2. Rối loạn chuyển hóa và bệnh gan thứ phát 3. ảnh hưởng của thuốc
Aspartate aminotransferase(AST)	Cao	1. Bệnh hệ gan mật 2. Bệnh cơ xương khớp (chấn thương cơ bắp, tổn thương cơ) 3. Viêm cơ tim 4. Nhồi máu cơ tim 5. Tán huyết 6. Hấp thụ độc tố, viêm nhiễm, bệnh đường ruột và các rối loạn chuyển hóa khác
AST/ALT(AST/ALT)	Cao	AST và ALT đều tăng cao và tỷ lệ AST/ALT cao hơn bình thường, điều này thường cho thấy tổn thương gan nghiêm trọng
	Thấp	AST và ALT đều tăng và tỷ lệ AST/ALT nhỏ hơn tỷ lệ bình thường, thường chỉ ra mức độ tổn thương gan nhẹ
Phosphorus(PHOS)	Cao	1. Chó con và mèo con đang lớn 2. Bệnh thận 3. Thời kỳ lành vết thương gãy xương 4. Hấp thụ quá nhiều Vitamin D 5. Suy tuyến cận giáp
Blood urea nitrogen(BUN)	Cao	1. Có khối u thận 2. Viêm cầu thận 3. Bệnh gây phân hủy protein quá mức 4. Tăng ure máu sau thận 5. Khẩu phần ăn giàu đạm
Creatinine(CRE)	Cao	1. Bệnh lý trước thận (tưới máu thận không đủ, mất nước, tổn thương cơ nhiều, v.v.) 2. Bệnh thận (bệnh thận nặng) 3. Tắc nghẽn niệu đạo sau thận
BUN/CRE(BUN/CRE)	Cao	1. Sốt, dùng steroid, tetracycline và các loại thuốc khác 2. Chế độ ăn nhiều đạm (đặc biệt khi suy thận), xuất huyết tiêu hóa 3. Mất nước, suy tim, giảm protein máu, giảm thể tích máu, hội chứng gan thận 4. đường tiết niệu tắc nghẽn, thông nối niệu quản; tăng tính thấm bẩm sinh của ure trong ống thận
	Thấp	1. Đói, chế độ ăn ít protein 2. Suy gan nặng 3. Dùng thuốc lợi tiểu, v.v.
Creatine kinase(CK)	Cao	1. Loạn dưỡng cơ, teo cơ 2. Nhồi máu cơ tim
Calcium (Ca)	Thấp	1. Hạ canxi máu (Mang thai và cho con bú) 2. Kém hấp thu ở đường ruột 3. Còi xương 4. Ung thư tuyến giáp (tăng Calcitonin)
Ca*P(Ca*P)	Cao	Giá trị Ca*P có thể phản ánh tình trạng chuyển hóa xương. Khi giá trị Ca*P tăng lên, điều đó cho thấy quá trình chuyển hóa xương bất thường, có thể liên quan đến các bệnh về xương chuyển hóa như loãng xương và nhuyễn xương. Ngoài ra, giá trị Ca*P cao có liên



BỆNH VIỆN THÚ Y VPET'S

BÁO CÁO KẾT QUẢ SINH HÓA



Tên thú cưng: TOM
Loài: chó
Mã số mẫu:

Tên chủ sở hữu:
Loại thú cưng: Đực
Loại mẫu:

Mã ID thú cưng:
Tuổi thú cưng: 0 Tuổi 0 Tháng
Thời gian xét nghiệm: 2026/07/14 11:28:58

quan đến việc tăng nguy cơ mắc các biến cố tim mạch, bao gồm xơ vữa động mạch và nhồi máu cơ tim. Do đó, việc theo dõi giá trị Ca*P có thể giúp dự đoán nguy cơ mắc các biến cố tim mạch.	
Thấp	Không có ý nghĩa lâm sàng quan trọng
Glucose(GLU)	Cao
Triglycerides(TG)	Cao
1.Thiếu hụt Insulin 2. Căng thẳng 3. Rối loạn nội tiết 4. Điều trị bằng thuốc (corticoid, morphine, hormone vỏ thượng thận, v.v.)" Triglyceride tăng cao có ý nghĩa quan trọng đối với sự xuất hiện của bệnh tim mạch vành. Căng thẳng nhiều chất béo nguyên phát, phản ứng căng thẳng, xơ vữa động mạch, vàng da tắc mật, tiểu đường, thiếu máu trầm trọng, hội chứng thận hư, viêm tụy, suy giảm chức năng tuyến tụy, đói lâu ngày và tăng cao sau chế độ ăn nhiều chất béo.	

Người vận hành:

Người gửi mẫu:

Chẩn đoán:

Lưu ý: Do sự phức tạp và tính cá nhân riêng biệt của việc chẩn đoán bệnh trong các trường hợp cụ thể, việc giải thích kết quả xét nghiệm này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở một chiều cho chẩn đoán bệnh cụ thể.

Kết quả chỉ có ý nghĩa với mẫu bệnh phẩm này!