



BỆNH VIỆN THÚ Y VPET'S

BÁO CÁO KẾT QUẢ SINH HÓA



Tên thú cưng: AMI

Loài: chó

Mã số mẫu:

Tên chủ sở hữu:

Loại thú cưng: Đực

Loại mẫu:

Mã ID thú cưng:

Tuổi thú cưng: 0 Tuổi 0 Tháng

Thời gian xét nghiệm: 2026/07/06 16:21:07

Tên chỉ tiêu	Họ tên	Kết quả	Khoảng tham chiếu	Thấp	Trung bình	Cao
ALB	Albumin	30g/L	22-40			
TP	Total protein	79g/L	48-78			
GLOB	Globulin	49g/L	20-43			
A/G	A/G	0.61				
TBA	Total bile acid	61umol/L	0-25			
ALP	Alkaline phosphatase	10U/L	9-219			
GGT	γ -Glutamyl-L-transferase	≤ 2 U/L	0-11			
ALT	Alanine aminotransferase	53U/L	15-111			
AST	Aspartate aminotransferase	45U/L	10-60			
AST/ALT	AST/ALT	0.8				
TBIL	Total bilirubin	6umol/L	0-15			
PHOS	Phosphorus	0.88mmol/L	0.81-2.2			
UA	Uric acid	8umol/L	0-60			
BUN	Blood urea nitrogen	6mmol/L	1.9-9.3			
CRE	Creatinine	220umol/L	37-159			
BUN/CRE	BUN/CRE	6.8				
AMY	Amylase	452U/L	500-1500			
CK	Creatine kinase	113U/L	10-200			
LDH	Lactate dehydrogenase	204U/L	20-495			
Ca	Calcium	2.69mmol/L	2.38-3.4			
C-Ca	Corrected Calcium	2.9mmol/L				
Ca*P	Ca*P	30mg ² /dL ²				
GLU	Glucose	5.6mmol/L	4.5-7.8			
TC	Total cholesterol	3.9mmol/L	2.8-7.5			
TG	Triglycerides	1.35mmol/L	0-1.65			
LPS	Lipase	24U/L	0-270			

Ý nghĩa lâm sàng

Total protein(TP)	Cao	1. Mất nước 2. Tăng Immunoglobulin trong máu
Globulin(GLOB)	Cao	Mức độ GLOB cao có thể do các vấn đề viêm mãn tính, chẳng hạn như nhiễm giun tim, nhiễm virus, ký sinh trùng hoặc vi khuẩn
A/G(A/G)	Cao	Không có ý nghĩa lâm sàng quan trọng
	Thấp	1. Chức năng gan bất thường 2. Bệnh amyloidosis (có sự xâm nhập của các protein bất thường trong các lớp của đường tiêu hóa hoặc nhu mô gan) 3. Viêm và nhiễm trùng dạ dày ruột, suy gan do miễn dịch, kém hấp thu 4. Gợi ý viêm phúc mạc nhiễm trùng ở mèo
Total bile acid(TBA)	Cao	1. Tổn thương tế bào gan: viêm gan cấp tính, viêm gan mãn tính hoạt động 2. Tắc mật 3. Tổng axit mật (TBA) cao cũng có thể xảy ra trong thai kỳ
Creatinine(CRE)	Cao	1. Bệnh lý trước thận (tuổi máu thận không đủ, mất nước, tổn thương cơ nhiều, v.v.) 2. Bệnh thận (bệnh thận nặng) 3. Tắc nghẽn niệu đạo sau thận
BUN/CRE(BUN/CRE)	Cao	1. Sốt, dùng steroid, tetracycline và các loại thuốc khác 2. Chế độ ăn nhiều đạm (đặc biệt khi suy thận), xuất huyết tiêu hóa 3. Mất nước, suy tim, giảm protein máu, giảm thể tích máu, hội chứng gan thận 4. đường tiết niệu tắc nghẽn, thông nối niệu quản; tăng tính thấm bẩm sinh của ure trong ống thận
	Thấp	1. Đói, chế độ ăn ít protein 2. Suy gan nặng 3. Dùng thuốc lợi tiểu, v.v.
Amylase(AMY)	Thấp	Hoại tử tụy do tắc ống tụy đột ngột

Người vận hành:

Người gửi mẫu:

Chẩn đoán:

Lưu ý: Do sự phức tạp và tính cá nhân riêng biệt của việc chẩn đoán bệnh trong các trường hợp cụ thể, việc giải thích kết quả xét nghiệm này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở một chiều cho chẩn đoán bệnh cụ thể.

Kết quả chỉ có ý nghĩa với mẫu bệnh phẩm này!