



BỆNH VIỆN THÚ Y VPET'S

BÁO CÁO KẾT QUẢ SINH HÓA



Tên thú cưng/nikky
Loài:mèo
Mã số mẫu:

Tên chủ sở hữu:
Loại thú cưng:Đực
Loại mẫu:

Mã ID thú cưng:
Tuổi thú cưng: 0 Tuổi 0 Tháng
Thời gian xét nghiệm:2026/05/25 08:59:35

Tên chỉ tiêu	Họ tên	Kết quả	Khoảng tham chiếu	Thấp	trung bình	Cao
ALB	Albumin	26g/L	22-40			
TP	Total protein	82g/L	53-86			
GLOB	Globulin	56g/L	23-52			
A/G	A/G	0.46				
TBA	Total bile acid	≤1umol/L	0-25			
ALP	Alkaline phosphatase	4U/L	5-107			
GGT	γ-Glutamyl-L-transferase	≤2U/L	0-10			
ALT	Alanine aminotransferase	38U/L	16-130			
AST	Aspartate aminotransferase	24U/L	10-60			
AST/ALT	AST/ALT	0.6				
TBIL	Total bilirubin	5umol/L	0-15			
PHOS	Phosphorus	1.25mmol/L	1-2.42			
UA	Uric acid	6umol/L	0-60			
BUN	Blood urea nitrogen	6mmol/L	5.2-12.7			
CRE	Creatinine	66umol/L	71-212			
BUN/CRE	BUN/CRE	22.5				
AMY	Amylase	684U/L	500-1500			
CK	Creatine kinase	236U/L	0-353			
LDH	Lactate dehydrogenase	91U/L	0-659			
Ca	Calcium	2.5mmol/L	2.35-3.23			
C-Ca	Corrected Calcium	2.78mmol/L				
Ca*P	Ca*P	37mg ² /dL ²				
GLU	Glucose	5.1mmol/L	4.5-8.6			
TC	Total cholesterol	1.8mmol/L	1.55-5.4			
TG	Triglycerides	0.31mmol/L	0-1.35			
LPS	Lipase	≤7U/L	0-30			

Ý nghĩa lâm sàng

Globulin(GLOB)	Cao	Mức độ GLOB cao có thể do các vấn đề viêm mãn tính, chẳng hạn như nhiễm giun tim, nhiễm virus, ký sinh trùng hoặc vi khuẩn
A/G(A/G)	Cao	Không có ý nghĩa lâm sàng quan trọng
	Thấp	1. Chức năng gan bất thường 2. Bệnh amyloidosis (có sự xâm nhập của các protein bất thường trong các lớp của đường tiêu hóa hoặc nhu mô gan) 3. Viêm và nhiễm trùng dạ dày ruột, suy gan do miễn dịch, kém hấp thu 4. Gợi ý viêm phúc mạc nhiễm trùng ở mèo'
Alkaline phosphatase(ALP)	Thấp	1. Suy giáp 2. Thiếu kẽm
Creatinine(CRE)	Thấp	1. Bị đói. 2. Biếng ăn 3. Nôn mửa
BUN/CRE(BUN/CRE)	Cao	1. Sốt, dùng steroid, tetracycline và các loại thuốc khác 2. Chế độ ăn nhiều đạm (đặc biệt khi suy thận), xuất huyết tiêu hóa 3. Mất nước, suy tim, giảm protein máu, giảm thể tích máu, hội chứng gan thận 4. đường tiết niệu tắc nghẽn, thông nối niệu quản; tăng tính thấm bẩm sinh của ure trong ống thận
	Thấp	1. Đói, chế độ ăn ít protein 2. Suy gan nặng 3. Dùng thuốc lợi tiểu, v.v.

Người vận hành:
Chẩn đoán:

Người gửi mẫu:

Lưu ý: Do sự phức tạp và tính cá nhân riêng biệt của việc chẩn đoán bệnh trong các trường hợp cụ thể, việc giải thích kết quả xét nghiệm này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở một chiều cho chẩn đoán bệnh cụ thể.

Kết quả chỉ có ý nghĩa với mẫu bệnh phẩm này!