



BỆNH VIỆN THÚ Y VPET'S

BÁO CÁO KẾT QUẢ SINH HÓA



Tên thú cưng: AN
Loài: mèo
Mã số mẫu:

Tên chủ sở hữu:
Loại thú cưng: Đực
Loại mẫu:

Mã ID thú cưng:
Tuổi thú cưng: 0 Tuổi 0 Tháng
Thời gian xét nghiệm: 2026/06/27 17:20:28

Tên chỉ tiêu	Họ tên	Kết quả	Khoảng tham chiếu	Thấp	Trung bình	Cao
ALB	Albumin	30g/L	22-40			
TP	Total protein	94g/L	53-86			
GLOB	Globulin	64g/L	23-52			
A/G	A/G	0.47				
TBA	Total bile acid	8umol/L	0-25			
ALP	Alkaline phosphatase	8U/L	5-107			
GGT	γ -Glutamyl-L-transferase	≤ 2 U/L	0-10			
ALT	Alanine aminotransferase	26U/L	16-130			
AST	Aspartate aminotransferase	21U/L	10-60			
AST/ALT	AST/ALT	0.8				
TBIL	Total bilirubin	3umol/L	0-15			
PHOS	Phosphorus	3.69mmol/L	1-2.42			
UA	Uric acid	7umol/L	0-60			
BUN	Blood urea nitrogen	≥ 35.7 mmol/L	5.2-12.7			
CRE	Creatinine	1065umol/L	71-212			
BUN/CRE	BUN/CRE	15				
AMY	Amylase	1276U/L	500-1500			
CK	Creatine kinase	83U/L	0-353			
LDH	Lactate dehydrogenase	73U/L	0-659			
Ca	Calcium	2.98mmol/L	2.35-3.23			
C-Ca	Corrected Calcium	3.2mmol/L				
Ca*P	Ca*P	138mg ² /dL ²				
GLU	Glucose	6.5mmol/L	4.5-8.6			
TC	Total cholesterol	2.7mmol/L	1.55-5.4			
TG	Triglycerides	0.44mmol/L	0-1.35			
LPS	Lipase	8U/L	0-30			

Ý nghĩa lâm sàng

Total protein (TP)	Cao	1. Mất nước 2. Tăng Immunoglobulin trong máu
Globulin (GLOB)	Cao	Mức độ GLOB cao có thể do các vấn đề viêm mãn tính, chẳng hạn như nhiễm giun tim, nhiễm virus, ký sinh trùng hoặc vi khuẩn
A/G (A/G)	Cao	Không có ý nghĩa lâm sàng quan trọng
	Thấp	1. Chức năng gan bất thường 2. Bệnh amyloidosis (có sự xâm nhập của các protein bất thường trong các lớp của đường tiêu hóa hoặc nhu mô gan) 3. Viêm và nhiễm trùng dạ dày ruột, suy gan do miễn dịch, kém hấp thu 4. Gợi ý viêm phúc mạc nhiễm trùng ở mèo
Phosphorus (PHOS)	Cao	1. Chó con và mèo con đang lớn 2. Bệnh thận 3. Thời kỳ lành vết thương gãy xương 4. Hấp thụ quá nhiều Vitamin D 5. Suy tuyến cận giáp
Blood urea nitrogen (BUN)	Cao	1. Có khối u thận 2. Viêm cầu thận 3. Bệnh gây phân hủy protein quá mức 4. Tăng ure máu sau thận 5. Khẩu phần ăn giàu đạm
Creatinine (CRE)	Cao	1. Bệnh lý trước thận (tưới máu thận không đủ, mất nước, tổn thương cơ nhiều, v.v.) 2. Bệnh thận (bệnh thận nặng) 3. Tắc nghẽn niệu đạo sau thận
BUN/CRE (BUN/CRE)	Cao	1. Sốt, dùng steroid, tetracycline và các loại thuốc khác 2. Chế độ ăn nhiều đạm (đặc biệt khi suy thận), xuất huyết tiêu hóa 3. Mất nước, suy tim, giảm protein máu, giảm thể tích máu, hội chứng gan thận 4. đường tiết niệu tắc nghẽn, thông nối niệu quản; tăng tính thấm bẩm sinh của ure trong ống thận
	Thấp	1. Đói, chế độ ăn ít protein 2. Suy gan nặng 3. Dùng thuốc lợi tiểu, v.v.

Người vận hành:

Người gửi mẫu:

Chẩn đoán:

Lưu ý: Do sự phức tạp và tính cá nhân riêng biệt của việc chẩn đoán bệnh trong các trường hợp cụ thể, việc giải thích kết quả xét nghiệm này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở một chiều cho chẩn đoán bệnh cụ thể.

Kết quả chỉ có ý nghĩa với mẫu bệnh phẩm này!