

Aufgabe 1 Stellen Sie jeweils das kartesische Produkt der Mengen M_1 und M_2 grafisch dar und geben Sie ein Beispiel für eine Relation auf $M_1 \times M_2$ an.

- a) $M_1 = \{x \in \mathbf{R} \mid 1 \leq x \leq 3\}$, $M_2 = \{x \in \mathbf{R} \mid 2 \leq x \leq 5\}$
- b) $M_1 = \{1, 2, 4\}$, $M_2 = \{0, 5, 6\}$
- c) $M_1 = \{x \in \mathbf{R} \mid 2k \leq x \leq 2k+1, k \in \{0, 1, 2, 3\}\}$, $M_2 = \{x \in \mathbf{R} \mid 2k-1 \leq x \leq 2k, k \in \{1, 2, 3, 4\}\}$
- d) $M_1 = \{w, f\}$, $M_2 = M_1$

Aufgabe 2 Untersuchen Sie jeweils, ob die Relation R reflexiv, symmetrisch oder transitiv ist. Ist R eine Äquivalenzrelation?

- a) $R = \{(g_1, g_2) \in M^2 \mid g_1 \text{ ist senkrecht zu } g_2\}$ mit $M = \{g \mid g \text{ ist eine Gerade}\}$
- b) $R = \{(g_1, g_2) \in M^2 \mid g_1 \text{ ist parallel zu } g_2\}$ mit M wie in a)
- c) $R = \{(m_1, m_2) \in M^2 \mid m_1 \text{ ist Mutter von } m_2\}$ mit $M = \{m \mid m \text{ ist ein Mensch}\}$
- d) $R = \{(m_1, m_2) \in M^2 \mid m_1 \text{ ist verheiratet mit } m_2\}$ mit M wie in c)
- e) $R = \{(A, B) \in M^2 \mid A \Rightarrow B\}$ mit $M = \{A \mid A \text{ ist eine Aussage}\}$
- f) $R = \{(A, B) \in M^2 \mid A \Leftrightarrow B\}$ mit M wie in e)
- g) $R = \{(A, B) \in M^2 \mid A \wedge B\}$ mit M wie in e)
- h) $R = \{(A, B) \in M^2 \mid A \vee B\}$ mit M wie in e)
- i) $R = \{(U, V) \in M^2 \mid U \subset V\}$ mit einer Grundmenge G und $M = \{U \mid U \subset G\}$
- j) $R = \{(U, V) \in M^2 \mid U = V\}$ mit M wie in i)
- k) $R = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid x - y \in \mathbf{Z}\}$
- l) $R = \{(x, y) \in (\mathbf{R} \setminus \{0\})^2 \mid x/y \in \mathbf{Z}\}$
- m) $R = \{(x, y) \in M^2 \mid f(x) = f(y)\}$ mit einer Abbildung f und ihrer Definitionsmenge $D_f = M$

Aufgabe 3 Der Graph einer Abbildung $f : M \rightarrow N$ ist die Relation $\{(x, y) \in M \times N \mid y = f(x)\}$ auf $M \times N$ und wird mit $\text{graph}(f)$ bezeichnet. Umgekehrt ist eine Relation R auf $M \times N$ dann und nur dann der Graph einer Abbildung von M nach N , wenn zu jedem $x \in M$ genau eine $y \in N$ existiert mit xRy . Stellen Sie jeweils die Relation R grafisch dar und untersuchen Sie, ob R Graph einer Funktion ist. Wie lautet gegebenenfalls diese Funktion?

- a) $R = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid x^2 = y^3\}$
- b) $R = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid x^3 = y^2\}$
- c) $R = \{(x, y) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}^{\geq 0} \mid x^3 = y^2\}$
- d) $R = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 5\}$
- e) $R = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid y = 1/x\}$
- f) $R = \{(x, y) \in \mathbf{R} \setminus \{0\} \times \mathbf{R} \mid y = 1/x\}$

Aufgabe 4 Es sei f eine Abbildung von M nach N . Zeigen Sie, dass für alle $U_1, U_2 \subset M$ und alle $V_1, V_2 \subset N$ gilt:

- a) $f(U_1 \cap U_2) \subset f(U_1) \cap f(U_2)$
- b) $f(U_1 \cup U_2) = f(U_1) \cup f(U_2)$
- c) $f^{-1}(V_1 \cap V_2) = f^{-1}(V_1) \cap f^{-1}(V_2)$
- d) $f^{-1}(V_1 \cup V_2) = f^{-1}(V_1) \cup f^{-1}(V_2)$

Geben Sie ein Beispiel dafür an, dass in a) im allgemeinen nicht die Gleichheit gilt.

Lösungen zu Aufgabe 2

- a) nicht reflexiv, symmetrisch, nicht transitiv
- b) Äquivalenzrelation
- c) nicht reflexiv, nicht symmetrisch, nicht transitiv
- d) nicht reflexiv, symmetrisch, transitiv
- e) reflexiv, nicht symmetrisch, transitiv
- f) Äquivalenzrelation
- g) nicht reflexiv, symmetrisch, transitiv
- h) nicht reflexiv, symmetrisch, nicht transitiv
- i) reflexiv, nicht symmetrisch, transitiv
- j) Äquivalenzrelation
- k) Äquivalenzrelation
- l) reflexiv, nicht symmetrisch, transitiv
- m) Äquivalenzrelation

Lösungen zu Aufgabe 3

- | | |
|---|---|
| a) $R = \text{graph}(f)$ mit $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto \sqrt[3]{x^2}$ | b) kein Graph |
| c) kein Graph | d) kein Graph |
| e) kein Graph | f) $R = \text{graph}(f)$ mit $f : \mathbf{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto 1/x$ |