Gangguan Tidur pada Kanak-kanak Autism

Pengenalan

Gangguan tidur adalah antara masalah yang paling biasa dihadapi oleh kanak-kanak autism. Kajian menunjukkan bahawa 50% hingga 80% kanak-kanak autism mengalami masalah tidur, berbanding 20% hingga 30% kanak-kanak biasa. Masalah tidur yang tidak dirawat boleh memburukkan simptom autism dan menjejaskan kualiti hidup keluarga.

Jenis Masalah Tidur

1. Kesukaran Untuk Tidur (Sleep Onset Insomnia)

Kanak-kanak autism sering menghadapi kesukaran untuk mula tidur. Mereka mungkin mengambil masa 1 hingga 2 jam untuk tertidur walaupun sudah berbaring di tempat tidur. Ini mungkin disebabkan oleh kebimbangan, hiperaktif, atau kepekaan terhadap bunyi dan cahaya.

2. Kerap Terbangun (Sleep Maintenance Insomnia)

Sesetengah kanak-kanak autism kerap terbangun pada waktu malam, kadang-kadang 3 hingga 5 kali setiap malam. Mereka mungkin menangis, bermain, atau berjalan-jalan pada waktu tidur.

3. Bangun Terlalu Awal (Early Morning Awakening)

Kanak-kanak autism mungkin bangun pada pukul 4 atau 5 pagi dan tidak dapat tidur semula. Ini menjejaskan kualiti tidur mereka dan menyebabkan keletihan pada waktu siang.

4. Rutin Tidur yang Tidak Teratur

Kanak-kanak autism sering memerlukan rutin yang sama setiap malam sebelum tidur. Sebarang perubahan dalam rutin, seperti tidur di tempat berbeza atau percutian, boleh menyebabkan gangguan tidur yang teruk.

Punca Gangguan Tidur

Faktor Biologi

- Kadar melatonin yang rendah pada kanak-kanak autism
- Kepekaan sensori yang tinggi terhadap cahaya, bunyi, dan suhu
- Gangguan irama sirkadian (body clock)

Fakti Persekitaran

- Bilik tidur yang terlalu terang atau bising
- Penggunaan skrin (telefon, tablet) sebelum tidur
- Kurang rutin tidur yang konsisten

Faktor Tingkah Laku

- Kebimbangan dan ketakutan waktu malam
- Ketergantungan pada ibu bapa untuk tidur
- Tingkah laku stereotaip yang mengganggu waktu tidur

Strategi Rawatan

1. Rutin Tidur yang Konsisten

Tetapkan rutin yang sama setiap malam: - Mandi air suam pada pukul 8 malam - Membaca buku atau mendengar muzik lembut - Padam semua skrin 1 jam sebelum tidur - Bilik tidur gelap, senyap, dan sejuk

2. Suplemen Melatonin

Melatonin boleh membantu kanak-kanak autism tidur lebih cepat. Dos yang disyorkan adalah 1mg hingga 3mg, diberi 30 minit sebelum waktu tidur. Namun, suplemen ini harus diberi di bawah pengawasan doktor.

3. Terapi Tingkah Laku Kognitif (CBT)

CBT boleh membantu kanak-kanak yang lebih besar menguruskan kebimbangan waktu malam. Therapist akan mengajar teknik relaksasi dan cara mengubah fikiran negatif tentang tidur.

4. Pengurusan Sensori

Gunakan selimut berat (weighted blanket) untuk membantu kanak-kanak autism berasa lebih selesa dan tenang. Lampu tidur yang redup dan bunyi putih (white noise) juga boleh membantu.

Bila Perlu Berjumpa Doktor

Ibu bapa harus berjumpa doktor jika: - Kanak-kanak tidur kurang dari 6 jam setiap malam secara berterusan - Gangguan tidur menjejaskan tingkah laku pada waktu siang - Kanak-kanak menunjukkan simptom baru seperti berjalan dalam tidur (sleepwalking) - Masalah tidur berterusan walaupun selepas 2 minggu amalan rutin tidur yang baik