# Terapi Pemakanan untuk Kanak-kanak Autism

## Pengenalan

Masalah pemakanan adalah antara cabaran yang paling biasa dihadapi oleh kanak-kanak autism. Kajian menunjukkan bahawa 70% hingga 90% kanak-kanak autism mempunyai masalah pemakanan, termasuk pemilih makanan yang teruk (picky eating), kepekaan terhadap tekstur dan bau makanan, serta tingkah laku makan yang tidak biasa seperti memakan bahan bukan makanan (pica).

Terapi pemakanan atau feeding therapy bertujuan untuk membantu kanak-kanak autism menerima pelbagai jenis makanan, mengurangkan kekecewaan semasa waktu makan, dan memastikan kanak-kanak mendapat nutrisi yang mencukupi untuk tumbesaran yang sihat.

## Jenis Masalah Pemakanan

Pemilih makanan yang teruk bermaksud kanak-kanak hanya mahu makan satu jenis makanan atau makanan dengan warna, tekstur, dan jenama yang sama. Contohnya, kanak-kanak hanya mahu makan nasi putih dengan satu jenama sos tertentu. Sekiranya jenama itu ditukar, kanak-kanak akan menolak makanan tersebut.

Kepekaan sensori terhadap makanan menyebabkan kanak-kanak autism menolak makanan berdasarkan tekstur, suhu, bau, atau rupa. Makanan yang lembut, makanan yang rangup, makanan yang sejuk, atau makanan yang bercampur boleh menyebabkan kanak-kanak autism menolak makanan tersebut.

Pica adalah keadaan di mana kanak-kanak memakan bahan bukan makanan seperti kertas, tanah, kapur, atau rambut. Ini berbahaya kerana boleh menyebabkan keracunan atau halangan usus dan memerlukan rawatan perubatan segera.

## Punca Masalah Pemakanan

Kepekaan sensori adalah punca utama. Kanak-kanak autism mempunyai kepekaan deria yang berbeza dari kanak-kanak biasa. Makanan yang kita rasa sedap mungkin terasa terlalu kuat atau menyakitkan bagi mereka.

Kebimbangan dan keperluan rutin juga menyumbang kepada masalah pemakanan. Kanak-kanak autism memerlukan rutin yang sama setiap hari. Sebarang perubahan dalam jenis makanan, tempat makan, atau alat makan boleh menyebabkan kekecewaan yang teruk.

Masalah motorik oral seperti kelemahan otot mulut dan lidah boleh menyebabkan kesukaran mengunyah dan menelan. Ini membuatkan kanak-kanak mengelak makanan yang sukar dikunyah seperti daging dan sayur-sayuran keras.

## Strategi Rawatan

SOS Approach to Feeding adalah pendekatan yang paling berkesan untuk kanak-kanak autism. Terapi ini memperkenalkan makanan baru secara berperingkat, bermula dengan melihat makanan dari jauh, kemudian menyentuh, mencium, mencium, menyentuh bibir, menjilat, menggigit, dan akhirnya memakan.

Food chaining adalah teknik di mana makanan baru diperkenalkan secara beransur-ansur bermula dari makanan yang kanak-kanak sudah suka. Contohnya, jika kanak-kanak suka keropok, kita perkenalkan keropok rasa keju, kemudian keju betul, kemudian keju dengan roti, dan seterusnya.

Pengurusan sensori melibatkan penyesuaian persekitaran makan. Gunakan pinggan yang sama setiap hari, pastikan makanan tidak bercampur, dan hidangkan makanan pada suhu yang sama. Beberapa kanak-kanak autism memerlukan makanan dipisahkan dalam bahagian yang berbeza.

Terapi pertuturan dan occupational therapy juga boleh membantu dengan menguatkan otot mulut dan mengajar kemahiran mengunyah dan menelan dengan betul.

## Pemantauan Pertumbuhan

Kanak-kanak autism yang mempunyai masalah pemakanan memerlukan pemantauan pertumbuhan yang kerap oleh doktor atau dietitian. Berat dan tinggi badan perlu direkod setiap bulan untuk memastikan kanak-kanak tidak mengalami kekurangan zat makanan.

Sekiranya kanak-kanak tidak menambah berat badan selama 3 bulan berturut-turut, rujukan kepada dietitian atau pakar pemakanan diperlukan. Mereka mungkin mengesyorkan suplemen pemakanan untuk memastikan keperluan nutrisi kanak-kanak dipenuhi.