Terapi Pertuturan untuk Kanak-kanak Autism

Pengenalan

Terapi pertuturan atau speech therapy adalah antara intervensi paling penting untuk kanak-kanak autism. Kanak-kanak autism sering mengalami kelewatan dalam perkembangan bahasa dan komunikasi. Ada yang tidak boleh bercakap langsung, ada yang bercakap tetapi tidak menggunakan ayat dengan betul, dan ada yang bercakap tetapi tidak memahami komunikasi dua hala.

Terapi pertuturan membantu kanak-kanak autism meningkatkan kemahiran komunikasi, sama ada secara lisan, menggunakan gambar (PECS), atau melalui peranti komunikasi augmentatif dan alternatif (AAC).

Matlamat Terapi Pertuturan

Matlamat utama terapi pertuturan untuk kanak-kanak autism termasuk: meningkatkan kemahiran artikulasi dan sebutan, mengembangkan perbendaharaan kata, mengajar komunikasi dua hala seperti gilir bercakap dan mendengar, serta mengurangkan tingkah laku komunikasi yang mencabar seperti menjerit atau memukul untuk mendapatkan perhatian.

Selain itu, terapi ini juga membantu kanak-kanak autism memahami bahasa bukan lisan seperti gerak badan, mimik muka, dan nada suara yang penting dalam interaksi sosial.

Teknik dalam Terapi Pertuturan

Antara teknik yang digunakan oleh speech therapist ialah Picture Exchange Communication System (PECS) di mana kanak-kanak menggunakan gambar untuk berkomunikasi. Teknik ini sesuai untuk kanak-kanak yang belum boleh bercakap.

Teknik kedua ialah Augmentative and Alternative Communication (AAC) yang menggunakan peranti elektronik untuk membantu kanak-kanak menyebut perkataan. Peranti ini mempunyai butang dengan gambar dan suara yang kanak-kanak boleh tekan untuk berkomunikasi.

Teknik ketiga ialah floor time atau play-based therapy di mana therapist bermain bersama kanak-kanak dan menggalakkan komunikasi secara semula jadi semasa bermain. Ini membantu kanak-kanak belajar komunikasi dalam konteks yang menyeronokkan.

Tempoh dan Kekerapan

Kanak-kanak autism memerlukan terapi pertuturan sekurang-kurangnya 2 hingga 3 kali seminggu. Setiap sesi mengambil masa 45 minit hingga 1 jam. Tempoh rawatan bergantung kepada tahap kelewatan bahasa kanak-kanak.

Kanak-kanak yang tidak boleh bercakap langsung mungkin memerlukan terapi selama 2 hingga 3 tahun sebelum mula bercakap dengan lancar. Kanak-kanak yang sudah boleh bercakap tetapi mempunyai masalah sebutan mungkin hanya memerlukan 6 bulan hingga 1 tahun terapi.

Peranan Ibu Bapa di Rumah

Ibu bapa perlu mengamalkan teknik yang diajar oleh therapist di rumah. Ini termasuk menggunakan gambar untuk berkomunikasi, memberi masa untuk kanak-kanak menjawab soalan, dan tidak mengatasi jawapan kanak-kanak terlalu cepat.

Ibu bapa juga digalakkan membaca buku bersama kanak-kanak setiap hari, menyanyi lagu kanak-kanak, dan bermain permainan yang melibatkan gilir bercakap. Aktiviti ini mengukuhkan kemahiran yang dipelajari semasa sesi terapi.