

Homework 4

$$f(x) = x \log x - x$$

1). f is convex if $\nabla^2 f(x) \geq 0$

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

↓

Laplace
operator

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \log x + \frac{1}{\ln 10} - 1$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{1}{x \ln 10}$$

$$\boxed{\frac{1}{x \ln 10} \geq 0 \text{ for all } x > 0}$$

Strongly convex if: $f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T (y-x) + \frac{\mu}{2} \|y-x\|^2$

$$f(y) \geq f(x) + \left(\log x + \frac{1}{\ln 10} - 1 \right) (y-x) + \|y-x\|^2$$

$f''(x)$ is close to 0
Therefore $x \rightarrow \infty$ $f(x)$ looks
linear

therefore it cannot be lower bounded
by a quadratic and is not
strongly convex

$$2). \quad \nabla f(x) = \begin{cases} 2x, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$x < 0: |f(x_1) - f(x_2)| \leq M |x_1 - x_2|$$

$$|2x_1 - 2x_2| \leq M |x_1 - x_2|$$

$$2|x_1 - x_2| \leq M |x_1 - x_2| \Rightarrow \text{any } M \geq 2 \text{ will satisfy Lipschitz continuity for } x < 0$$

$$x > 0: |x_1 - x_2| \leq M |x_1 - x_2|$$

$$\Rightarrow \text{any } M \geq 1 \text{ will satisfy Lipschitz continuity for } x > 0$$

$$3). \quad |Q_k - Q_*| = \text{something linear } (1.2 - \alpha)$$

$$\nabla f(Q) = \mu(Q - Q_*)$$

At each iteration:

$$Q = Q - \mu(Q - Q_*) \alpha$$

linear function