
Per-protein scatterplots (1/5): ten mutations per panel
P00044 | Boltz-2
r = 0.64 [0.02, 0.91]; ρ = 0.65
P00044 | Chai-1
r = -0.16 [-0.72, 0.52]; ρ = -0.38
P00044 | ESMFold2
r = -0.74 [-0.94, -0.21]; ρ = -0.82
P00149 | Boltz-2
r = 0.35 [-0.36, 0.80]; ρ = 0.10
P00149 | Chai-1
r = -0.11 [-0.69, 0.56]; ρ = -0.04
P00149 | ESMFold2
r = -0.58 [-0.88, 0.09]; ρ = -0.92
P00651 | Boltz-2
r = -0.24 [-0.75, 0.46]; ρ = -0.02
P00651 | Chai-1
r = -0.07 [-0.67, 0.59]; ρ = -0.02
P00651 | ESMFold2
r = 0.63 [-0.00, 0.90]; ρ = 0.03
P00711 | Boltz-2
r = 0.55 [-0.12, 0.88]; ρ = 0.45
P00711 | Chai-1
r = 0.56 [-0.11, 0.88]; ρ = 0.67
P00711 | ESMFold2
r = 0.04 [-0.60, 0.66]; ρ = 0.07
Local ΔpLDDT (points)
Experimental ΔΔG (kcal/mol)
Scales vary by protein; three model panels share scales within each row. Intervals are descriptive Fisher-z 95% CIs.