
Per-protein scatterplots (2/5): ten mutations per panel
P00720 | Boltz-2
r = -0.83 [-0.96, -0.43]; ρ = -0.83
P00720 | Chai-1
r = -0.96 [-0.99, -0.83]; ρ = -0.89
P00720 | ESMFold2
r = -0.89 [-0.97, -0.60]; ρ = -0.88
P00974 | Boltz-2
r = -0.21 [-0.74, 0.49]; ρ = -0.18
P00974 | Chai-1
r = -0.32 [-0.79, 0.39]; ρ = -0.42
P00974 | ESMFold2
r = 0.02 [-0.62, 0.64]; ρ = -0.14
P01053 | Boltz-2
r = -0.55 [-0.88, 0.12]; ρ = -0.26
P01053 | Chai-1
r = -0.31 [-0.79, 0.39]; ρ = -0.30
P01053 | ESMFold2
r = 0.09 [-0.57, 0.68]; ρ = 0.01
P02185 | Boltz-2
r = -0.00 [-0.63, 0.63]; ρ = -0.22
P02185 | Chai-1
r = -0.09 [-0.68, 0.57]; ρ = -0.10
P02185 | ESMFold2
r = 0.42 [-0.29, 0.83]; ρ = 0.10
Local ΔpLDDT (points)
Experimental ΔΔG (kcal/mol)
Scales vary by protein; three model panels share scales within each row. Intervals are descriptive Fisher-z 95% CIs.