
Per-protein scatterplots (3/5): ten mutations per panel
P02417 | Boltz-2
r = -0.11 [-0.69, 0.56]; ρ = -0.22
P02417 | Chai-1
r = 0.03 [-0.61, 0.64]; ρ = -0.08
P02417 | ESMFold2
r = 0.07 [-0.58, 0.67]; ρ = 0.13
P02633 | Boltz-2
r = -0.17 [-0.72, 0.52]; ρ = -0.34
P02633 | Chai-1
r = -0.33 [-0.80, 0.37]; ρ = -0.58
P02633 | ESMFold2
r = -0.05 [-0.66, 0.60]; ρ = -0.01
P03050 | Boltz-2
r = -0.28 [-0.77, 0.42]; ρ = -0.36
P03050 | Chai-1
r = -0.68 [-0.92, -0.10]; ρ = -0.65
P03050 | ESMFold2
r = -0.61 [-0.89, 0.04]; ρ = -0.71
P05230 | Boltz-2
r = -0.16 [-0.72, 0.52]; ρ = -0.01
P05230 | Chai-1
r = -0.35 [-0.80, 0.36]; ρ = -0.61
P05230 | ESMFold2
r = -0.36 [-0.81, 0.35]; ρ = -0.43
Local ΔpLDDT (points)
Experimental ΔΔG (kcal/mol)
Scales vary by protein; three model panels share scales within each row. Intervals are descriptive Fisher-z 95% CIs.