
Per-protein scatterplots (4/5): ten mutations per panel
P05798 | Boltz-2
r = -0.15 [-0.71, 0.53]; ρ = -0.38
P05798 | Chai-1
r = 0.45 [-0.25, 0.84]; ρ = 0.35
P05798 | ESMFold2
r = -0.06 [-0.66, 0.59]; ρ = -0.02
P0A3E0 | Boltz-2
r = -0.41 [-0.83, 0.29]; ρ = -0.28
P0A3E0 | Chai-1
r = 0.28 [-0.43, 0.77]; ρ = 0.32
P0A3E0 | ESMFold2
r = -0.46 [-0.84, 0.24]; ρ = 0.02
P0A7Y4 | Boltz-2
r = -0.15 [-0.71, 0.53]; ρ = 0.06
P0A7Y4 | Chai-1
r = -0.70 [-0.92, -0.12]; ρ = -0.63
P0A7Y4 | ESMFold2
r = -0.56 [-0.88, 0.11]; ρ = -0.31
P23370 | Boltz-2
r = -0.50 [-0.86, 0.19]; ρ = -0.55
P23370 | Chai-1
r = -0.45 [-0.84, 0.25]; ρ = -0.39
P23370 | ESMFold2
r = -0.20 [-0.74, 0.49]; ρ = -0.52
Local ΔpLDDT (points)
Experimental ΔΔG (kcal/mol)
Scales vary by protein; three model panels share scales within each row. Intervals are descriptive Fisher-z 95% CIs.