

Lärarens sidor: Bas

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Här står de tio problemen på nivån Bas, som ligger nära åk 4–5, i den ordning gruppen tar dem.

Problemet	Matematiken	Lösning A	Lösning B
1. Äpplena	räkna baklänges, del och helhet	Gör en tabell: pröva 2, 3 och 4 ur varje	Räkna baklänges från det som är kvar
2. Fiskebodarna	ett mönster som växer	Gör en tabell: 4 stickor till per bod	Leta efter ett mönster: 1 sticka och 4 per bod
3. Kexen	jämna ut, som ett medelvärde	Rita eller bygg: jämna ut i staplar	räkna alla kex och dela med 3
4. Chokladbollarna	proportionalitet	Gör en tabell: 10, 20 och 30 bollar	Börja med mindre tal: 10 bollar tre gånger
5. Ljusstakarna	två okända tal	Pröva och förbättra i en tabell	Tänk dig att alla är av samma sort
6. Tornet	ett mönster av kuber	Leta efter ett mönster: lager för lager	Rita eller bygg: stolpen och fyra trappor
7. Matcherna	kombinatorik	Gör en lista: lag för lag i ordning	Rita eller bygg: prickar och streck
8. Tärningarna	sannolikhet	kasta 36 gånger och sätt streck	Gör en tabell: alla 36 utfall
9. Parken	omkrets och varv	Gör en tabell: meter efter varje varv	Rita eller bygg: hopp på tallinjer
10. Vågen	likheter med tre okända	lägg ihop alla tre vågarna	jämför vågarna två och två

Så använder du problemen

Ordningen	Ta problemen i ordning, ett per pass, och byt ordning när gruppen behöver arbeta med ett annat område eller ett problem som liknar det förra. De första är lättast att börja på.
Kopiorna	Kopiera problemets sida till varje par, eller visa den på tavlan. I Jämföra får varje par bladet Två lösningar, med B under ett papper tills gruppen har sagt vad A gör.

© Niclas Fohlin. Ur Problemlösning i grupp, <https://niclasfohlin.se/stodundervisning/problemlosning-i-grupp>.

Lärarens sida: Bas, problem 1, Äpplena

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

Fyra påsar med äpplen står på bänken. I påsarna finns 25 äpplen tillsammans. Elsa tar lika många äpplen ur varje påse. Sedan finns det 1, 2, 3 och 3 äpplen kvar i påsarna.


Hur många äpplen tog Elsa ur varje påse?

Hur många äpplen fanns det i varje påse från början?

Problemet handlar om del och helhet och om att räkna baklänges. Svaret är 4 äpplen ur varje påse, och påsarna hade 5, 6, 7 och 7. Eleverna lägger ihop, delar lika och ser att ett äpple mer ur varje påse ger fyra äpplen mer från början. Material: kuber, 25 per par. Idén kommer ur Känguru 2026, Ecolier nr 11.

ur varje påse	påsarna från början	ihop
2	3, 4, 5, 5	17 för få
3	4, 5, 6, 6	21 för få
4	5, 6, 7, 7	25 ✓

Så räknade vi sista raden: $5 + 6 + 7 + 7 = 25$



Kvar: $1 + 2 + 3 + 3 = 9$

↓

Elsa tog $25 - 9 = 16$

↓

$16 / 4 = 4$ ur varje påse

Kontroll: påsarna från början
 $5 + 6 + 7 + 7 = 25$ ✓

16 äpplen
i 4 lika delar


Lösning A

Lösning B

I passet	
Ringa in	Frågorna, orden "lika många" och "kvar", talet 25 och de fyra talen 1, 2, 3 och 3.
Lyft ut	Vi vet: 25 äpplen i fyra påsar, lika många ur varje, och 1, 2, 3 och 3 blir kvar. Vi ska ta reda på: hur många ur varje påse, och hur många från början.
Ord och tal	Visa bilden: påsarna visar det som är kvar, rutorna det Elsa tar och klammern alla äpplen från början. Fråga: Vad räknar 25, och vad räknar 1, 2, 3 och 3?
Förutse	Eleverna lägger kuber i fyra högar, prövar ett antal eller räknar det som är kvar först. Ofta svarar någon 9 eller 16.
Kör de fast	Föreslå: Gissa hur många Elsa tog ur varje påse, och räkna hur många det blir från början. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att 3 ur varje påse gav 21 äpplen från början. Försök använda det!
Säg inte	Räkna först det som är kvar och dra bort det från 25. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: 13 äpplen, och 1, 2, 1 och 1 kvar (2 ur varje). Större: Kan det ha funnits 27 äpplen från början? (Nej: $(27 - 9) / 4$ går inte jämnt ut) Vilka antal äpplen går, om 1, 2, 3 och 3 blir kvar? (13, 17, 21 och så vidare)
Jämför	Det Elsa tar ur påsarna är fyra lika delar. I A växer summan med 4 från rad till rad, och i B delar eleven 16 i fyra lika delar.
Fel eller osäker	Ni säger att svaret är 9. Hur kan ni kontrollera att det svarar på frågan? Ni säger att påsarna hade lika många från början. Hur kan ni kontrollera det mot problemet?

ÄPPLENA

Fyra påsar med äpplen står på bänken. I påsarna finns 25 äpplen tillsammans. Elsa tar lika många äpplen ur varje påse. Sedan finns det 1, 2, 3 och 3 äpplen kvar i påsarna.



FRÅGORNA

1. Hur många äpplen tog Elsa ur varje påse?
2. Hur många äpplen fanns det i varje påse från början?

ÄPPLENA

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.


LÖSNING A

ur varje påse	påsarna från början	ihop
2	3, 4, 5, 5	17 för få
3	4, 5, 6, 6	21 för få
4	5, 6, 7, 7	25 ✓

↓ +4
↓ +4

Så räknade vi sista raden: $5 + 6 + 7 + 7 = 25$

LÖSNING B



16 äpplen
i 4 lika delar

Kvar: $1 + 2 + 3 + 3 = 9$



Elsa tog $25 - 9 = 16$



$16 / 4 = 4$ ur varje påse

Kontroll: påsarna från början

$5 + 6 + 7 + 7 = 25$ ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad ändrar eleven i lösning A från rad till rad, och vad händer med summan?
2. Varför räknar eleven i lösning B först de äpplen som är kvar?
3. Var syns det i båda lösningarna att det Elsa tog är fyra lika delar?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med 10 påsar och 100 äpplen, och varför?

Lärarens sida: Bas, problem 2, Fiskebodarna

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

Lisa bygger fiskebodar av stickor. En bod har ett golv, två väggar och ett tak av två stickor. När bodarna står i rad, delar två bodar på en vägg. Bilden visar en bod och tre bodar i rad.

Hur många stickor behövs till 6 bodar i rad?

Hur många stickor behövs till 20 bodar i rad?

Problemet handlar om ett mönster som växer, där varje ny bod tar fyra stickor till. Svaret är 25 stickor till 6 bodar och 81 till 20 bodar. Eleverna bygger, för in i en tabell och beskriver mönstret med ord. Material: tändstickor eller glasspinnar, 30 per par. Idén kommer ur NCM:s Strävorna 4B/5B, Fiskebodarna.

bodar	stickor		bodar	stickor	
1	5		11	45	
2	9	+ 4	12	49	
3	13	+ 4	13	53	
4	17	+ 4	14	57	
5	21		15	61	6 bodar:
6	25		16	65	25 stickor ✓
7	29		17	69	
8	33		18	73	20 bodar:
9	37		19	77	81 stickor ✓
10	41		20	81	

Varje ny bod ger 4 stickor till.

6 bodar: 25 stickor ✓

20 bodar: 81 stickor ✓

den första väggen och 4 för varje bod

Första väggen: 1 sticka
Varje bod: 4 stickor till

↓

6 bodar: $1 + 6 \cdot 4 = 25$

↓

20 bodar: $1 + 20 \cdot 4 = 81$

Kontroll: 3 bodar på bilden
 $1 + 3 \cdot 4 = 13$ stickor ✓


Lösning A

Lösning B


I passet	
Ringa in	Frågorna, talen 6 och 20, och orden "i rad" och "delar på en vägg".
Lyft ut	Vi vet: en bod har fem stickor, och två bodar i rad delar på en vägg. Vi ska ta reda på: antalet stickor till 6 och till 20 bodar.
Ord och tal	Peka på golvet, väggarna och taket, och på väggen som två bodar delar. Fråga: Vad räknar 6 och 20, och vad ska vi räkna?
Förutse	Eleverna bygger bodar, gör en tabell där talen ökar med 4 eller räknar en sticka och 4 per bod. Någon räknar $6 \cdot 5 = 30$ och glömmer de delade väggarna.
Kör de fast	Föreslå: Bygg 1, 2 och 3 bodar och räkna stickorna. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att varje ny bod tog 4 stickor. Försök använda det!
Säg inte	Börja med en sticka och lägg till fyra för varje bod. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: 4 bodar och 10 bodar (17 och 41 stickor). Större: Hur många stickor behövs till 99 bodar? (397) Skriv med ord en regel som gäller för alla bodar. (En sticka, och sedan 4 för varje bod)
Jämför	Varje ny bod tar 4 stickor till. I A ökar stickorna med 4 från rad till rad, och i B syns det i $6 \cdot 4$ och $20 \cdot 4$.
Fel eller osäker	Ni säger att det blir 30 stickor. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med problemet? Ni säger att 20 bodar tar dubbelt så många som 10. Hur kan ni kontrollera det med 2 och 4 bodar?

FISKEBODARNA

Lisa bygger fiskebodar av stickor. En bod har ett golv, två väggar och ett tak av två stickor. När bodarna står i rad, delar två bodar på en vägg. Bilden visar en bod och tre bodar i rad.



en bod



tre bodar i rad

FRÅGORNA

1. Hur många stickor behövs till 6 bodar i rad?
2. Hur många stickor behövs till 20 bodar i rad?


FISKEBODARNA

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

bodar	stickor		bodar	stickor	
1	5		11	45	
2	9	+ 4	12	49	
3	13	+ 4	13	53	
4	17	+ 4	14	57	
5	21		15	61	6 bodar:
6	25		16	65	25 stickor ✓
7	29		17	69	
8	33		18	73	20 bodar:
9	37		19	77	81 stickor ✓
10	41		20	81	

LÖSNING B



den första väggen
och 4 för varje bod

Första väggen: 1 sticka

Varje bod: 4 stickor till



6 bodar: $1 + 6 \cdot 4 = 25$



20 bodar: $1 + 20 \cdot 4 = 81$

Kontroll: 3 bodar på bilden

$1 + 3 \cdot 4 = 13$ stickor ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Hur fortsätter eleven tabellen i lösning A från rad till rad?
2. Varför börjar eleven i lösning B med 1 sticka?
3. Var syns det i båda lösningarna att varje ny bod tar 4 stickor till?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja för 99 bodar, och varför?

Lärarens sida: Bas, problem 3, Kexen

Problemlösning i grupp · åk 4–9


Problemet

Tre barn har var sitt fat med kex. På Omars fat ligger 3 kex, på Sagas 4 och på Liams 5. På en bricka ligger 15 kex till. Barnen delar på kexen från brickan, så att alla tre har lika många kex till slut.


Hur många kex har vart och ett av barnen till slut?

Hur många kex från brickan får vart och ett av barnen?

Problemet handlar om att dela lika när delarna är olika stora från början. Det är idén bakom medelvärdet. Svaret är 9 kex var, och från brickan får Omar 6, Saga 5 och Liam 4. Eleverna lägger ihop, delar lika och jämnar ut. Material: kuber eller kex, 32 per par. Idén kommer ur Känguru 2025, Ecolier nr 11.



Lösning A




Lösning B

I passet	
Ringa in	Frågorna, talen 3, 4, 5 och 15, och orden "lika många" och "från brickan".
Lyft ut	Vi vet: faten har 3, 4 och 5 kex, brickan 15. Alla ska ha lika många. Vi ska ta reda på: hur många var och en har till slut och får från brickan.
Ord och tal	Peka på faten, brickan och kexen på bilden. Fråga: Vad räknar 15? Betyder "lika många" att alla får lika många från brickan?
Förutse	Eleverna delar ut kex eller kuber, jämnar ut staplar eller räknar alla kex först. Någon delar $15 / 3 = 5$.
Kör de fast	Föreslå: Lägg ut kexen med kuber och dela ut från brickan. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att alla kan ha 5, som Liam. Försök använda det!
Säg inte	Lägg ihop alla kexen och dela med 3. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Faten har 1, 2 och 3 kex, och brickan 6 (4 var). Större: Ett fjärde barn kommer med 5 kex på sitt fat. Hur många får var och en från brickan nu? (Alla har 8: 5, 4, 3 och 3 från brickan)
Jämför	Den som har minst får mest från brickan, så att alla har 9. I A syns det i staplarna, och i B i uträkningarna $9 - 3$, $9 - 4$ och $9 - 5$.
Fel eller osäker	Ni säger att alla får 5 från brickan. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med problemet? "Är svaret 9 kex från brickan?" Hur kan ni kontrollera att det svarar på frågan?

KEXEN

Tre barn har var sitt fat med kex. På Omars fat ligger 3 kex, på Sagas 4 och på Liams 5. På en bricka ligger 15 kex till. Barnen delar på kexen från brickan, så att alla tre har lika många kex till slut.




FRÅGORNA

1. Hur många kex har vart och ett av barnen till slut?
2. Hur många kex från brickan får vart och ett av barnen?

KEXEN

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A



Först får alla 5:
Omar 2, Saga 1, Liam 0
↓
 $15 - 3 = 12$ kvar
↓
 $12 / 3 = 4$ var
↓
Alla har $5 + 4 = 9$ ✓

Från brickan:
Omar 6, Saga 5, Liam 4

LÖSNING B

Omar ○○○○○○○○○○○
Saga ○○○○○○○○○○○
Liam ○○○○○○○○○○○

9 kex var.
De streckade är
från brickan.

Alla kex:
 $3 + 4 + 5 + 15 = 27$
↓
 $27 / 3 = 9$ var
↓
Omar $9 - 3 = 6$
Saga $9 - 4 = 5$
Liam $9 - 5 = 4$

Kontroll: $6 + 5 + 4 = 15$ ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Varför ger eleven i lösning A först kex till Omar och Saga?
2. Varför räknar eleven i lösning B alla kexen, också de på faten?
3. Var syns det i båda lösningarna att den som har minst får mest från brickan?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med 10 barn, och varför?

Lärarens sida: Bas, problem 4, Chokladbollarna

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

Gruppen vill göra 30 chokladbollar till klassens fest. Receptet räcker till 20 bollar, och till dem behövs 4 dl havregryn, 2 dl socker, 100 g smör och 2 msk kakao.

Hur mycket av varje sak behövs till 30 chokladbollar?

Problemet handlar om proportionalitet: fler bollar kräver mer av allt, i samma förhållande. Svaret är 6 dl havregryn, 3 dl socker, 150 g smör och 3 msk kakao. Eleverna halverar receptet och lägger ihop, eller tar halva receptet tre gånger. Idén kommer ur Skolverkets Problembank för årskurs 4–6, Chokladbollar.

bollar	havregryn	socker	smör	kakao
20	4 dl	2 dl	100 g	2 msk
10	2 dl	1 dl	50 g	1 msk
30	6 dl	3 dl	150 g	3 msk

↓ hälften
20 och 10 ihop

Så räknade vi havregrynet:
 $4 / 2 = 2$ dl och $4 + 2 = 6$ dl

receptet, 20 bollar

10	10
----	----

30 bollar

10	10	10
----	----	----

3 satser för 10

En sats är halva receptet.

En sats, 10 bollar:

2 dl, 1 dl, 50 g, 1 msk

↓ · 3

$3 \cdot 2 = 6$ dl havregryn

$3 \cdot 1 = 3$ dl socker

$3 \cdot 50 = 150$ g smör

$3 \cdot 1 = 3$ msk kakao

Kontroll: 2 satser är receptet,
 $2 \cdot 2 = 4$ dl havregryn ✓

Lösning A

Lösning B

I passet	
Ringa in	Frågan, talen 20 och 30 bollar, och receptets mått.
Lyft ut	Vi vet: receptet räcker till 20 bollar, med 4 dl havregryn, 2 dl socker, 100 g smör och 2 msk kakao. Vi ska ta reda på: måtten för 30 bollar.
Ord och tal	Visa receptkortet och reda ut vad dl, g och msk betyder. Fråga: Vad räknar 20 och 30?
Förutse	Eleverna gör en tabell med 10 bollar, tar halva receptet tre gånger eller räknar per boll. Någon lägger till 1 på varje mått och får 5 dl havregryn.
Kör de fast	Föreslå: Prova ett enklare problem med färre bollar. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att 10 bollar är hälften av receptet. Försök använda det!
Säg inte	Räkna ut receptet för 10 bollar först. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Bara havregrynet, 2 dl till 10 bollar. Hur mycket till 15 bollar? (3 dl) Större: Hur mycket behövs till 50 bollar? (10 dl havregryn, 5 dl socker, 250 g smör och 5 msk kakao) Hur många bollar räcker 1 kg smör till? (200)
Jämför	Varje 10 bollar kräver en sats, alltså halva receptet. I A lägger eleven en sats till receptet för 20, och i B tar eleven satsen tre gånger.
Fel eller osäker	Ni säger att det blir 5 dl havregryn, en dl till. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med problemet? "Är svaret 6 dl havregryn?" Hur kan ni kontrollera att det svarar på frågan?

CHOKLADBOLLARNA

Gruppen vill göra 30 chokladbollar till klassens fest. Receptet räcker till 20 bollar, och till dem behövs 4 dl havregryn, 2 dl socker, 100 g smör och 2 msk kakao.

Chokladbollar

havregryn

socker

smör

kakao

FRÅGAN

Hur mycket av varje sak behövs till 30 chokladbollar?

CHOKLADBOLLARNA

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

bollar	havregryn	socker	smör	kakao
20	4 dl	2 dl	100 g	2 msk
10	2 dl	1 dl	50 g	1 msk
30	6 dl	3 dl	150 g	3 msk

↓ hälften

20 och 10 ihop

Så räknade vi havregrynet:
 $4 / 2 = 2$ dl och $4 + 2 = 6$ dl

LÖSNING B

receptet, 20 bollar

10	10
----	----

30 bollar

10	10	10
----	----	----

3 satser för 10

En sats är halva
receptet.

En sats, 10 bollar:

2 dl, 1 dl, 50 g, 1 msk

↓ · 3

$3 \cdot 2 = 6$ dl havregryn

$3 \cdot 1 = 3$ dl socker

$3 \cdot 50 = 150$ g smör

$3 \cdot 1 = 3$ msk kakao

Kontroll: 2 satser är receptet,
 $2 \cdot 2 = 4$ dl havregryn ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Hur får eleven i lösning A raden för 30 bollar?
2. Varför tar eleven i lösning B varje mått gånger 3?
3. Var syns satsen för 10 bollar i båda lösningarna?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja för 70 bollar, och varför?

Lärarens sida: Bas, problem 5, Ljusstakarna

Problemlösning i grupp · åk 4–9


Problemet

På ett slott finns 29 ljusstakar. Några av dem har plats för fem ljus, och några har plats för sju ljus. Sammanlagt behövs 187 ljus.

Hur många ljusstakar finns det av varje sort?

Problemet handlar om två okända tal som hänger ihop, antalet femarmade och antalet sjuarmade. Svaret är 8 femarmade och 21 sjuarmade. Eleverna räknar med multiplikation och addition i flera steg och ser att varje byte från femarmad till sjuarmad ger två ljus till. Problemet kommer ur Lithner m.fl. (2025).

femarmade	sjuarmade	ljus ihop	Så räknade vi andra raden:
29	0	145 för få	$19 \cdot 5 = 95$
19	10	165	$10 \cdot 7 = 70$
9	20	185 nästan!	$95 + 70 = 165$
8	21	187 ✓	



Om alla 29 vore femarmade:

$29 \cdot 5 = 145$ ljus
 $\downarrow$
 $187 - 145 = 42$ ljus saknas
 $\downarrow$
 $42 / 2 = 21$ sjuarmade
 $\downarrow$
 $29 - 21 = 8$ femarmade

Kontroll: $8 \cdot 5 + 21 \cdot 7$
 $= 40 + 147 = 187$ ✓


Lösning A

Lösning B


I passet	
Ringa in	Frågan, talen 29 och 187, och orden "fem ljus" och "sju ljus".
Lyft ut	Vi vet: 29 stakar, 187 ljus, fem eller sju ljus i varje. Vi ska ta reda på: hur många av varje sort, två okända tal.
Ord och tal	Peka på bilden och reda ut femarmad och sjuarmad. Fråga: Vad räknar 29, och vad räknar 187?
Förutse	Eleverna prövar antal, ritar stakar, gör en tabell eller tänker sig alla femarmade först. Ett vanligt fel är 26 sjuarmade och 1 femarmad, som bara är 27 stakar.
Kör de fast	Föreslå: Prova hur många av varje sort det kan vara, och räkna ljusen. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att 10 sjuarmade gav 165 ljus och 19 gav 183. Försök använda det!
Säg inte	Börja med 29 femarmade och byt en i taget. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: 8 stakar och 46 ljus (3 sjuarmade). Större: Kan 30 stakar ge 187 ljus? (Nej: $187 - 150 = 37$ är udda) Hur många lösningar finns det, om antalet stakar är fritt? (6: 1, 6, 11, 16, 21 eller 26 sjuarmade)
Jämför	En sjuarmad har två ljus mer än en femarmad. I A ger tio byten 20 ljus, och i B delar eleven de 42 ljusen med 2.
Fel eller osäker	En elev svarade 26 sjuarmade och 1 femarmad. Hur kan ni kontrollera det mot problemet? "Är svaret 187?" Hur kan ni kontrollera att det svarar på frågan?

LJUSSTAKARNA

På ett slott finns 29 ljusstakar. Några av dem har plats för fem ljus, och några har plats för sju ljus. Sammanlagt behövs 187 ljus.



femarmad: 5 ljus



sjuarmad: 7 ljus

FRÅGAN

Hur många ljusstakar finns det av varje sort?


LJUSSTAKARNA

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

femarmade	sjuarmade	ljus ihop	
29	0	145 för få	→ $19 \cdot 5 = 95$
19	10	165	$10 \cdot 7 = 70$
9	20	185 nästan!	$95 + 70 = 165$
8	21	187 ✓	

Så räknade vi
andra raden:



en sjuarmad:
2 ljus till

LÖSNING B

Om alla 29 vore femarmade:

$$29 \cdot 5 = 145 \text{ ljus}$$



$$187 - 145 = 42 \text{ ljus saknas}$$



$$42 / 2 = 21 \text{ sjuarmade}$$



$$29 - 21 = 8 \text{ femarmade}$$

Kontroll: $8 \cdot 5 + 21 \cdot 7$
 $= 40 + 147 = 187$ ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad gör eleven i lösning A från rad till rad?
2. Varför räknar eleven i lösning B $187 - 145$?
3. Var syns det i båda lösningarna att en sjuarmad har två ljus mer än en femarmad?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om det var många fler stakar, och varför?

Lärarens sida: Bas, problem 6, Tornet

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet


Moa bygger ett torn av kuber. Tornet har en stolpe i mitten och en trappa åt fyra håll. Tornet på bilden är 4 kuber högt.

Hur många kuber behövs till tornet på bilden?

Hur många kuber behövs till ett torn som är 5 kuber högt?

Problemet handlar om att dela upp en figur av kuber, och om ett mönster som växer. Svaret är 28 kuber, och 45 när tornet är 5 kuber högt. Eleverna bygger, räknar lager för lager och ser en stolpe och fyra lika trappor. Material: multilinkkuber, 45 per par. Idén kommer ur Hagland, Hedrén och Taflin (2005) och Nämnaren 2024:2.

Lagren uppifrån:




1 + 4 = 5 + 4 = 9 + 4 = 13

$1 + 5 + 9 + 13 = 28$ kuber ✓

Höjden 5: ett lager till med $13 + 4 = 17$,
och $28 + 17 = 45$ kuber ✓

Varje lager har 4 kuber mer än lagret ovanför.



Stolpen: 4 kuber

En trappa: $1 + 2 + 3 = 6$

↓
Fyra trappor: $4 \cdot 6 = 24$

↓
 $4 + 24 = 28$ kuber ✓

Höjden 5: en trappa har

$1 + 2 + 3 + 4 = 10$ kuber, och

$5 \cdot 4 \cdot 10 = 45$ kuber ✓


Lösning A

Lösning B

I passet	
Ringa in	Frågorna, talen 4 och 5, och orden stolpe, trappa och "åt fyra håll".
Lyft ut	Vi vet: stolpen i mitten är 4 kuber hög, och fyra trappor går åt var sitt håll. Vi ska ta reda på: antalet kuber, när tornet är 4 och 5 kuber högt.
Ord och tal	Peka på stolpen och en trappa, och reda ut "åt fyra håll". Fråga: Vad räknar 4 och 5? Hur många trappor finns det?
Förutse	Eleverna bygger med kuber, räknar lager eller räknar stolpen och trapporna var för sig. Någon räknar bara de kuber som syns.
Kör de fast	Föreslå: Bygg tornet med kuber och dela upp det. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att alla fyra trapporna är lika. Försök använda det!
Säg inte	Räkna stolpen för sig, räkna en trappa och ta den fyra gånger. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Ett torn som är 2 kuber högt, och sedan 3 (6 och 15 kuber). Större: Hur många kuber behövs till ett torn som är 10 kuber högt? (190) Hur kan ni räkna utan att bygga? (Stolpen och fyra trappor med 45 kuber var: $10 + 4 \cdot 45 = 190$)
Jämför	De fyra trapporna är lika. I A har varje lager 4 kuber mer än lagret ovanför, en i varje trappa, och i B tar eleven en trappa 4 gånger.
Fel eller osäker	Ni säger att det blir 13 kuber. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med problemet? Ni säger $4 \cdot 10 = 40$ kuber till tornet som är 5 högt. Hur kan ni kontrollera det med tornet ni har byggt?

TORNET

Moa bygger ett torn av kuber. Tornet har en stolpe i mitten och en trappa åt fyra håll. Tornet på bilden är 4 kuber högt.



tornet, 4 kuber högt

FRÅGORNA


1. Hur många kuber behövs till tornet på bilden?
2. Hur många kuber behövs till ett torn som är 5 kuber högt?

TORNET

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

Lagren uppifrån:




Varje lager har 4 kuber mer än lagret ovanför.

$$1 + 5 + 9 + 13 = 28 \text{ kuber} \quad \checkmark$$

Höjden 5: ett lager till med $13 + 4 = 17$,
och $28 + 17 = 45$ kuber $\checkmark$

LÖSNING B



Stolpen: 4 kuber

En trappa: $1 + 2 + 3 = 6$



Fyra trappor: $4 \cdot 6 = 24$



$4 + 24 = 28$ kuber $\checkmark$

Höjden 5: en trappa har

$1 + 2 + 3 + 4 = 10$ kuber, och

$5 + 4 \cdot 10 = 45$ kuber $\checkmark$

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad räknar eleven i lösning A i varje lager, och hur växer lagren?
2. Varför räknar eleven i lösning B en trappa och tar den fyra gånger?
3. Var syns det i båda lösningarna att de fyra trapporna är lika?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja för ett torn som är 10 kuber högt, och varför?

Lärarens sida: Bas, problem 7, Matcherna

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

Fyra lag spelar bandy i en turnering. Varje lag spelar en match mot vart och ett av de andra lagen.

Hur många matcher blir det i turneringen?

Hur många matcher blir det, om 6 lag är med?

Problemet handlar om kombinatorik: hur många par som går att bilda av några lag. Svaret är 6 matcher med 4 lag och 15 matcher med 6 lag. Eleverna listar i ordning, ritar och ser att samma match inte ska räknas två gånger. Idén kommer ur Skolverkets Problembank för årskurs 4–6, Bandy.

6 lag:


AB AC AD AE AF	5
BC BD BE BF	4
CD CE CF	3
DE DF	2
EF	1

$5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$ ✓
matcher

4 lag:

AB AC AD
BC BD
CD

$3 + 2 + 1 = 6$ ✓



Varje lag har 5 streck:

$$6 \cdot 5 = 30$$

↓
Varje streck har två lag,
så det är räknat två gånger:

$$30 / 2 = 15 \text{ matcher} \checkmark$$

4 lag: $4 \cdot 3 = 12$
och $12 / 2 = 6 \text{ matcher} \checkmark$

Lösning A

Lösning B

I passet	
Ringa in	Frågorna, talen fyra och 6, och orden "varje lag", "en match" och "vart och ett".
Lyft ut	Vi vet: 4 lag, och varje lag spelar en match mot vart och ett av de andra lagen. Vi ska ta reda på: antalet matcher med 4 lag och med 6 lag.
Ord och tal	Reda ut turnering och match. Peka på prickarna och strecket: varje prick är ett lag, och strecket en match. Fråga: Vad räknar 4 och 6?
Förutse	Parerna listar matcherna, ritar prickar med streck eller gör ett schema. Någon räknar lag A mot lag B och lag B mot lag A som två matcher.
Kör de fast	Föreslå: Skriv upp matcherna i en ordning, så att ingen saknas. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att lag A spelar 3 matcher. Försök använda det!
Säg inte	Varje match räknas två gånger, så dela med 2. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: 3 lag, och sedan 4 lag (3 och 6 matcher). Större: Hur många matcher blir det med 10 lag? (45) Hur många lag är med, om det blir 28 matcher? (8)
Jämför	Varje match är ett par lag, som bara räknas en gång. I lösning A står varje par en gång i listan, och i lösning B delas 30 med 2.
Fel eller osäker	Ni säger att det blir 12 matcher. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med problemet? Ni säger att ni har alla 15. Hur kan ni kontrollera att ingen match saknas?

MATCHERNA

Fyra lag spelar bandy i en turnering. Varje lag spelar en match mot vart och ett av de andra lagen.



FRÅGORNA

1. Hur många matcher blir det i turneringen?
2. Hur många matcher blir det, om 6 lag är med?

MATCHERNA

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

6 lag:

AB AC AD AE AF	5
BC BD BE BF	4
CD CE CF	3
DE DF	2
EF	1

$$5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15 \quad \checkmark$$


matcher

4 lag:

AB AC AD
BC BD
CD

$$3 + 2 + 1 = 6 \quad \checkmark$$

LÖSNING B



Varje lag har 5 streck:

$$6 \cdot 5 = 30$$



Varje streck har två lag,
så det är räknat två gånger:



$$30 / 2 = 15 \text{ matcher } \checkmark$$

$$4 \text{ lag: } 4 \cdot 3 = 12$$

$$\text{och } 12 / 2 = 6 \text{ matcher } \checkmark$$

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Varför skriver eleven i lösning A en match mindre på varje rad?
2. Varför delar eleven i lösning B 30 med 2?
3. Var syns det i båda lösningarna att lag A mot lag B och B mot A är samma match?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med 10 lag, och varför?

Lärarens sida: Bas, problem 8, Tärningarna

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet


Sam och Ida kastar två vanliga tärningar, med 1 till 6 prickar. De lägger ihop prickarna och får kastets summa. Kastet på bilden har summan $4 + 6 = 10$.

Vilken summa kommer oftast, om de kastar många gånger?

Hur kan ni visa att det är så?

Problemet handlar om chans: varför vissa summor kommer oftare än andra. Svaret är 7, som kommer i 6 av 36 utfall. Eleverna kastar, för streck och listar alla utfall, och ser att $3 + 4$ och $4 + 3$ är olika. Material: två tärningar i olika färg per par. Idén kommer ur Skolverkets Problembank för årskurs 4–6, Tärningar, och nr 11.

Vi kastade 36 gånger:



Lösning A

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Alla utfall:
 $6 \cdot 6 = 36$
 ↓
 7 står 6 gånger
 6 och 8 står 5 gånger
 2 och 12 står 1 gång


Kontroll: 7 blir
 $1 + 6, 2 + 5, 3 + 4,$
 $4 + 3, 5 + 2$ och $6 + 1$ ✓

Lösning B

I passet	
Ringa in	Frågorna och orden "två tärningar", "lägger ihop", summa och oftast.
Lyft ut	Vi vet: två tärningar med 1 till 6 prickar, och summan är prickarna ihop. Vi ska ta reda på: vilken summa som kommer oftast, och varför.
Ord och tal	Reda ut summa med kastet på bilden, och vad oftast betyder. Fråga: Vilka summor kan ni få? Vilken är minst och vilken störst?
Förutse	Paren kastar och för streck, listar eller gör en tabell. Någon tror att alla summor är lika vanliga. I 36 kast får ofta en annan summa än 7 flest streck.
Kör de fast	Föreslå: Kasta tärningarna och skriv upp summorna. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att 7 kan bli $1 + 6$ och $2 + 5$. Försök använda det!
Säg inte	$3 + 4$ och $4 + 3$ är olika kast, så räkna båda. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Två högar med korten 1, 2 och 3, och ett kort ur varje (4 är vanligast). Större: Vilka summor är lika vanliga? (Summor lika långt från 7, som 6 och 8) Vilken skillnad kommer oftast, det större talet minus det mindre? (1, i 10 av 36)
Jämför	7 kan bli på flest sätt, 6 av 36 i B. Jämför kasten i A och gruppens kast med de 36 utfallen. Med fler kast får 7 oftast flest streck, men det är inte säkert.
Fel eller osäker	Ni säger att 6, 7 och 8 går på 3 sätt var. Hur kan ni kontrollera det med en vit och en grå tärning? "Är 7 rätt?" Hur kan ni kontrollera det mot problemet?

TÄRNINGARNA

Sam och Ida kastar två vanliga tärningar, med 1 till 6 prickar. De lägger ihop prickarna och får kastets summa. Kastet på bilden har summan $4 + 6 = 10$.



$$4 + 6 = 10$$

FRÅGORNA


1. Vilken summa kommer oftast, om de kastar många gånger?
2. Hur kan ni visa att det är så?

TÄRNINGARNA

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

Vi kastade 36 gånger:



LÖSNING B

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Alla utfall:

$$6 \cdot 6 = 36$$



7 står 6 gånger

6 och 8 står 5 gånger

2 och 12 står 1 gång

Kontroll: 7 blir

$1 + 6, 2 + 5, 3 + 4,$

$4 + 3, 5 + 2$ och $6 + 1$ ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad gör eleven i lösning A, och vad visar strecken?
2. Varför står både $3 + 4$ och $4 + 3$ i tabellen i lösning B?
3. Var syns det i båda lösningarna att 7 är vanligast, och vilken visar varför?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med tre tärningar, och varför?

Lärarens sida: Bas, problem 9, Parken

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

Nora och Elias går runt var sin park. Noras park är en kvadrat med sidan 50 m. Elias park är en rektangel som är 100 m lång och 50 m bred. De börjar samtidigt i punkten A, där parkerna möts, och går lika fort.

Hur många meter är det runt varje park?

Hur många varv har var och en gått, när de möts i A igen för första gången?


Problemet handlar om omkrets och om när två varv av olika längd går jämnt ut, vilket är idén bakom gemensamma multiplar. Parkerna är 200 m och 300 m runt. De möts i A efter 600 m, när Nora har gått 3 varv och Elias 2. Eleverna räknar omkretsen och hoppar på tallinjer. Idén kommer ur Känguru 2022, Ecolier nr 22.

Nora: $50 + 50 + 50 + 50 = 200$ m

Elias: $100 + 50 + 100 + 50 = 300$ m

varv	Nora	Elias	
1	200 m	300 m	Båda har gått 600 m och är i A.
2	400 m	600 m	
3	600 m	900 m	Nora: 3 varv ✓ Elias: 2 varv ✓

Runt: $4 \cdot 50 = 200$ m och $2 \cdot 100 + 2 \cdot 50 = 300$ m




Lösning A

Lösning B

I passet	
Ringa in	Frågorna, måtten 50 m och 100 m, och orden runt, samtidigt, "lika fort" och "i A igen".
Lyft ut	Vi vet: sidorna 50 m och 100 m, och att de går samtidigt och lika fort från A. Vi ska ta reda på: hur långt det är runt, och varven när de möts i A.
Ord och tal	Reda ut runt, varv och samtidigt. Följ en park runt med fingret från A. Fråga: Vad står 50 och 100 för?
Förutse	Paren räknar omkretsen först, gör en tabell med meter, följer bilden bit för bit eller hoppar på en tallinje. Någon svarar 2, som bara är Elias varv.
Kör de fast	Föreslå: Följ parkerna på bilden, en bit i taget. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att Nora är tillbaka i A efter 200 m. Försök använda det!
Säg inte	De möts när båda har gått 600 m. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Parkerna är 20 m och 30 m runt (de möts efter 60 m, 3 och 2 varv). Större: Om Elias park är 150 m lång och 100 m bred, när möts de i A då? (Efter 1 000 m: 5 och 2 varv)
Jämför	De möts i punkten A när båda har gått hela varv och lika långt. I lösning A står 600 i båda kolumnerna, och i lösning B landar bådas hopp på 600.
Fel eller osäker	Ni säger att Noras park är 50 m runt. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med problemet? "Är svaret 2 varv?" Hur kan ni kontrollera att det svarar på frågan?

PARKEN

Nora och Elias går runt var sin park. Noras park är en kvadrat med sidan 50 m. Elias park är en rektangel som är 100 m lång och 50 m bred. De börjar samtidigt i punkten A, där parkerna möts, och går lika fort.



FRÅGORNA

1. Hur många meter är det runt varje park?
2. Hur många varv har var och en gått, när de möts i A igen för första gången?

PARKEN

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

Nora: $50 + 50 + 50 + 50 = 200$ m

Elias: $100 + 50 + 100 + 50 = 300$ m

varv	Nora	Elias
1	200 m	300 m
2	400 m	600 m
3	600 m	900 m


Båda har gått
600 m och är i A.

Nora: 3 varv ✓

Elias: 2 varv ✓

LÖSNING B

Runt: $4 \cdot 50 = 200$ m och $2 \cdot 100 + 2 \cdot 50 = 300$ m



Nora: $600 / 200 = 3$ varv

Elias: $600 / 300 = 2$ varv ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad skriver eleven i lösning A på varje rad i tabellen?
2. Varför letar eleven i lösning B efter det första talet där båda landar?
3. Var syns 600 m i båda lösningarna, och varför möts de i A just då?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om parkerna var 400 m och 600 m runt, och varför?

Lärarens sida: Bas, problem 10, Vågen

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

Lina har tre klossar: en rektangel, en cirkel och en triangel. Hon väger två klossar i taget. Rektangeln och cirkeln väger 200 g. Triangeln och cirkeln väger 100 g. Rektangeln och triangeln väger 240 g.

Hur mycket väger alla tre klossarna tillsammans?

Hur mycket väger varje kloss?

Problemet handlar om likheter: tre okända vikter som hänger ihop två och två. Svaret är 270 g, och rektangeln väger 170 g, cirkeln 30 g och triangeln 70 g. Eleverna lägger ihop och jämför vägningar, och ser att varje kloss står på två vågar. Idén kommer ur Känguru 2024, Ecolier nr 19.

$$\begin{array}{rcl}
 \square \bigcirc & 200 \text{ g} \\
 \triangle \bigcirc & 100 \text{ g} \\
 + \square \triangle & 240 \text{ g} \\
 \hline
 \square \square \bigcirc \triangle \triangle & 540 \text{ g} \\
 200 + 100 + 240 = 540 \text{ g} \\
 \text{Varje kloss är med} \\
 \text{två gånger.}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \text{Alla tre:} \\
 540 / 2 = 270 \text{ g} \quad \checkmark \\
 \downarrow \\
 \text{Varje kloss:} \\
 \text{cirkeln } 270 - 240 = 30 \text{ g} \\
 \text{triangeln } 270 - 200 = 70 \text{ g} \\
 \text{rektangeln } 270 - 100 = 170 \text{ g}
 \end{array}$$



$$\begin{array}{l}
 \text{Båda vågar med cirkeln:} \\
 200 - 100 = 100 \text{ g} \\
 \text{mer för rektangeln} \\
 \downarrow \\
 240 - 100 = 140 \text{ g} \\
 \text{är två trianglar} \\
 \downarrow \\
 140 / 2 = 70 \text{ g triangeln} \\
 70 + 100 = 170 \text{ g rektangeln} \\
 100 - 70 = 30 \text{ g cirkeln}
 \end{array}$$

$$\text{Alla tre: } 170 + 70 + 30 = 270 \text{ g} \quad \checkmark$$


Lösning A

Lösning B

I passet	
Ringa in	Frågorna, talen 200, 100 och 240, och orden "två i taget", "alla tre" och "varje kloss".
Lyft ut	Vi vet: rektangel och cirkel 200 g, triangel och cirkel 100 g, rektangel och triangel 240 g. Vi ska ta reda på: alla tre ihop, och varje kloss.
Ord och tal	Visa rektangeln, cirkeln och triangeln på bilden, och vågarna, som visar två klossar ihop. Fråga: Vad väger 200 g?
Förutse	Paren prövar vikter, jämför vågarna två och två eller lägger ihop allt först. Någon svarar 540 g.
Kör de fast	Föreslå: Gissa vad cirkeln väger, och pröva gissningen på vågarna. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att rektangeln väger 100 g mer än triangeln. Försök använda det!
Säg inte	Lägg ihop vågarna, så är varje kloss med två gånger. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Vågarna visar 50 g, 30 g och 60 g (70 g, rektangeln 40, cirkeln 10 och triangeln 20). Större: Vågarna visar 300 g, 200 g och 300 g. Vad väger alla tre, och varje kloss? (400 g, rektangeln 200 och de andra 100 var)
Jämför	Varje kloss står på två vågar. I A är därför 540 g två av varje kloss, och i B ger de två vågarna med cirkeln skillnaden 100 g.
Fel eller osäker	Ni säger att alla tre väger 540 g. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med problemet? "Väger cirkeln 30 g?" Hur kan ni kontrollera det på alla tre vågarna?

VÅGEN

Lina har tre klossar: en rektangel, en cirkel och en triangel. Hon väger två klossar i taget. Rektangeln och cirkeln väger 200 g. Triangeln och cirkeln väger 100 g. Rektangeln och triangeln väger 240 g.



FRÅGORNA

1. Hur mycket väger alla tre klossarna tillsammans?
2. Hur mycket väger varje kloss?

VÅGEN

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

 	200 g
 	100 g
+  	240 g
     	540 g

$200 + 100 + 240 = 540 \text{ g}$

Varje kloss är med två gånger.

Alla tre:
 $540 / 2 = 270 \text{ g} \quad \checkmark$

↓

Varje kloss:
 cirkeln $270 - 240 = 30 \text{ g}$
 triangeln $270 - 200 = 70 \text{ g}$
 rektangeln $270 - 100 = 170 \text{ g}$

LÖSNING B



Båda vågar med cirkeln:

$200 - 100 = 100 \text{ g}$
 mer för rektangeln

↓
 $240 - 100 = 140 \text{ g}$
 är två trianglar

↓
 $140 / 2 = 70 \text{ g triangeln}$
 $70 + 100 = 170 \text{ g rektangeln}$
 $100 - 70 = 30 \text{ g cirkeln}$

Alla tre: $170 + 70 + 30 = 270 \text{ g} \quad \checkmark$

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad lägger eleven ihop i lösning A, och vad är 540 g?
2. Varför räknar eleven i lösning B $200 - 100$?
3. Var syns det i båda lösningarna att varje kloss står på två vågar?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med fyra klossar, och varför?

Lärarens sidor: Medel

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Här står de tio problemen på nivån Medel, som ligger nära åk 6–7, i den ordning gruppen tar dem. Varje problem har lärarens sida, problemets sida och bladet Två lösningar.

Problemet	Matematiken	Lösning A	Lösning B
1. Glasspinnarna	trianglar, och att hitta alla	Rita eller bygg: lägg och sortera trianglar	Gör en lista efter benen
2. Borden	mönster och uttryck	Gör en tabell: 4 platser till per bord	Skriv ett uttryck: 4 per bord och ändarna
3. Kulpåsarna	chans som andel	andelen blå i varje påse	röda på varje blå
4. Bollbytet	proportionalitet, flera svar	Gör en tabell: golfbollar som byts mot tennisbollar	Tänk dig att alla är av samma sort: byt allt mot pingis först
5. Tangrammet	area och bråk	Rita eller bygg: lägg bitarna på varandra	Rita eller bygg: 16 små trianglar
6. Skolan	bråk, procent och delbarhet	Pröva och förbättra i en tabell	delbart med 3 och med 5, alltså med 15
7. Samlarbilderna	medelvärde, median och typvärde	Pröva och förbättra: fem tal i ordning	börja med de tal som måste stå
8. Klädaffären	likheter och byten	räkna allt i kepsar	välj ett pris på en keps
9. Pantpengarna	bråk av det som är kvar	Räkna baklänges med staplar	Pröva och förbättra i en tabell
10. Smörgåsarna	bråk och rättvis delning	Rita eller bygg: smörgåsar i tredjedelar	räkna med bråk

Så använder du problemen

Ordningen	Ta problemen i ordning, ett per pass, och byt ordning när gruppen behöver arbeta med ett annat område eller ett problem som liknar det förra. De första är lättast att börja på.
Kopiorna	Kopiera problemets sida till varje par, eller visa den på tavlan. I Jämföra får varje par bladet Två lösningar, med B under ett papper tills gruppen har sagt vad A gör.

© Niclas Fohlin. Ur Problemlösning i grupp, <https://niclasfohlin.se/stodundervisning/problemlosning-i-grupp>.

Lärarens sida: Medel, problem 1, Glasspinnarna

Problemlösning i grupp · åk 4–9


Problemet

Lisa har 12 glasspinnar som är lika långa. Hon lägger likbenta trianglar på bordet, en i taget, och behöver inte använda alla pinnar. Varje sida är en eller flera hela pinnar. En liksidig triangel räknas också som likbent.

Hur många olika likbenta trianglar kan Lisa lägga?

Hur kan ni vara säkra på att ni har hittat alla?

Problemet handlar om trianglar och om att veta att man har hittat alla. Svaret är 15 likbenta trianglar, och fyra av dem är liksidiga. Eleverna prövar när tre sidor går ihop till en triangel och ordnar sina trianglar så att ingen saknas eller räknas två gånger. Material: glasspinnar, 12 per par. Idén kommer ur Nämnaren 2025:4, problem 4490.



Gick inte:

2, 2, 4
blev platt

5, 5, 3
 $5 + 5 + 3 = 13$
för många

$$1 + 3 + 5 + 4 + 2 = 15 \quad \checkmark$$

Lösning A

Basen är kortare än benen tillsammans.

Alla pinnar ihop: högst 12.

ben	basen kan vara	antal
1	1	1
2	1, 2, 3	3
3	1, 2, 3, 4, 5	5
4	1, 2, 3, 4	4
5	1, 2	2
6	ingen	0

Ben 4:

$$\begin{aligned} \rightarrow 4 + 4 &= 8 \\ 12 - 8 &= 4 \\ \text{basen högst } 4 \end{aligned}$$

$$1 + 3 + 5 + 4 + 2 = 15 \quad \checkmark$$


Lösning B

I passet

Ringa in	Frågorna, talet 12, och orden likbent, liksidig, "hela pinnar" och olika.
Lyft ut	Vi vet: 12 lika långa pinnar, minst två sidor lika långa, hela pinnar. Vi ska ta reda på: hur många olika trianglar, och hur vi vet att vi har alla.
Ord och tal	Reda ut likbent, ben och bas med bilden, och visa den som inte går ihop. Fråga: Vad räknar 12? Är 3, 3, 2 och 2, 3, 3 olika?
Förutse	Paren lägger och ritar pinnar, gör en lista utan ordning eller en tabell efter benen. Någon räknar 2, 2, 4, fast den blir platt.
Kör de fast	Föreslå: Lägg en triangel och skriv upp sidorna. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att 2, 2, 4 blev platt. Försök använda det!
Säg inte	Gå igenom benen från 1 till 5, och låt basen vara kortare än benen tillsammans. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Högst 6 pinnar (3 trianglar). Större: Hur många trianglar går med högst 12 pinnar, om sidorna får vara olika långa? (18, de 15 likbenta och 3 till) Hur många likbenta går med högst 20 pinnar? (45)
Jämför	Basen är kortare än benen tillsammans, och pinnarna är högst 12. A hittar villkoren genom att bygga, och B skriver dem som en regel. Ordningen efter benen visar att ingen saknas.
Fel eller osäker	Ni säger att 3, 3, 2 och 2, 3, 3 är två trianglar. Hur kan ni kontrollera det med pinnarna? "Är det alla nu?" Hur kan ni kontrollera att ingen saknas?

GLASSPINNARNA

Lisa har 12 glasspinnar som är lika långa. Hon lägger likbenta trianglar på bordet, en i taget, och behöver inte använda alla pinnar. Varje sida är en eller flera hela pinnar. En liksidig triangel räknas också som likbent.



en likbent triangel



går inte ihop


FRÅGORNA

1. Hur många olika likbenta trianglar kan Lisa lägga?
2. Hur kan ni vara säkra på att ni har hittat alla?

GLASSPINNARNA

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A



Gick inte:

2, 2, 4
blev platt

5, 5, 3
 $5 + 5 + 3 = 13$
för många

$$1 + 3 + 5 + 4 + 2 = 15 \quad \checkmark$$

LÖSNING B

Basen är kortare än benen tillsammans.

Alla pinnar ihop: högst 12.

ben	basen kan vara	antal
1	1	1
2	1, 2, 3	3
3	1, 2, 3, 4, 5	5
4	1, 2, 3, 4	4
5	1, 2	2
6	ingen	0

Ben 4:

→ $4 + 4 = 8$
 $12 - 8 = 4$
 basen högst 4

$$1 + 3 + 5 + 4 + 2 = 15 \quad \checkmark$$

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Hur sorterar eleven triangelarna i lösning A?
2. Varför skriver eleven i lösning B att basen är högst 4 när benen är 4?
3. Var syns det i båda lösningarna att basen måste vara kortare än benen tillsammans?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med 30 pinnar, och varför?

Lärarens sida: Medel, problem 2, Borden

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

I matsalen står sexkantiga bord i en lång rad. Två bord som står bredvid varandra delar en sida. Vid varje fri sida får en person sitta.

Hur många personer får plats vid 10 bord?

Hitta en regel som gäller för alla antal bord.

Problemet handlar om ett mönster som växer lika mycket för varje bord. Vid 10 bord får 42 personer plats, och vid n bord $4 \cdot n + 2$. Eleverna ser mönstret i en tabell och i bilden och skriver en regel med ord eller med n . Idén kommer ur Nämnaren 2025:2, problem 4476.


bord	personer
1	6
2	10
3	14
4	18
5	22

Från 1 till 10 bord är 9 steg med +4:

↓ +4
↓ +4
↓ +4
↓ +4

6 + 9 · 4 = 42 ✓

Regel: 6, och sedan 4 till för varje bord.



Varje bord: 4 platser, 2 uppe och 2 nere.

Äändarna: 1 + 1.

$$10 \text{ bord: } 4 \cdot 10 + 2 = 42 \checkmark$$

$$n \text{ bord: } 4 \cdot n + 2$$




Lösning A

Lösning B

I passet	
Ringa in	Frågorna, talet 10, och orden sexkantiga, "delar en sida" och "fri sida".
Lyft ut	Vi vet: sexkantiga bord i rad, två bord delar en sida, en person vid varje fri sida. Vi ska ta reda på: hur många vid 10 bord, och en regel.
Ord och tal	Reda ut sexkantig och fri sida med bilden. Fråga: Vad räknar 10, och vad räknar prickarna?
Förutse	Paren ritar bord, gör en tabell med 6, 10 och 14 eller ser 4 vid varje bord. Någon räknar $10 \cdot 6 = 60$ eller glömmer ändarna.
Kör de fast	Föreslå: Rita platserna vid tre bord och räkna dem. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att det blir 4 fler för varje bord. Försök använda det!
Säg inte	Varje bord har fyra platser, och så kommer en i varje ände. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: 4 bord (18 personer). Större: Kan en rad bord ha exakt 100 platser? (Nej: 24 bord ger 98 och 25 bord 102) Hur många bord behövs för en klass med 27 elever? (7, eftersom 6 bord ger 26)
Jämför	Varje nytt bord ger fyra platser till, två uppe och två nere. I A syns det som +4 i tabellen, och i B som 4 vid varje bord.
Fel eller osäker	Ni säger att 10 bord ger dubbelt så många som 5 bord, alltså 44. Hur kan ni kontrollera det mot bilden? "Stämmer regeln?" Hur kan ni kontrollera den med 3 bord?

BORDEN

I matsalen står sexkantiga bord i en lång rad. Två bord som står bredvid varandra delar en sida. Vid varje fri sida får en person sitta.



FRÅGORNA

1. Hur många personer får plats vid 10 bord?
2. Hitta en regel som gäller för alla antal bord.

BORDEN

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

bord	personer
1	6
2	10
3	14
4	18
5	22


↓ +4
↓ +4
↓ +4
↓ +4

Från 1 till 10 bord
är 9 steg med +4:

$$6 + 9 \cdot 4 = 42 \checkmark$$

Regel: 6, och sedan
4 till för varje bord.

LÖSNING B



$$4 + 4 + 4 + 2 = 14$$

Varje bord: 4 platser,
2 uppe och 2 nere.

Ändarna: 1 + 1.

$$10 \text{ bord: } 4 \cdot 10 + 2 = 42 \checkmark$$

$$n \text{ bord: } 4 \cdot n + 2$$

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad gör eleven i lösning A från rad till rad?
2. Varför lägger eleven i lösning B till 2 efter $4 \cdot 10$?
3. Var syns det i båda lösningarna att varje nytt bord ger fyra platser till?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja för 100 bord, och varför?

Lärarens sida: Medel, problem 3, Kulpåsarna

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

I tre påsar finns röda och blå kulor. Påse A har 80 röda och 20 blå. Påse B har 30 röda och 10 blå. Påse C har 45 röda och 5 blå. Du tar en kula ur en påse utan att titta.

Vilken påse ger störst chans att få en blå kula, och varför?

Problemet handlar om chans som en andel av alla kulor. Svaret är påse B, där $1/4$ av kulorna är blå. Eleverna jämför andelar som bråk eller procent, eller röda mot blå, och ser att flest blå inte ger störst chans. Idén kommer ur Problembanken åk 7–9, problem 11, Kulpåsen.

påse	blå	alla	andel blå
A	20	100	20 %
B	10	40	25 %
C	5	50	10 %

Så räknade vi påse B:
 $30 + 10 = 40$
 $10 / 40 = 1/4$
 $1/4 = 25/100$
 alltså 25 %

Hur många röda på varje blå? ● blå ○ röd

A: $80 / 20 = 4$ ● ○ ○ ○ ○

B: $30 / 10 = 3$ ● ○ ○ ○

C: $45 / 5 = 9$ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

25 % är störst: påse B. ✓

Färre röda på varje blå ger större chans.
 Påse B är bäst. ✓

Lösning A

Lösning B

I passet	
Ringa in	Frågan, talen för varje påse, och orden chans och "blå kula".
Lyft ut	Vi vet: hur många röda och blå kulor det finns i varje påse. Vi ska ta reda på: vilken påse som ger störst chans för blå, och varför.
Ord och tal	Visa bilden. Fråga: Vad betyder chans? Vad räknar 20 i påse A, och hur många kulor finns det i den?
Förutse	Bråk eller procent av alla kulor, röda mot blå, eller kulor som ritas. Några väljer påse A, för den har flest blå.
Kör de fast	Föreslå: Gör en tabell med det ni vet om varje påse. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att A har 100 kulor och 20 blå. Försök använda det!
Säg inte	Räkna hur stor del av alla kulor som är blå. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Påse A har 8 röda och 2 blå, påse B 3 och 1, och påse C 9 och 1 (påse B). Större: Hur många blå måste ni lägga i påse C för att den ska ge samma chans som påse B? (10, så att 15 av 60 är blå)
Jämför	Chansen beror på hur många röda det finns för varje blå. I A räknar eleven andelen av alla, i B röda på varje blå, och båda ger påse B.
Fel eller osäker	Ni säger att påse A är bäst, för den har flest blå. Hur kan ni kontrollera det mot problemet? Ni säger att påse B är bäst, för den har minst röda. Hur vet ni att det räcker?

KULPÅSARNA

I tre påsar finns röda och blå kulor. Påse A har 80 röda och 20 blå. Påse B har 30 röda och 10 blå. Påse C har 45 röda och 5 blå. Du tar en kula ur en påse utan att titta.



påse A



påse B



påse C

FRÅGAN

Vilken påse ger störst chans att få en blå kula, och varför?

KULPÅSARNA

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

påse	blå	alla	andel blå
A	20	100	20 %
B	10	40	25 %
C	5	50	10 %

Så räknade vi påse B:
 $30 + 10 = 40$
 $10 / 40 = 1/4$
 $1/4 = 25/100$
 alltså 25 %

25 % är störst: påse B. ✓

LÖSNING B

Hur många röda på varje blå?

● blå ○ röd

A: $80 / 20 = 4$

● ○ ○ ○ ○

B: $30 / 10 = 3$

● ○ ○ ○

C: $45 / 5 = 9$

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Färre röda på varje blå ger större chans.

Påse B är bäst. ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad räknar eleven ut för varje påse i lösning A?
2. Varför delar eleven i lösning B de röda med de blå?
3. Var syns det i båda lösningarna att påse B är bäst, fast påse A har fler blå?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om talen inte gick att dela jämnt, och varför?

Lärarens sida: Medel, problem 4, Bollbytet

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

Omar har 26 golfbollar och vill byta bort alla. Han kan byta 3 golfbollar mot 5 tennisbollar, och 2 golfbollar mot 7 pingisbollar.

Hur många tennisbollar och pingisbollar kan Omar få?

Det finns flera svar. Hitta alla.

Problemet har flera svar, och båda bytena ska gå jämnt ut. Omar kan få 0, 10, 20, 30 eller 40 tennisbollar, med 91, 70, 49, 28 eller 7 pingisbollar. Eleverna arbetar systematiskt med multiplikation och division, så att inget svar saknas. Material: klossar eller kuber, 26 per par. Idén kommer ur Hagland, Hedrén och Taflin (2005).

till tennis	kvar	tennis	pingis
0	26	0	91 ✓
3	23	–	–
6	20	10	70 ✓
9	17	–	–
12	14	20	49 ✓
15	11	–	–
18	8	30	28 ✓
21	5	–	–
24	2	40	7 ✓

Så räknade vi raden med 6:
 $6 / 3 = 2$ byten
 $2 \cdot 5 = 10$ tennis
 $20 / 2 = 10$ byten
 $10 \cdot 7 = 70$ pingis

→

Alla till pingis: $26 / 2 = 13$ byten

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

$13 \cdot 7 = 91$ pingis

Flytta 6: tre tvåor blir två treor.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

$2 \cdot 5 = 10$ tennis och $10 \cdot 7 = 70$ pingis

Varje gång: 21 pingis färre, 10 tennis fler.

tennis: 0 10 20 30 40

pingis: 91 70 49 28 7 5 sätt ✓

Lösning A


Lösning B

I passet

Ringa in	Frågorna, talen 26, 3, 5, 2 och 7, och orden byta och alla.
Lyft ut	Vi vet: 3 golfbollar ger 5 tennisbollar, 2 golfbollar ger 7 pingisbollar, Omar byter alla 26. Vi ska ta reda på: hur många av varje, och alla sätt.
Ord och tal	Peka på bilden vid ordet byta. Fråga: Vad räknar 3, och vad räknar 5? Får Omar ta bara pingisbollar?
Förutse	En tabell, bollar som ritas, eller alla till pingis först. Några hittar ett svar och slutar.
Kör de fast	Föreslå: Välj hur många golfbollar Omar byter mot tennisbollar. Hur många blir kvar till pingis? Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att det inte går med 23 kvar. Försök använda det!
Säg inte	Golfbollarna till tennis ökar med 6 åt gången. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: 10 golfbollar (0 tennis och 35 pingis, eller 10 och 14). Större: Kan Omar få lika många tennisbollar som pingisbollar? (Nej, inget av de fem sätten) Vad kan han få för 50 golfbollar? (9 sätt, från 0 och 175 till 80 och 7)
Jämför	Två treor är sex, och det som blir kvar ska gå att dela med 2. I A syns det i varannan rad, och i B när eleven flyttar 6 golfbollar.
Fel eller osäker	Ni säger att det går att byta 9 golfbollar mot tennisbollar. Hur kan ni kontrollera det mot problemet? "Är det alla sätt?" Hur kan ni kontrollera att inget saknas?

BOLLBYTET

Omar har 26 golfbollar och vill byta bort alla.
Han kan byta 3 golfbollar mot 5 tennisbollar, och
2 golfbollar mot 7 pingisbollar.



Omars golfbollar

● golfbollar $\xrightarrow{\text{byts mot}}$ ● tennisbollar

● golfbollar $\xrightarrow{\text{byts mot}}$ ○ pingisbollar

FRÅGORNA

1. Hur många tennisbollar och pingisbollar kan Omar få?
2. Det finns flera svar. Hitta alla.

BOLLBYTET

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

till tennis	kvar	tennis	pingis	
0	26	0	91 ✓	Så räknade vi raden med 6:
3	23	–	–	$6 / 3 = 2$ byten
6	20	10	70 ✓	→ $2 \cdot 5 = 10$ tennis
9	17	–	–	$20 / 2 = 10$ byten
12	14	20	49 ✓	$10 \cdot 7 = 70$ pingis
15	11	–	–	23 kvar är udda, det går inte.
18	8	30	28 ✓	
21	5	–	–	
24	2	40	7 ✓	5 sätt ✓

LÖSNING B

Alla till pingis: $26 / 2 = 13$ byten

□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□

$13 \cdot 7 = 91$ pingis

Flytta 6: tre tvåor blir två treor.

□□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□

$2 \cdot 5 = 10$ tennis och $10 \cdot 7 = 70$ pingis

Varje gång: 21 pingis färre, 10 tennis fler.

tennis: 0 10 20 30 40

pingis: 91 70 49 28 7 5 sätt ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Hur väljer eleven raderna i lösning A, och varför går bara varannan rad?
2. Varför flyttar eleven i lösning B 6 golfbollar i taget från pingis till tennis?
3. Var syns det i båda lösningarna att golfbollarna till tennis ökar med 6 åt gången?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med 100 golfbollar, och varför?

Lärarens sida: Medel, problem 5, Tangrammet

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

Ett tangram är ett pussel med sju bitar: fem trianglar, en kvadrat och ett parallelogram. Tillsammans bildar bitarna en stor kvadrat. Den stora kvadraten har arean 400 cm^2 .

Hur stor area har varje bit?

Vilka bitar har lika stor area?

Area som delar av en helhet. De stora trianglarna är 100 cm^2 var, den mellanstora, kvadraten och parallelogrammet 50 cm^2 och de små 25 cm^2 . Eleverna lägger bitarna på varandra och ser att olika former kan ha samma area. Material: ett tangram per par, eller en kopia av bilden och en sax. Idén kommer ur Hagland, Hedrén och Taflin (2005).



De två stora är halva den stora kvadraten.
En stor: $400 / 4 = 100 \text{ cm}^2$




Den mellanstora täcker halva den stora:
 $100 / 2 = 50 \text{ cm}^2$



De två små täcker den mellanstora:
 $50 / 2 = 25 \text{ cm}^2$



De täcker också kvadraten
och parallelogrammet:
 $2 \cdot 25 = 50 \text{ cm}^2$ ✓



$4 + 4 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 16$
små trianglar

↓
 $400 / 16 = 25 \text{ cm}^2$

stor: $4 \cdot 25 = 100 \text{ cm}^2$

med 2 små: $2 \cdot 25 = 50 \text{ cm}^2$

liten: 25 cm^2 ✓


Lösning A

Lösning B

I passet	
Ringa in	Frågorna, talet 400, och orden area, cm^2 , kvadrat och parallelogram.
Lyft ut	Vi vet: sju bitar, och hela kvadraten har arean 400 cm^2 . Vi ska ta reda på: arean av varje bit, och vilka som är lika stora.
Ord och tal	Visa bilden och peka på bitarna. Fråga: Vad betyder area? Vad räknar 400, hela kvadraten eller en bit?
Förutse	Bitar som läggs på varandra, rutor som ritas, eller halvor och fjärdedelar. Några räknar $400 / 7$, som om alla bitar vore lika stora.
Kör de fast	Föreslå: Klipp ut bitarna ur en kopia och lägg dem på varandra. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att två små täcker kvadraten. Försök använda det!
Säg inte	Dela hela kvadraten i 16 små trianglar. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Hela kvadraten är 16 cm^2 (små 1, stora 4 och de andra 2 cm^2). Större: Lägg en figur med arean 300 cm^2 . (Som alla utom en stor triangel) Ett annat tangram har ett parallelogram på 125 cm^2 . Hur stort är hela? ($1\,000 \text{ cm}^2$)
Jämför	Kvadraten, parallelogrammet och den mellanstora triangeln är två små trianglar var. Lyft fram att olika former kan ha samma area, som A visar och B räknar.
Fel eller osäker	Ni säger att kvadraten är större än parallelogrammet. Hur kan ni kontrollera det med bitarna? "Blir summan 400?" Hur kan ni kontrollera att alla sju bitar är med?

TANGRAMMET

Ett tangram är ett pussel med sju bitar: fem trianglar, en kvadrat och ett parallelogram. Tillsammans bildar bitarna en stor kvadrat. Den stora kvadraten har arean 400 cm^2 .



FRÅGORNA

1. Hur stor area har varje bit?
2. Vilka bitar har lika stor area?

TANGRAMMET

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A



De två stora är halva den stora kvadraten.

En stor: $400 / 4 = 100 \text{ cm}^2$




Den mellanstora täcker halva den stora:

$100 / 2 = 50 \text{ cm}^2$



De två små täcker den mellanstora:


$50 / 2 = 25 \text{ cm}^2$



De täcker också kvadraten
och parallelogrammet:

$2 \cdot 25 = 50 \text{ cm}^2 \checkmark$

LÖSNING B



$4 + 4 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 16$
små trianglar



$400 / 16 = 25 \text{ cm}^2$

stor: $4 \cdot 25 = 100 \text{ cm}^2$

med 2 små: $2 \cdot 25 = 50 \text{ cm}^2$

liten: $25 \text{ cm}^2 \checkmark$

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vilka bitar lägger eleven på varandra i lösning A?
2. Varför delar eleven i lösning B 400 med 16?
3. Var syns det i båda lösningarna att kvadraten och parallelogrammet har samma area?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om hela tangrammet var $1\,000 \text{ cm}^2$, och varför?

Lärarens sida: Medel, problem 6, Skolan

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

På en skola går fler än 300 och färre än 400 elever. Exakt $\frac{1}{3}$ av eleverna går i årskurs 7. Exakt 20 % av eleverna åker buss till skolan.

Hur många elever kan det gå på skolan? Ge ett exempel.

Hitta alla möjliga antal, och en regel för dem.

Problemet handlar om bråk, procent och delbarhet. Skolan kan ha 315, 330, 345, 360, 375 eller 390 elever, alltså ett antal som går att dela med 15. Eleverna prövar antal, ser att 20 % är $\frac{1}{5}$ och letar efter alla svar. Idén kommer ur Hagland, Hedrén och Taflin (2005).

elever	$\frac{1}{3}$	20 %	går?
330	110	66	ja
340	113 rest 1	68	nej
345	115	69	ja
350	116 rest 2	70	nej
360	120	72	ja

Så räknade vi 345:

$$345 / 3 = 115$$

$$10 \% \text{ är } 34,5$$

$$2 \cdot 34,5 = 69$$

$\frac{1}{3}$: går att dela med 3.


20 % är $\frac{1}{5}$: går att dela med 5.

Båda: går att dela med 15.

$300 / 15 = 20$, men 300 är för få.

Raderna som går ligger 15 isär:

315, 330, 345, 360, 375 och 390 ✓




Lösning A

Lösning B

I passet	
Ringa in	Frågorna, talen 300, 400, $\frac{1}{3}$ och 20 %, och orden exakt, "fler än" och "färre än".
Lyft ut	Vi vet: fler än 300 och färre än 400 elever, $\frac{1}{3}$ går i årskurs 7, 20 % åker buss. Vi ska ta reda på: alla möjliga antal, och en regel.
Ord och tal	Visa tallinjen. Fråga: Vad betyder exakt, och fler än 300? Kan en elev delas? Vad är 20 % som bråk?
Förutse	Antal som provas i en tabell, 10 % två gånger, eller delbart med 3 och 5. Några slutar vid första svaret.
Kör de fast	Föreslå: Välj ett antal och räkna ut $\frac{1}{3}$ och 20 % av det. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att 330 och 345 går. Försök använda det!
Säg inte	Antalet ska gå att dela med 15. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Fler än 20 och färre än 70 elever (30, 45 eller 60). Större: Vilka antal är möjliga om $\frac{1}{4}$ går i årskurs 7 och $\frac{1}{6}$ åker buss? (De som går att dela med 12: 312, 324 och så vidare till 396)
Jämför	$\frac{1}{3}$ och 20 % går jämnt ut när antalet går att dela med 3 och med 5. I A syns det som 15 mellan svaren, och i B som 15-hopp.
Fel eller osäker	Ni säger att 350 går. Hur kan ni kontrollera det mot problemet? Ni har ett svar. Hur kan ni kontrollera om det finns fler?

SKOLAN

På en skola går fler än 300 och färre än 400 elever. Exakt $\frac{1}{3}$ av eleverna går i årskurs 7. Exakt 20 % av eleverna åker buss till skolan.



FRÅGORNA

1. Hur många elever kan det gå på skolan?
Ge ett exempel.
2. Hitta alla möjliga antal, och en regel för dem.

SKOLAN

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

elever	1/3	20 %	går?	
330	110	66	ja	Så räknade vi 345: $345 / 3 = 115$ 10 % är 34,5 $2 \cdot 34,5 = 69$
340	113 rest 1	68	nej	
345	115	69	ja	
350	116 rest 2	70	nej	
360	120	72	ja	

Raderna som går ligger 15 isär:

315, 330, 345, 360, 375 och 390 ✓


LÖSNING B

1/3: går att dela med 3.

20 % är 1/5: går att dela med 5.

Båda: går att dela med 15.

$300 / 15 = 20$, men 300 är för få.



FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad prövar eleven för varje antal i lösning A?
2. Varför hoppar eleven 15 i taget i lösning B?
3. Var syns det i båda lösningarna att svaren ligger 15 isär?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om skolan hade mellan 300 och 3 000 elever, och varför?

Lärarens sida: Medel, problem 7, Samlarbilderna

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

Fem elever samlar på bilder. Den som har flest har 40 bilder. Medelvärde är 22 bilder. Medianen är 20 och typvärdet är 20.

Hur många bilder kan var och en av de fem ha?

Det finns flera svar. Hitta så många ni kan.

Problemet handlar om medelvärde, median och typvärde och har flera svar. Ett svar är 10, 20, 20, 20 och 40, och det finns 14 svar om alla har minst en bild. Eleverna använder att summan är $5 \cdot 22 = 110$ och ordnar talen. Idén kommer ur Hagland, Hedrén och Taflin (2005).

Pröva fem tal i ordning:

15 15 20 20 40

Summan är 110, men
15 är också typvärde.

10 20 20 20 40

$10 + 20 + 20 + 20 + 40 = 110$
 $110 / 5 = 22$ ✓

14 16 20 20 40

$14 + 16 + 20 + 20 + 40 = 110$
 $110 / 5 = 22$ ✓

Medianen och typvärdet är 20 i båda.

Summan: $5 \cdot 22 = 110$

20 20 20 40

Kvar till tre rutor:
 $110 - 20 - 40 = 50$

Typvärdet 20: ett 20 till.

20 20 20 40

$50 - 20 = 30$ till två:
10 och 20,
14 och 16

20 20 20 40

$50 - 20 = 30$ till två:
5 och 25, 6 och 24 ...

Kontroll: $5 + 20 + 20 + 25 + 40 = 110$ ✓

Lösning A


Lösning B

I passet	
Ringa in	Frågorna, talen 40, 22 och 20, och orden flest, medelvärde, median och typvärde.
Lyft ut	Vi vet: fem elever, den som har flest har 40, medelvärdet 22, medianen 20, typvärdet 20. Vi ska ta reda på: hur många bilder var och en kan ha.
Ord och tal	Visa rutorna på bilden. Fråga: Vad betyder median och typvärde? Vad räknar 22? Måste någon av eleverna ha 22 bilder?
Förutse	Tal som provas i rutorna, summan 110, eller 20 i mitten först. Några skriver inte talen i ordning.
Kör de fast	Föreslå: Skriv fem tal i rutorna och räkna medelvärdet. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att summan måste bli 110. Försök använda det!
Säg inte	Sätt 20 i mitten och 40 sist, och summan är 110. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Den som har flest har 8, medelvärdet är 5, och medianen och typvärdet är 4 (3 svar). Större: Hitta alla svar, om alla har minst en bild. Hur vet ni att ni har alla? (14 svar, ordnade efter var det andra 20 står)
Jämför	Summan är $5 \cdot 22 = 110$, och 20 står minst två gånger. A provar och räknar summan, och B börjar med de tal som måste stå.
Fel eller osäker	Ni säger att 15, 15, 20, 20 och 40 går. Hur kan ni kontrollera typvärdet mot problemet? "Är medianen 20?" Hur kan ni kontrollera det?

SAMLARBILDERNA

Fem elever samlar på bilder. Den som har flest har 40 bilder. Medelvärdet är 22 bilder.

Medianen är 20 och typvärdet är 20.



FRÅGORNA

1. Hur många bilder kan var och en av de fem ha?
2. Det finns flera svar. Hitta så många ni kan.

SAMLARBILDERNA

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

Pröva fem tal i ordning:

15 15 20 20 40

Summan är 110, men
15 är också typvärde.

10 20 20 20 40

$10 + 20 + 20 + 20 + 40 = 110$
 $110 / 5 = 22$ ✓

14 16 20 20 40

$14 + 16 + 20 + 20 + 40 = 110$
 $110 / 5 = 22$ ✓

Medianen och typvärdet är 20 i båda.

LÖSNING B

Summan: $5 \cdot 22 = 110$

□ □ 20 □ 40

Kvar till tre rutor:
 $110 - 20 - 40 = 50$

Typvärdet 20: ett 20 till.

□ □ 20 20 40

$50 - 20 = 30$ till två:
10 och 20,
14 och 16

□ 20 20 □ 40

$50 - 20 = 30$ till två:
5 och 25, 6 och 24 ...

Kontroll: $5 + 20 + 20 + 25 + 40 = 110$ ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad prövar eleven för varje rad i lösning A?
2. Varför räknar eleven i lösning B $110 - 20 - 40$?
3. Var syns det i båda lösningarna att summan måste vara 110?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja för att hitta alla svar, och varför?

Lärarens sida: Medel, problem 8, Klädaffären

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

I en affär med begagnade kläder kostar 2 hattar lika mycket som 5 kjolar. Där kostar 3 kjolar lika mycket som 8 tröjor, och 2 tröjor kostar lika mycket som 3 kepsar.

Fyra vänner handlar. Ali köper 3 hattar, Bea 7 kjolar, Cleo 18 tröjor och Dan 29 kepsar.

Vem betalar mest?

Ordna de fyra köpen från dyrast till billigast.

Problemet handlar om likheter i en kedja. Ali betalar mest och Cleo minst, och ordningen är Ali, Dan, Bea och Cleo. Eleverna räknar med proportioner i flera steg och väljer en enhet som de räknar om allt till, kepsar eller kronor. Idén kommer ur Känguru 2023, Benjamin nr 24.

2 tröjor kostar som 3 kepsar
8 tröjor: $4 \cdot 3 = 12$ kepsar
3 kjolar kostar som 12 kepsar
en kjol: $12 / 3 = 4$ kepsar
5 kjolar: $5 \cdot 4 = 20$ kepsar
en hatt: $20 / 2 = 10$ kepsar

vem	köp	i kepsar
Ali	3 hattar	$3 \cdot 10 = 30$
Bea	7 kjolar	$7 \cdot 4 = 28$
Cleo	18 tröjor	$9 \cdot 3 = 27$
Dan	29 kepsar	29

Välj: en keps kostar 10 kr.

en tröja: $3 \cdot 10 / 2 = 15$ kr

en kjol: $8 \cdot 15 / 3 = 40$ kr

en hatt: $5 \cdot 40 / 2 = 100$ kr

vem	köp	kronor
Ali	3 hattar	$3 \cdot 100 = 300$
Bea	7 kjolar	$7 \cdot 40 = 280$
Cleo	18 tröjor	$18 \cdot 15 = 270$
Dan	29 kepsar	$29 \cdot 10 = 290$

Från dyrast: Ali 30, Dan 29, Bea 28 och Cleo 27.

Ali betalar mest. ✓

Från dyrast: Ali 300, Dan 290, Bea 280 och Cleo 270.

Ali betalar mest. ✓

Lösning A

Lösning B

I passet	
Ringa in	Frågorna, talen i de tre likheterna, och orden "kostar lika mycket som".
Lyft ut	Vi vet: tre likheter mellan priser, och vad var och en köper. Vi ska ta reda på: vem som betalar mest, och ordningen.
Ord och tal	Visa hatten, kjolen, tröjan och kepsen på bilden. Fråga: Vilken är dyrare, en kjol eller en tröja? Hur vet ni det?
Förutse	Allt i kepsar, ett pris som väljs, eller sakerna som ritas. Några tror att en kjol kostar som 8 tröjor.
Kör de fast	Föreslå: Leta efter en sak som ni kan räkna om allt till. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att en tröja kostar mer än en keps. Försök använda det!
Säg inte	Räkna om allt till kepsar, eller säg att en keps kostar 10 kr. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: En hatt kostar som 2 kjolar, och en kjol som 3 tröjor. Ordna 2 hattar, 3 kjolar och 10 tröjor (hattarna, tröjorna, kjolarna). Större: Hitta på ett köp som kostar lika mycket som Beas. (Som 28 kepsar, eller 2 hattar och 2 kjolar)
Jämför	Vi räknar om allt till samma enhet. En hatt är 10 kepsar i A och 100 kr i B, alltså 10 kepsar i båda. Lyft fram att enheten går att välja.
Fel eller osäker	Ni säger att Dan betalar mest, för han köper flest saker. Hur kan ni kontrollera det mot problemet? "Är ordningen rätt?" Hur kan ni kontrollera den på ett annat sätt?

KLÄDAFFÄREN

I en affär med begagnade kläder kostar 2 hattar lika mycket som 5 kjolar. Där kostar 3 kjolar lika mycket som 8 tröjor, och 2 tröjor kostar lika mycket som 3 kepsar.

Fyra vänner handlar. Ali köper 3 hattar, Bea 7 kjolar, Cleo 18 tröjor och Dan 29 kepsar.



hatt



kjol



tröja



keps

FRÅGORNA

1. Vem betalar mest?
2. Ordna de fyra köpen från dyrast till billigast.

KLÄDAFFÄREN

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

2 tröjor kostar som 3 kepsar	vem	köp	i kepsar
8 tröjor: $4 \cdot 3 = 12$ kepsar	Ali	3 hattar	$3 \cdot 10 = 30$
3 kjolar kostar som 12 kepsar	Bea	7 kjolar	$7 \cdot 4 = 28$
en kjol: $12 / 3 = 4$ kepsar	Cleo	18 tröjor	$9 \cdot 3 = 27$
5 kjolar: $5 \cdot 4 = 20$ kepsar	Dan	29 kepsar	29
en hatt: $20 / 2 = 10$ kepsar			

Från dyrast: Ali 30, Dan 29, Bea 28 och Cleo 27.

Ali betalar mest. ✓

LÖSNING B

Välj: en keps kostar 10 kr.	vem	köp	kronor
en tröja: $3 \cdot 10 / 2 = 15$ kr	Ali	3 hattar	$3 \cdot 100 = 300$
en kjol: $8 \cdot 15 / 3 = 40$ kr	Bea	7 kjolar	$7 \cdot 40 = 280$
en hatt: $5 \cdot 40 / 2 = 100$ kr	Cleo	18 tröjor	$18 \cdot 15 = 270$
	Dan	29 kepsar	$29 \cdot 10 = 290$

Från dyrast: Ali 300, Dan 290, Bea 280 och Cleo 270.

Ali betalar mest. ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Hur räknar eleven i lösning A ut vad en kjol är i kepsar?
2. Varför får eleven i lösning B välja att en keps kostar 10 kr?
3. Var syns det i båda lösningarna att en hatt kostar som tio kepsar?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om en sak till kom med, och varför?

Lärarens sida: Medel, problem 9, Pantpengarna

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

Tre syskon pantar burkar och lägger pengarna i en ask. Saga tar $\frac{1}{3}$ av pengarna och går. Sedan kommer Leo. Han tror att ingen har tagit något och tar $\frac{1}{3}$ av det som finns kvar. Sist kommer Mira och gör likadant. Då ligger 8 kr kvar i asken.

Hur mycket pengar fick syskonen för burkarna?

Hur mycket tog var och en?

Problemet handlar om bråk av det som finns kvar och om att räkna baklänges. Från början fanns 27 kr, och Saga tog 9 kr, Leo 6 kr och Mira 4 kr. Eleverna ser att 8 kr är $\frac{2}{3}$ av det Mira hittade i asken och går bakåt ett steg i taget. Idén kommer ur Hagland, Hedrén och Taflin (2005).

Baklänges från 8 kr:

Saga:

9	9	9
---	---	---

 $18 / 2 = 9$
 $3 \cdot 9 = 27$

Leo:

6	6	6
---	---	---

 $12 / 2 = 6$
 $3 \cdot 6 = 18$

Mira:

4	4	4
---	---	---

 $8 / 2 = 4$
 $3 \cdot 4 = 12$

8 kr kvar

Svar: 27 kr ✓

början	Saga	Leo	Mira	kvar
30	10	nej		
81	27	18	12	24
54	18	12	8	16
27	9	6	4	8 ✓

Så räknade vi 27:
 $27 / 3 = 9$
 $27 - 9 = 18$
 $18 / 3 = 6$
 $18 - 6 = 12$
 $12 / 3 = 4$
 $12 - 4 = 8$

81 gav 24 kvar och 54 gav 16 kvar.
 16 är dubbelt så mycket som 8:
 pröva hälften, $54 / 2 = 27$.

Svar: 27 kr ✓

Lösning A

Lösning B

I passet	
Ringa in	Frågorna, talen $\frac{1}{3}$ och 8 kr, och orden "det som finns kvar" och "likadant".
Lyft ut	Vi vet: alla tar $\frac{1}{3}$ av det som är kvar, och sist är 8 kr kvar. Vi ska ta reda på: pengarna från början, och vad var och en tog.
Ord och tal	Visa stapeln på bilden. Fråga: Vad betyder "det som finns kvar"? Är 8 kr Miras del eller det som blev kvar?
Förutse	Staplar som delas, tal som provas i en tabell, eller baklänges från 8 kr. Några tror att 8 kr är $\frac{1}{3}$ i stället för $\frac{2}{3}$.
Kör de fast	Föreslå: Gissa hur mycket som fanns från början, och räkna vad var och en tar. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att Mira lämnar $\frac{2}{3}$ kvar. Försök använda det!
Säg inte	8 kr är $\frac{2}{3}$ av det Mira hittade, så gå baklänges. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Två syskon gör likadant, och sist är 4 kr kvar (9 kr: Saga tog 3 kr och Leo 2 kr). Större: Fyra syskon gör likadant, och sist är 16 kr kvar. Hur mycket fanns från början? (81 kr)
Jämför	Varje gång blir $\frac{2}{3}$ kvar. I A är 8 kr två tredjedelar, så en tredjedel är 4 kr. I B är det 18, 12 och 8 kr som blir kvar.
Fel eller osäker	Ni säger att Mira tog 8 kr. Hur kan ni kontrollera det mot problemet? "Är det 27 kr?" Hur kan ni kontrollera att det blir 8 kr kvar?

PANTPENGARNA

Tre syskon pantar burkar och lägger pengarna i en ask. Saga tar $\frac{1}{3}$ av pengarna och går. Sedan kommer Leo. Han tror att ingen har tagit något och tar $\frac{1}{3}$ av det som finns kvar. Sist kommer Mira och gör likadant. Då ligger 8 kr kvar i asken.

pengarna i asken

Saga tar $\frac{1}{3}$		
------------------------	--	--

FRÅGORNA

1. Hur mycket pengar fick syskonen för burkarna?
2. Hur mycket tog var och en?

PANTPENGARNA

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

Baklänges från 8 kr:

Saga	<table border="1"><tr><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr></table>	9	9	9	$18 / 2 = 9$ $3 \cdot 9 = 27$
9	9	9			
Leo	<table border="1"><tr><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr></table>	6	6	6	$12 / 2 = 6$ $3 \cdot 6 = 18$
6	6	6			
Mira	<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </table> 8 kr kvar	4	4	4	$8 / 2 = 4$ $3 \cdot 4 = 12$ Svar: 27 kr ✓
4	4	4			

LÖSNING B

början	Saga	Leo	Mira	kvar	Så räknade vi 27:
30	10	nej			$27 / 3 = 9$
81	27	18	12	24	$27 - 9 = 18$
54	18	12	8	16	$18 / 3 = 6$
27	9	6	4	8 ✓	$18 - 6 = 12$
					$12 / 3 = 4$
					$12 - 4 = 8$

81 gav 24 kvar och 54 gav 16 kvar.
 16 är dubbelt så mycket som 8:
 pröva hälften, $54 / 2 = 27$.

Svar: 27 kr ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Varför börjar eleven i lösning A med den nedersta stapeln?
2. Varför prövar eleven 27 efter 54 i lösning B?
3. Var syns det i båda lösningarna att 2/3 blir kvar varje gång?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med fem syskon, och varför?

Lärarens sida: Medel, problem 10, Smörgåsarna

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

Elsa, Jonas och Kim är på utflykt. Elsa har med sig 2 smörgåsar och Jonas har 3. Kim har glömt sin matsäck. De delar de fem smörgåsarna så att alla tre äter lika mycket. Sedan ger Kim 25 kr till Elsa och Jonas för det han har ätit.

Hur ska Elsa och Jonas dela de 25 kronorna, så att det blir rättvist?

Problemet handlar om bråk och rättvis delning. Smörgåsarna är lika stora, och Kim betalar för det han får av var och en. Elsa ska få 5 kr och Jonas 20 kr, eftersom Elsa ger Kim $1/3$ smörgås och Jonas $4/3$. Material: fem pappersrektanglar per par att vika i tredjedelar. Idén kommer ur Nyman, Säfström och Taflin i Nämnaren 2016:3.



Elsa: 6 tredjedelar

Jonas: 9 tredjedelar

Alla äter 5 av 15 tredjedelar.

Kim får 1 av Elsas och 4 av Jonas.

Kim betalar 25 kr för 5 tredjedelar:

$25 / 5 = 5$ kr för en tredjedel

Elsa: $1 \cdot 5 = 5$ kr

Jonas: $4 \cdot 5 = 20$ kr ✓

5 smörgåsar delas på 3:

$5 / 3 = 5/3$ var

Elsa ger: $2 - 5/3 = 1/3$

Jonas ger: $3 - 5/3 = 4/3$

Kim får $1/3 + 4/3 = 5/3$ för 25 kr.

$1/3$ kostar $25 / 5 = 5$ kr.

Elsa: 5 kr

Jonas: $4 \cdot 5 = 20$ kr ✓


Lösning A

Lösning B


I passet	
Ringa in	Frågan, talen 2, 3 och 25, och orden "lika mycket" och "rättvist".
Lyft ut	Vi vet: Elsa har 2 smörgåsar och Jonas 3, alla äter lika mycket, och Kim betalar 25 kr. Vi ska ta reda på: hur mycket Elsa och Jonas ska få.
Ord och tal	Fråga: Vad betyder rättvist här? Betalar Kim för smörgåsarna Elsa och Jonas hade med sig, eller för det han äter?
Förutse	Smörgåsar som ritas i tredjedelar, bråk, eller pengarna efter antalet smörgåsar. Några svarar då 10 och 15 kr.
Kör de fast	Föreslå: Rita smörgåsarna och dela dem så att alla får lika. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att alla äter 5 tredjedelar. Försök använda det!
Säg inte	Elsa ger Kim $1/3$ och Jonas ger $4/3$. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Elsa har 1 smörgås och Jonas 2, och Kim betalar 10 kr (Elsa 0 kr och Jonas 10 kr). Större: Elsa har 3 smörgåsar och Jonas 5, och Kim betalar 40 kr. Hur ska de dela nu? (Elsa 5 kr och Jonas 35 kr)
Jämför	Kim betalar för det han får av var och en. I A syns det i bitarna med K, och i B i $2 - 5/3$ och $3 - 5/3$.
Fel eller osäker	Ni säger att Elsa ska ha 10 kr. Hur kan ni kontrollera det mot det hon gav Kim? "Är 5 och 20 kr rättvist?" Hur kan ni kontrollera det?

SMÖRGÅSARNA


Elsa, Jonas och Kim är på utflykt. Elsa har med sig 2 smörgåsar och Jonas har 3. Kim har glömt sin matsäck. De delar de fem smörgåsar så att alla tre äter lika mycket. Sedan ger Kim 25 kr till Elsa och Jonas för det han har ätit.



Elsa



Jonas



Kim

FRÅGAN

Hur ska Elsa och Jonas dela de 25 kronorna, så att det blir rättvist?

SMÖRGÅSARNA

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A



Alla äter 5 av 15 tredjedelar.

Kim får 1 av Elsas och 4 av Jonas.

Kim betalar 25 kr för 5 tredjedelar:

$25 / 5 = 5$ kr för en tredjedel

Elsa: $1 \cdot 5 = 5$ kr

Jonas: $4 \cdot 5 = 20$ kr ✓

LÖSNING B

5 smörgåsar delas på 3:

$5 / 3 = 5/3$ var

Elsa ger: $2 - 5/3 = 1/3$

Jonas ger: $3 - 5/3 = 4/3$

Kim får $1/3 + 4/3 = 5/3$ för 25 kr.

$1/3$ kostar $25 / 5 = 5$ kr.

Elsa: 5 kr

Jonas: $4 \cdot 5 = 20$ kr ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Hur visar eleven i lösning A vad Kim äter av Elsas och Jonas smörgåsar?
2. Varför räknar eleven i lösning B $2 - 5/3$?
3. Var syns det i båda lösningarna att Jonas ger fyra gånger så mycket som Elsa?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med fyra personer, och varför?

Lärarens sidor: Avancerat

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Här står de tio problemen på nivån Avancerat, som ligger nära åk 8–9, i den ordning gruppen tar dem. Varje problem har lärarens sida, problemets sida och bladet Två lösningar.

Problemet	Matematiken	Lösning A	Lösning B
1. Cykelförrådet	tabell och ekvation	Pröva och förbättra i en tabell	Skriv en ekvation med x trehjulingar
2. Glasstapeln	ett linjärt samband	Gör en tabell: 4 cm per glas	Skriv ett uttryck: foten och 4 cm per glas
3. Stenplattorna	mönster med $n \cdot n$ och $4n + 4$	Gör en tabell: rita och räkna figurerna	se strukturen: n^2 och $4n + 4$
4. Udda eller jämnt	sannolikhet och kombinatorik	Gör en lista: alla tio par	räkna paren efter udda och jämnt
5. Svamparna	procent av en del	börja med 100 g svampar	Rita eller bygg: staplar med rutor
6. Skålarna	medelvärde	Pröva och förbättra: varje boll i en tabell	medelvärdena på tallinjer
7. Kvadraten	algebra och area	Pröva och förbättra: olika rektanglar	sidan är halva omkretsen
8. De lutande kvadraterna	area och Pythagoras sats	Rita eller bygg: rama in och dra bort	Leta efter ett mönster i en tabell
9. Staketet	största arean, en funktion	Gör en tabell: bredd och längd i hela meter	Skriv ett uttryck och rita en graf
10. Alla summor	mönster och potenser	Gör en lista: summor i ordning	Rita eller bygg: klossar med luckor

Så använder du problemen	
Ordningen	Ta problemen i ordning, ett per pass, och byt ordning när gruppen behöver arbeta med ett annat område eller ett problem som liknar det förra. De första är lättast att börja på.
Kopiorna	Kopiera problemets sida till varje par, eller visa den på tavlan. I Jämföra får varje par bladet Två lösningar, med B under ett papper tills gruppen har sagt vad A gör.

© Niclas Fohlin. Ur Problemlösning i grupp, <https://niclasfohlin.se/stodundervisning/problemlosning-i-grupp>.

Lärarens sida: Avancerat, problem 1, Cykelförrådet

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

I förskolans cykelförråd står 11 cyklar. Några är tvåhjulingar och några är trehjulingar. Tillsammans har cyklarna 27 hjul.

Hur många tvåhjulingar och hur många trehjulingar står i förrådet?

Problemet handlar om två okända tal som hänger ihop, antalet tvåhjulingar och antalet trehjulingar, som i Ljusstakarna i Bas. Svaret är 6 tvåhjulingar och 5 trehjulingar. Eleverna går från en tabell till en ekvation och ser att en trehjuling har ett hjul mer än en tvåhjuling. Idén kommer ur Problembanken åk 7–9, problem 8.

tvåhjulingar	trehjulingar	hjul
11	0	22 för få
9	2	24
7	4	26
6	5	27 ✓

Så räknade vi raden 7 och 4:
 $7 \cdot 2 = 14$
 $4 \cdot 3 = 12$
 $14 + 12 = 26$

$x =$ antalet trehjulingar
 $11 - x =$ antalet tvåhjulingar

$$3x + 2(11 - x) = 27$$

$$\downarrow$$

$$3x + 22 - 2x = 27 \quad 2 \cdot 11 = 22$$

$$\downarrow$$

$$x + 22 = 27 \quad \longrightarrow \quad x = 27 - 22 = 5$$

5 trehjulingar och $11 - 5 = 6$ tvåhjulingar

Kontroll: $5 \cdot 3 + 6 \cdot 2 = 15 + 12 = 27$ ✓

Lösning A


Lösning B

I passet	
Ringa in	Frågan, talen 11 och 27, och orden tvåhjulingar och trehjulingar.
Lyft ut	Vi vet: 11 cyklar, 27 hjul, två eller tre hjul på varje cykel. Vi ska ta reda på: hur många av varje sort, två okända tal.
Ord och tal	Peka på tvåhjulingen och trehjulingen i bilden. Fråga: Vad räknar 11, och vad räknar 27?
Förutse	En tabell, cyklar som ritas och får hjul, två hjul på alla först, eller en ekvation. Några tar 9 trehjulingar och glömmer de 11 cyklarna.
Kör de fast	Föreslå: Rita elva cyklar, eller pröva ett antal i en tabell. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att 8 tvåhjulingar och 3 trehjulingar gav 25 hjul. Försök använda det!
Säg inte	Ge alla cyklar två hjul och räkna hjulen som blir över. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: 5 cyklar och 12 hjul (3 tvåhjulingar och 2 trehjulingar). Större: Fasaner och kaniner på en gård har tillsammans 35 huvuden och 94 fötter. Hur många av varje? (23 fasaner och 12 kaniner) Kan 15 cyklar ha 50 hjul? (Nej, högst $15 \cdot 3 = 45$)
Jämför	En trehjuling har ett hjul mer. I A ger varje trehjuling 1 hjul till. I B är 22 hjulen om alla har två, och x de som blir över.
Fel eller osäker	Ni säger att 9 trehjulingar ger 27 hjul. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med problemet? Ni säger att $x = 5$. Vad räknar x, och svarar det på frågan?

CYKELFÖRRÅDET

I förskolans cykelförråd står 11 cyklar. Några är tvåhjulingar och några är trehjulingar.

Tillsammans har cyklarna 27 hjul.



FRÅGAN

Hur många tvåhjulingar och hur många trehjulingar står i förrådet?

CYKELFÖRRÅDET

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

tvåhjulingar	trehjulingar	hjul
11	0	22 för få
9	2	24
7	4	26
6	5	27 ✓

Så räknade vi raden 7 och 4:
 $7 \cdot 2 = 14$
 $4 \cdot 3 = 12$
 $14 + 12 = 26$

LÖSNING B

x = antalet trehjulingar

$11 - x$ = antalet tvåhjulingar

$$3x + 2(11 - x) = 27$$

↓

$$3x + 22 - 2x = 27 \quad 2 \cdot 11 = 22$$

↓

$$x + 22 = 27 \quad \longrightarrow \quad x = 27 - 22 = 5$$

5 trehjulingar och $11 - 5 = 6$ tvåhjulingar

Kontroll: $5 \cdot 3 + 6 \cdot 2 = 15 + 12 = 27$ ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad gör eleven i lösning A från rad till rad?
2. Varför skriver eleven i lösning B $11 - x$ för tvåhjulingarna?
3. Var syns det i båda lösningarna att en trehjuling har ett hjul mer än en tvåhjuling?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med 110 cyklar och 270 hjul, och varför?

Lärarens sida: Avancerat, problem 2, Glasstapeln

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

I ett skåp är det 36 cm mellan två hyllor. Glasen i skåpet är likadana och staplas i varandra. En stapel med 2 glas är 18 cm hög. En stapel med 8 glas är 42 cm hög.


Hur många glas kan stå i en stapel mellan hyllorna?

Ett linjärt samband: varje glas ger lika mycket till, men höjden är inte proportionell mot antalet glas. Svaret är 6 glas, en stapel på 34 cm. Eleverna tecknar ett uttryck, $10 + 4n$, ur en tabell eller en bild och löser en ekvation. Material: muggar som går att stapla, och en linjal. Idén kommer ur Känguru 2022, Cadet nr 10.

Från 2 till 8 glas:
 $8 - 2 = 6$ glas mer
 $42 - 18 = 24$ cm mer
 $\downarrow$
 $24 / 6 = 4$ cm per glas

Svar: 6 glas

glas	höjd i cm
2	18
+4 ↓ 3	22
+4 ↓ 4	26
+4 ↓ 5	30
+4 ↓ 6	34 ✓
+4 ↓ 7	38 för högt



Varje glas: $(42 - 18) / 6 = 4$ cm till
 Foten: $18 - 2 \cdot 4 = 10$ cm

$\downarrow$
 n glas: $10 + 4n$ cm
 $\downarrow$
 $10 + 4n = 36$ ger $4n = 26$
 $\downarrow$
 $n = 26 / 4 = 6,5$, så 6 glas

Kontroll: $10 + 4 \cdot 6 = 34$ cm ryms, ✓
 men $10 + 4 \cdot 7 = 38$ cm är för högt.


Lösning A

Lösning B

I passet	
Ringa in	Frågan, talen 36, 2, 18, 8 och 42, och orden "staplas i varandra" och "mellan hyllorna".
Lyft ut	Vi vet: 36 cm mellan hyllorna, 2 glas är 18 cm och 8 glas 42 cm. Vi ska ta reda på: hur många glas en stapel mellan hyllorna kan ha.
Ord och tal	Visa bilden, eller ställ två muggar i varandra, så att eleverna ser vad staplas betyder. Fråga: Vad mäter 18, och vad mäter 36?
Förutse	En tabell med ett glas i taget, en ritad stapel, eller ett uttryck. Några tror att ett glas är 9 cm, eftersom 2 glas är 18 cm.
Kör de fast	Föreslå: Gör en tabell med antal glas och höjd. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att 6 glas till gav 24 cm till. Försök använda det!
Säg inte	Varje glas ger 4 cm till, och foten är 10 cm. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: 2 glas är 18 cm, 3 glas är 22 cm och det är 32 cm mellan hyllorna (5 glas, 30 cm). Större: Hur hög är en stapel med 20 glas? (90 cm) Hur många glas ryms under 1 m? (22)
Jämför	Varje glas ger 4 cm till. I A växer höjden med 4 cm per rad, och i B är det $4n$. Lyft fram att foten, 10 cm, inte växer.
Fel eller osäker	Ni säger att 9 glas får plats. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med problemet? Ni säger att det blir 6,5 glas. Hur kan ni kontrollera att det svarar på frågan?

GLASSTAPELN

I ett skåp är det 36 cm mellan två hyllor. Glasen i skåpet är likadana och staplas i varandra. En stapel med 2 glas är 18 cm hög. En stapel med 8 glas är 42 cm hög.



FRÅGAN

Hur många glas kan stå i en stapel mellan hyllorna?

GLASSTAPELN

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

Från 2 till 8 glas:

$$8 - 2 = 6 \text{ glas mer}$$

$$42 - 18 = 24 \text{ cm mer}$$



$$24 / 6 = 4 \text{ cm per glas}$$

Svar: 6 glas

glas	höjd i cm
2	18
+4 ↓ 3	22
+4 ↓ 4	26
+4 ↓ 5	30
+4 ↓ 6	34 ✓
+4 ↓ 7	38 för högt

LÖSNING B

$$\text{Varje glas: } (42 - 18) / 6 = 4 \text{ cm till}$$

$$\text{Foten: } 18 - 2 \cdot 4 = 10 \text{ cm}$$




$$n \text{ glas: } 10 + 4n \text{ cm}$$



$$10 + 4n = 36 \text{ ger } 4n = 26$$



$$n = 26 / 4 = 6,5, \text{ så } 6 \text{ glas}$$



Kontroll: $10 + 4 \cdot 6 = 34 \text{ cm rymt}$,
men $10 + 4 \cdot 7 = 38 \text{ cm}$ är för högt. ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad gör eleven i lösning A från rad till rad?
2. Varför räknar eleven i lösning B $18 - 2 \cdot 4$?
3. Var syns det i båda lösningarna att varje glas ger 4 cm till?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om hyllorna var 2 m isär, och varför?

Lärarens sida: Avancerat, problem 3, Stenplattorna

Problemlösning i grupp · åk 4–9


Problemet

Uteplatser läggs med kvadratiske stenplattor. I mitten ligger ljusa plattor i en kvadrat, och runt dem ligger en ram av mörka plattor. Bilden visar de tre första uteplatserna, figur 1, 2 och 3, och mönstret fortsätter likadant.

Hur många ljusa och hur många mörka plattor behövs till figur 5 och till figur 10?

Skriv en regel för de ljusa och de mörka plattorna i figur n .

Ett mönster som växer: figur n har n^2 ljusa plattor och $4n + 4$ mörka. Figur 5 har 25 ljusa och 24 mörka, och figur 10 har 100 och 44. Eleverna går från en tabell till en regel och ser figuren på två sätt. Material: rutat papper eller brickor. Idén kommer ur Hagland, Hedrén och Taflin (2005) och Lithner m.fl. (2025).




Lösning A

Lösning B


I passet	
Ringa in	Frågorna, figur 5, 10 och n , och orden ljusa, mörka och ram.
Lyft ut	Vi vet: hur figur 1, 2 och 3 ser ut, ljusa i mitten och mörka runt. Vi ska ta reda på: antalet av varje slag i figur 5, 10 och n .
Ord och tal	Peka på ramen och mitten i bilden. Fråga: Vad betyder figur 10, och vad står n för?
Förutse	Figurer på rutat papper, en tabell, eller en regel ur figuren. Några tror att figur 10 har dubbelt så många som figur 5.
Kör de fast	Föreslå: Rita figur 4 och skriv antalen i en tabell. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att de mörka blir 4 fler varje gång. Försök använda det!
Säg inte	Sidan i den ljusa kvadraten är figurens nummer. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Rita figur 4 och räkna båda slagen (16 ljusa och 20 mörka). Större: Vilken figur har 100 mörka plattor? (Figur 24) Från vilken figur är de ljusa fler än de mörka? (Figur 5)
Jämför	De mörka ökar med 4, en på varje sida. I A syns det i tabellen, och i B i $4n$: var och en av de fyra sidorna har n plattor.
Fel eller osäker	Ni säger att figur 10 har 48 mörka. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med bilden? "Är regeln rätt?" Hur kan ni pröva den på figur 1, 2 och 3?

STENPLATTORNA


Uteplatser läggs med kvadratiska stenplattor. I mitten ligger ljusa plattor i en kvadrat, och runt dem ligger en ram av mörka plattor. Bilden visar de tre första uteplatserna, figur 1, 2 och 3, och mönstret fortsätter likadant.



figur 1



figur 2



figur 3


FRÅGORNA

1. Hur många ljusa och hur många mörka plattor behövs till figur 5 och till figur 10?
2. Skriv en regel för de ljusa och de mörka plattorna i figur n .

STENPLATTORNA

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A



figur 4

figur	ljusa	mörka
1	1	8
2	4	12
3	9	16
4	16	20
5	25	24
10	100	44


↓ +4
↓ +4
↓ +4
↓ +4

figur 10:
 $10 \cdot 10 = 100$
 $24 + 5 \cdot 4 = 44$

mörka:
 $4 \cdot 1 + 4 = 8$
 $4 \cdot 2 + 4 = 12$

figur n:
 $n \cdot n$ ljusa
 $4n + 4$ mörka

LÖSNING B



figur 4: $n = 4$

ljusa: $n \cdot n = n^2$
 mörka: 4 sidor med n
 och 4 hörn, $4n + 4$
 ↓
 figur 5: $5^2 = 25$ ljusa
 och $4 \cdot 5 + 4 = 24$ mörka
 figur 10: $10^2 = 100$ ljusa
 och $4 \cdot 10 + 4 = 44$ mörka

Kontroll med figur 3: $3^2 = 9$ och $4 \cdot 3 + 4 = 16$ ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad gör eleven i lösning A från rad till rad i tabellen?
2. Varför delar eleven i lösning B de mörka i fyra sidor och fyra hörn?
3. Var syns det i båda lösningarna att de mörka blir fyra fler för varje figur?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja för figur 100, och varför?

Lärarens sida: Avancerat, problem 4, Udda eller jämnt

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

I en påse ligger fem kulor med talen 2, 3, 4, 5 och 6. Du drar två kulor samtidigt och lägger ihop talen. Blir summan ett jämnt tal vinner du. Blir summan ett udda tal vinner din kompis.

Är spelet rättvist? Visa hur ni vet.

Sannolikhet med alla utfall: av 10 möjliga par ger 4 en jämn summa och 6 en udda. Spelet är inte rättvist, och chansen att vinna med jämn summa är 4 av 10. Eleverna listar systematiskt och resonerar med udda och jämnt. Material: fem lappar med talen 2 till 6 i en påse. Idén kommer ur nrich, Odds and Evens.

kulor	summa	kulor	summa
2 + 3	5	3 + 5	8
2 + 4	6	3 + 6	9
2 + 5	7	4 + 5	9
2 + 6	8	4 + 6	10
3 + 4	7	5 + 6	11

jämn:
4 par

udda:
6 par

jämn + jämn = jämn
udda + udda = jämn
jämn + udda = udda

jämna kulor: 2, 4, 6
udda kulor: 3, 5

+	3	5
2	5	7
4	7	9
6	9	11

en jämn och en udda:
 $3 \cdot 2 = 6$ par, udda summa
två jämna: 3 par
två udda: 1 par

Tillsammans 10 par. Jämnt i 4 av 10: inte rättvist.

jämn summa: $3 + 1 = 4$ par, udda: 6 par Inte rättvist.

Kontroll: $3 + 1 + 6 = 10$ par ✓


Lösning A

Lösning B

I passet	
Ringa in	Frågan, talen på kulorna, och orden "två kulor samtidigt", jämnt, udda och rättvist.
Lyft ut	Vi vet: fem kulor, 2 till 6, två dras samtidigt, jämn summa vinner. Vi ska ta reda på: om båda har lika stor chans att vinna.
Ord och tal	Fråga: Vad betyder rättvist, och vilka tal är jämna? Kan samma kula dras två gånger? Är $2 + 4$ och $4 + 2$ samma par?
Förutse	En lista med alla par, en tabell, eller udda och jämnt. Några tror att jämnt vinner oftare, eftersom tre kulor är jämna.
Kör de fast	Föreslå: Skriv alla par som kan dras, ett i taget. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att två udda tal ger en jämn summa. Försök använda det!
Säg inte	Jämn summa kräver två jämna eller två udda kulor. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Fyra kulor med talen 2, 3, 4 och 5 (inte rättvist, 2 av 6 par ger jämn summa). Större: Vilken kula kan ni ta bort så att spelet blir rättvist? (3 eller 5) Finns det fler svar än 3 och 5? (Nej)
Jämför	Jämn summa kommer från två jämna eller två udda. I A är det paren $2 + 4$, $2 + 6$, $4 + 6$ och $3 + 5$, och i B är det $3 + 1$ par.
Fel eller osäker	Ni säger att det finns 25 par. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med problemet? Hur vet ni att ni har alla par?

UDDA ELLER JÄMNT

I en påse ligger fem kulor med talen 2, 3, 4, 5 och 6. Du drar två kulor samtidigt och lägger ihop talen. Blir summan ett jämnt tal vinner du. Blir summan ett udda tal vinner din kompis.



två kulor



jämn summa: du vinner
udda summa: kompisen vinner

FRÅGAN

Är spelet rättvist? Visa hur ni vet.

UDDA ELLER JÄMNT

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

kulor	summa	kulor	summa	
2 + 3	5	3 + 5	8	jämn: 4 par
2 + 4	6	3 + 6	9	
2 + 5	7	4 + 5	9	udda: 6 par
2 + 6	8	4 + 6	10	
3 + 4	7	5 + 6	11	

Tillsammans 10 par. Jämnt i 4 av 10: inte rättvist.

LÖSNING B

jämn + jämn = jämn
udda + udda = jämn
jämn + udda = udda

jämna kulor: 2, 4, 6
udda kulor: 3, 5

+	3	5
2	5	7
4	7	9
6	9	11

en jämn och en udda:

$3 \cdot 2 = 6$ par, udda summa

två jämna: 3 par

två udda: 1 par

jämn summa: $3 + 1 = 4$ par, udda: 6 par Inte rättvist.

Kontroll: $3 + 1 + 6 = 10$ par ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Hur gör eleven i lösning A för att få med alla par?
2. Varför räknar eleven i lösning B $3 \cdot 2$ för en kula av varje slag?
3. Var syns de fyra paren med jämn summa i båda lösningarna?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med 20 kulor, och varför?

Lärarens sida: Avancerat, problem 5, Svamparna

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

Färska svampar består till 80 % av vatten. När svamparna torkar, försvinner en del av vattnet. Torkade svampar består till 20 % av vatten.

Med hur många procent minskar vikten när svamparna torkas?

Problemet handlar om procent av en helhet som ändras, medan det torra i svamparna väger lika mycket. Vikten minskar med 75 %, så att en fjärdedel är kvar. Eleverna väljer en vikt att räkna med och följer det torra, med tal eller staplar. Material: rutat papper. Idén kommer ur Känguru 2024, Cadet nr 16.

Om svamparna väger 100 g:
vatten 80 g och torrt 20 g


↓
Torkade: torrt 20 g är 80 %

↓
10 % är $20 / 8 = 2,5$ g

↓
100 % är $2,5 \cdot 10 = 25$ g

100 – 25 = 75 g mindre, alltså 75 %

Kontroll: $25 - 20 = 5$ g vatten, och 5 av 25 är 20 % ✓



Färska: 20 rutor,
4 torra är 20 %

↓
Torkade: 4 torra
är 80 %, 1 vatten

↓
5 av 20 rutor kvar,
en fjärdedel

Minskar med 75 %

Kontroll: 1 av 5 är 20 % ✓


Lösning A

Lösning B

I passet	
Ringa in	Frågan, talen 80 % och 20 %, och orden färska, torkade och minskar.
Lyft ut	Vi vet: färska är 80 % vatten, torkade 20 % vatten, och bara vatten försvinner. Vi ska ta reda på: hur många procent vikten minskar.
Ord och tal	Peka på stapelns två delar, vattnet och det torra. Fråga: 80 % av vad? Är helheten densamma för 80 % och 20 %?
Förutse	Staplar eller rutor, procent direkt eller ett tal att börja med, som 100 g. Många svarar 60 %, eftersom $80 - 20 = 60$.
Kör de fast	Föreslå: Välj en vikt för de färska svamparna och räkna. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att 100 g färska svampar har 20 g torrt. Försök använda det!
Säg inte	Det torra väger lika mycket före och efter. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: 100 g svampar är 75 % vatten. De torkar tills de är 50 % vatten. Vad väger de nu? (50 g) Större: 100 kg gurkor är 99 % vatten. De torkar tills de är 98 % vatten. Vad väger de nu? (50 kg)
Jämför	Det torra väger lika mycket före och efter, 20 g i A och 4 rutor i B. Lyft fram att procenten räknas på olika helheter.
Fel eller osäker	Ni säger att vikten minskar med 60 %. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med problemet? "Är 25 g svaret?" Hur kan ni kontrollera att det svarar på frågan?

SVAMPARNA

Färska svampar består till 80 % av vatten. När svamparna torkar, försvinner en del av vattnet. Torkade svampar består till 20 % av vatten.



FRÅGAN

Med hur många procent minskar vikten när svamparna torkas?

SVAMPARNA

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

Om svamparna väger 100 g:
vatten 80 g och torrt 20 g

↓
Torkade: torrt 20 g är 80 %


↓
10 % är $20 / 8 = 2,5$ g

↓
100 % är $2,5 \cdot 10 = 25$ g

$100 - 25 = 75$ g mindre, alltså 75 %

Kontroll: $25 - 20 = 5$ g vatten, och 5 av 25 är 20 % ✓

LÖSNING B



Färska: 20 rutor,
4 torra är 20 %

↓
Torkade: 4 torra
är 80 %, 1 vatten

↓
5 av 20 rutor kvar,
en fjärdedel

Minskar med 75 %

Kontroll: 1 av 5 är 20 % ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad gör eleven i lösning A med de 20 g som inte är vatten?
2. Varför är det 4 torra rutor i båda staplarna i lösning B?
3. Var syns det i båda lösningarna att det torra väger lika mycket före och efter?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om svamparna var 90 % vatten, och varför?

Lärarens sida: Avancerat, problem 6, Skålarna

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

I en röd skål ligger fem bollar med talen 3, 7, 9, 10 och 11. I en blå skål ligger fyra bollar med talen 2, 4, 6 och 8. Du ska flytta en av bollarna i den röda skålen till den blå.

Vilken boll ska du flytta för att medelvärdet ska bli större i båda skålarna?

Problemet handlar om medelvärdet som balanspunkt. En boll som är mindre än medelvärdet höjer det när den tas bort, och en som är större höjer det när den läggs till. Svaret är bollen 7. Eleverna prövar i en tabell och resonerar om medelvärdet. Material: lappar med bollarnas tal, i två högar. Idén kommer ur Känguru 2025, Cadet nr 17.

flytta	röd	blå
nu	$40 / 5 = 8$	$20 / 4 = 5$
3	9,25 ↑	4,6 ↓
7	8,25 ↑	5,4 ↑
9	7,75 ↓	5,8 ↑
10	7,5 ↓	6 ↑
11	7,25 ↓	6,2 ↑

Så räknade vi 7:


röd: $40 - 7 = 33$
 $33 / 4 = 8,25$

blå: $20 + 7 = 27$
 $27 / 5 = 5,4$

båda större ✓

↑ större
 ↓ mindre

röd: $40 / 5 = 8$



△ är medelvärdet

Ta bort en boll under 8:
 röd blir större.

Lägg till en boll över 5:
 blå blir större.

↓
 Bara 7 ligger mellan
 5 och 8.

Kontroll:

röd: $33 / 4 = 8,25$

blå: $27 / 5 = 5,4$ ✓


Lösning A

Lösning B


I passet	
Ringa in	Frågan, talen på bollarna, och orden flytta, medelvärdet och "båda skålarna".
Lyft ut	Vi vet: bollarna i varje skål, och att en boll flyttas från den röda skålen till den blå. Vi ska ta reda på: vilken boll som höjer båda medelvärdena.
Ord och tal	Peka på skålarna. Fråga: Vad betyder medelvärde, och hur räknar man ut det? Vad händer med summan och antalet bollar när en boll flyttas?
Förutse	En tabell där varje boll provas, eller ett resonemang om medelvärdet. Några tror att det inte går, eftersom medelvärdet i den ena skålen måste minska.
Kör de fast	Föreslå: Räkna ut medelvärdet i båda skålarna, och prova att flytta en boll. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att om 11 flyttas blir medelvärdet i den röda mindre. Försök använda det!
Säg inte	Bollen ska vara mindre än 8 och större än 5. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Den röda skålen har 2, 5 och 11, och den blå 1 och 3 (flytta bollen 5). Större: Kan ni flytta en boll från blå till röd, så att båda medelvärdena ökar? Varför? (Nej: bollen skulle behöva vara under 5 och över 8)
Jämför	Bollen ska vara under det röda medelvärdet och över det blå. I A syns det i tabellen, och i B ligger 7 mellan 5 och 8.
Fel eller osäker	Ni säger att 3 ska flyttas. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med problemet? Ni delar summan i den blå med 4. Hur många bollar ligger i den blå nu?

SKÅLARNÄ

I en r d sk l ligger fem bollar med talen 3, 7, 9, 10 och 11. I en bl  sk l ligger fyra bollar med talen 2, 4, 6 och 8. Du ska flytta en av bollarna i den r da sk len till den bl .



r d sk l



bl  sk l

FR GAN

Vilken boll ska du flytta f r att medelv rdet ska bli st rre i b da sk larna?

SKÅLARNA

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

flytta	röd	blå
nu	$40 / 5 = 8$	$20 / 4 = 5$
3	9,25 ↑	4,6 ↓
7	8,25 ↑	5,4 ↑
9	7,75 ↓	5,8 ↑
10	7,5 ↓	6 ↑
11	7,25 ↓	6,2 ↑

Så räknade vi 7:

röd: $40 - 7 = 33$

$33 / 4 = 8,25$

blå: $20 + 7 = 27$

$27 / 5 = 5,4$

båda större ✓

↑ större
↓ mindre

LÖSNING B

röd: $40 / 5 = 8$



blå: $20 / 4 = 5$



△ är medelvärdet

Ta bort en boll under 8:
röd blir större.

Lägg till en boll över 5:
blå blir större.

↓
Bara 7 ligger mellan
5 och 8.

Kontroll:

röd: $33 / 4 = 8,25$

blå: $27 / 5 = 5,4$ ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad gör eleven i lösning A med varje boll?
2. Varför ska bollen i lösning B vara mindre än 8 och större än 5?
3. Var syns det i båda lösningarna att bollen ska ligga mellan de två medelvärdena?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med 50 bollar i varje skål, och varför?

Lärarens sida: Avancerat, problem 7, Kvadraten

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

Fyra likadana rektanglar ligger runt en liten kvadrat. Rektanglarna och den lilla kvadraten bildar tillsammans en stor kvadrat, som på bilden. Varje rektangel har omkretsen 40 cm.

Vilken area har den stora kvadraten?

Problemet handlar om ett samband mellan omkrets och area. Den stora kvadratens sida är rektangelns långa sida plus den korta, alltså halva rektangelns omkrets. Svaret är 400 cm^2 , vilken rektangel det än är. Eleverna prövar med tal och generaliserar. Material: rutat papper och fyra likadana rektanglar av papper. Idén kommer ur Nämnaren 2014:4, Problemafdelningen nr 4123.



lång	kort	omkrets	stora sidan	area
15	5	40	20	400
12	8	40	20	400
18	2	40	20	400

Så räknade vi första raden:

omkrets: $15 + 5 + 15 + 5 = 40$

stora sidan: $15 + 5 = 20$

area: $20 \cdot 20 = 400 \text{ cm}^2$ ✓



stora sidan = lång + kort

Kontroll med 15 och 5: $15 + 5 + 15 + 5 = 40$
och $15 + 5 = 20$ ✓

Omkretsen är 2 långa
och 2 korta: 40 cm
↓
 $\text{lång} + \text{kort} = 40 / 2 = 20 \text{ cm}$
↓
stora sidan är 20 cm
↓
arean: $20 \cdot 20 = 400 \text{ cm}^2$


Lösning A

Lösning B

I passet	
Ringa in	Frågan, talet 40, och orden likadana, omkretsen, area och "den stora kvadraten".
Lyft ut	Vi vet: fyra likadana rektanglar, var och en med omkretsen 40 cm. Vi ska ta reda på: arean av den stora kvadraten.
Ord och tal	Peka på en rektangel i bilden, och följ omkretsen runt den. Fråga: Vad mäter 40 cm? Vad är skillnaden på omkrets och area?
Förutse	Olika rektanglar som provas, en ritning, eller ett resonemang om sidan. Några säger att det inte går, eftersom rektangelns mått inte står i texten.
Kör de fast	Föreslå: Hitta på en rektangel med omkretsen 40 cm och rita den. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att rektangeln 15 och 5 cm gav en stor kvadrat med sidan 20 cm. Försök använda det!
Säg inte	Den stora kvadratens sida är en lång plus en kort sida, halva omkretsen. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Rektanglarna är 7 cm långa och 3 cm breda (100 cm^2). Större: Rektanglarna är 15 cm långa. Vilken area har den lilla kvadraten? (100 cm^2) Kan den bli hur stor som helst? (Nej, den är alltid mindre än den stora, 400 cm^2)
Jämför	Den stora kvadratens sida är en lång plus en kort sida, 20 cm. I A blir den 20 med varje rektangel, och i B är den $40 / 2$.
Fel eller osäker	Ni säger att arean är $4 \cdot 75 = 300 \text{ cm}^2$. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med bilden? "Gäller svaret för alla rektanglar?" Hur kan ni pröva det?

KVADRATEN

Fyra likadana rektanglar ligger runt en liten kvadrat. Rektanglarna och den lilla kvadraten bildar tillsammans en stor kvadrat, som på bilden. Varje rektangel har omkretsen 40 cm.



FRÅGAN


Vilken area har den stora kvadraten?

KVADRATEN

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

lång	kort	omkrets	stora sidan	area
15	5	40	20	400
12	8	40	20	400
18	2	40	20	400




Så räknade vi första raden:

omkrets: $15 + 5 + 15 + 5 = 40$

stora sidan: $15 + 5 = 20$

area: $20 \cdot 20 = 400 \text{ cm}^2$ ✓

LÖSNING B



stora sidan = lång + kort

Kontroll med 15 och 5: $15 + 5 + 15 + 5 = 40$

och $15 + 5 = 20$ ✓

Omkretsen är 2 långa
och 2 korta: 40 cm



$\text{lång} + \text{kort} = 40 / 2 = 20 \text{ cm}$



stora sidan är 20 cm



arean: $20 \cdot 20 = 400 \text{ cm}^2$

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad prövar eleven i lösning A, och vad händer med den stora kvadratens sida?
2. Varför delar eleven i lösning B omkretsen med 2?
3. Var syns det i båda lösningarna att den stora kvadratens sida är 20 cm?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om omkretsen var 46 cm, och varför?

Lärarens sida: Avancerat, problem 8, De lutande kvadraterna

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

På prickpapper går det att rita kvadrater som lutar. Kvadratens sida på bilden går 2 steg åt höger och 1 steg uppåt. Ni räknar arean i rutor, och en ruta är den minsta kvadraten mellan fyra prickar.

Vilken area har kvadraten på bilden?


Vilken area har en kvadrat vars sida går 3 steg åt höger och 2 steg uppåt? Finns det en regel?

Problemet leder från area på prickpapper till Pythagoras sats. En kvadrat vars sida går a steg åt höger och b steg uppåt har arean $a^2 + b^2$. Kvadraten med 2 och 1 steg har arean 5, och den med 3 och 2 steg har 13. Eleverna ramar in, räknar och generaliserar. Material: prickpapper och linjal. Idén kommer ur nrich, Tilted Squares.

2 och 1 steg




ram: $3 \cdot 3 = 9$
en triangel: $2 \cdot 1 / 2 = 1$
fyra trianglar: $4 \cdot 1 = 4$
 $9 - 4 = 5$ rutor



3 och 2 steg

ram: $5 \cdot 5 = 25$
en triangel: $3 \cdot 2 / 2 = 3$
fyra trianglar: $4 \cdot 3 = 12$
 $25 - 12 = 13$ rutor ✓

a: åt sidan	b: uppåt	area	$a^2 + b^2$
1	1	2	$1 + 1$
2	1	5	$4 + 1$
3	1	10	$9 + 1$
2	2	8	$4 + 4$
3	2	13	$9 + 4$



$1 + 4 \cdot 1 = 5$

arean = $a^2 + b^2$ 3 och 2: $3^2 + 2^2 = 9 + 4 = 13$
Kontroll: $2^2 + 1^2 = 5$, som rutorna ✓


Lösning A

Lösning B

I passet	
Ringa in	Frågorna, stegen 2 och 1 i bilden och 3 och 2 i frågan, och orden lutar, area och ruta.
Lyft ut	Vi vet: hur kvadratens sida går, 2 steg åt höger och 1 upp, och vad en ruta är. Vi ska ta reda på: arean, och en regel för den.
Ord och tal	Följ en sida i bilden, 2 steg åt höger och 1 upp. Fråga: Är kvadratens sida 3 steg lång? Vad mäter ni arean i?
Förutse	Hela rutor och delar av rutor som sätts ihop, en ram runt kvadraten, eller en tabell. Några tror att arean är $3 \cdot 3 = 9$.
Kör de fast	Föreslå: Rita in rutorna. Vilka delar av rutor kan ni sätta ihop till hela? Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att en hel ruta ligger i mitten. Försök använda det!
Säg inte	Rita en kvadrat runt den som lutar och ta bort trianglarna i hörnen. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Sidan går 1 steg åt höger och 1 uppåt (2 rutor). Större: Vilka areor kan en kvadrat på prickpapper ha? ($a^2 + b^2$, som 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 och 13) Går det att rita en med arean 3? (Nej)
Jämför	Arean är $a^2 + b^2$, där a och b är stegen. I A är ramen minus trianglarna $25 - 12 = 13$, och i B $3^2 + 2^2 = 9 + 4 = 13$. Lyft fram Pythagoras sats.
Fel eller osäker	Ni säger att arean är 9 rutor. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med bilden? "Är regeln rätt?" Hur kan ni pröva den på en ny kvadrat?

DE LUTANDE KVADRATERNA

På prickpapper går det att rita kvadrater som lutar. Kvadratens sida på bilden går 2 steg åt höger och 1 steg uppåt. Ni räknar arean i rutor, och en ruta är den minsta kvadraten mellan fyra prickar.



FRÅGORNA


1. Vilken area har kvadraten på bilden?
2. Vilken area har en kvadrat vars sida går 3 steg åt höger och 2 steg uppåt? Finns det en regel?

DE LUTANDE KVADRATERNA

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

2 och 1 steg




ram: $3 \cdot 3 = 9$

en triangel: $2 \cdot 1 / 2 = 1$

fyra trianglar: $4 \cdot 1 = 4$

$9 - 4 = 5$ rutor



3 och 2 steg

ram: $5 \cdot 5 = 25$


en triangel: $3 \cdot 2 / 2 = 3$

fyra trianglar: $4 \cdot 3 = 12$

$25 - 12 = 13$ rutor ✓

LÖSNING B

a: åt sidan	b: uppåt	area	$a^2 + b^2$
1	1	2	$1 + 1$
2	1	5	$4 + 1$
3	1	10	$9 + 1$
2	2	8	$4 + 4$
3	2	13	$9 + 4$



$1 + 4 \cdot 1 = 5$

arean = $a^2 + b^2$

3 och 2: $3^2 + 2^2 = 9 + 4 = 13$

Kontroll: $2^2 + 1^2 = 5$, som rutorna ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad gör eleven i lösning A med ramen och trianglarna?
2. Hur ser eleven i lösning B regeln i tabellen?
3. Var syns det i båda lösningarna att kvadraten med 3 och 2 steg har arean 13?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med 7 och 4 steg, och varför?

Lärarens sida: Avancerat, problem 9, Staketet

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

Ni har 60 m staket till en rektangulär hage för getter. Hagen ska bli så stor som möjligt. Sedan bygger ni hagen mot en lång vägg i stället, så att väggen blir en sida och staketet räcker till de tre andra.

Vilka mått ger den största hagen med staket runt om, och hur stor blir den?

Vilka mått ger den största hagen mot väggen, och hur stor blir den?

Problemet handlar om största arean med 60 m staket. Hagen blir störst som en kvadrat, $15 \cdot 15 = 225 \text{ m}^2$, och mot en vägg $15 \cdot 30 = 450 \text{ m}^2$. Eleverna ritar, gör en tabell och ser arean som en funktion. Material: rutat papper och ett snöre på 60 cm. Idén kommer ur Problembanken åk 7–9, problem 9.

fyra sidor		
bredd	längd	area
5	25	125
10	20	200
14	16	224
15	15	225
16	14	224

störst: $15 \cdot 15 = 225 \text{ m}^2$

Kontroll: $15 + 15 + 15 + 15 = 60$

mot väggen		
bredd	längd	area
10	40	400
14	32	448
15	30	450
16	28	448
20	20	400

störst: $15 \cdot 30 = 450 \text{ m}^2$

Kontroll: $15 + 30 + 15 = 60$ ✓

fyra sidor:

$$A = b \cdot (30 - b)$$

lika stor för b och $30 - b$,
så toppen är mitt emellan:

$$15 \cdot 15 = 225 \text{ m}^2$$

$$14 \cdot 16 = 224 \text{ och } 13 \cdot 17 = 221$$


mot väggen:

$$A = b \cdot (60 - 2b)$$

$$= 2 \cdot b \cdot (30 - b)$$

$$\text{toppen i 15: } 15 \cdot 30 = 450 \text{ m}^2$$

$$\text{Kontroll: } 15 + 30 + 15 = 60 \quad \checkmark$$



Lösning A


Lösning B

I passet


Ringa in	Frågorna, talet 60, och orden rektangulär, "så stor som möjligt", vägg och "de tre andra".
Lyft ut	Vi vet: 60 m staket, en rektangel, och sedan en vägg som en sida. Vi ska ta reda på: måtten som ger störst area, båda gångerna.
Ord och tal	Peka på väggen i bilden. Fråga: Vad mäter 60 m, omkretsen eller arean? Är det omkretsen också mot väggen? Vad betyder "så stor som möjligt"?
Förutse	Hagar som ritas på rutat papper, en tabell med sidorna, eller en formel och en graf. Mot väggen tror många att kvadraten är bäst igen.
Kör de fast	Föreslå: Rita några hagar med 60 m staket och räkna arean. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att 10 och 20 m gav 200 m^2 , och 12 och 18 gav mer. Försök använda det!
Säg inte	Kvadraten är störst, och mot väggen blir längden dubbelt så stor som bredden. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Prova samma problem med 20 m staket, i hela meter ($5 \cdot 5 = 25 \text{ m}^2$, och mot väggen $5 \cdot 10 = 50 \text{ m}^2$). Större: Hagen ska ligga i ett hörn, med två väggar som sidor. Hur stor kan den bli nu? (30 och 30 m, 900 m^2)
Jämför	Arean blir störst i mitten, där talen i tabellen vänder. I A syns det när bredden 14 och 16 ger samma area, och i B i grafens topp, mitt emellan b och $30 - b$.
Fel eller osäker	Ni säger att en kvadrat med sidan 20 m är bäst mot väggen. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med problemet? "Är 15 m svaret?" Vilka är måtten, och hur stor blir hagen?

STAKETET

Ni har 60 m staket till en rektangulär hage för getter. Hagen ska bli så stor som möjligt. Sedan bygger ni hagen mot en lång vägg i stället, så att väggen blir en sida och staketet räcker till de tre andra.



staket runt om



staket på tre sidor

FRÅGORNA

1. Vilka mått ger den största hagen med staket runt om, och hur stor blir den?
2. Vilka mått ger den största hagen mot väggen, och hur stor blir den?

STAKETET

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

fyra sidor		
bredd	längd	area
5	25	125
10	20	200
14	16	224
15	15	225
16	14	224

störst: $15 \cdot 15 = 225 \text{ m}^2$

Kontroll: $15 + 15 + 15 + 15 = 60$

mot väggen		
bredd	längd	area
10	40	400
14	32	448
15	30	450
16	28	448
20	20	400

störst: $15 \cdot 30 = 450 \text{ m}^2$

Kontroll: $15 + 30 + 15 = 60$ ✓

LÖSNING B

fyra sidor:

$$A = b \cdot (30 - b)$$

lika stor för b och $30 - b$,
så toppen är mitt emellan:

$$15 \cdot 15 = 225 \text{ m}^2$$

$$14 \cdot 16 = 224 \text{ och } 13 \cdot 17 = 221$$


mot väggen:

$$A = b \cdot (60 - 2b)$$

$$= 2 \cdot b \cdot (30 - b)$$

$$\text{toppen i } 15: 15 \cdot 30 = 450 \text{ m}^2$$

$$\text{Kontroll: } 15 + 30 + 15 = 60 \quad \checkmark$$



FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad gör eleven i lösning A, och hur vet eleven att 15 är bäst?
2. Varför är arean mot väggen dubbelt så stor som runt om i lösning B?
3. Var syns det i båda lösningarna att arean är störst när bredden är 15 m?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med 50 m staket, och varför?

Lärarens sida: Avancerat, problem 10, Alla summor

Problemlösning i grupp · Åk 4–9

Problemet

Talet 3 kan skrivas som en summa av positiva heltal på fyra sätt, när ordningen räknas: 3, 2 + 1, 1 + 2 och 1 + 1 + 1. Talet själv räknas också som ett sätt.

På hur många sätt kan talen 4 och 5 skrivas så?

På hur många sätt kan 10 skrivas så? Förklara hur ni vet.

Problemet handlar om kombinatorik och leder till potenser. Talet 4 kan skrivas som en summa på 8 sätt, 5 på 16 och 10 på 512, när ordningen räknas. Antalet fördubblas, och talet n ger 2 upphöjt till $(n - 1)$. Eleverna listar systematiskt och förklarar mönstret med klossar. Material: tio klossar eller kuber. Idén kommer ur Problembanken åk 7–9, problem 15.

1 tal: 4

2 tal: 3 + 1 1 + 3 2 + 2

3 tal: 2 + 1 + 1 1 + 2 + 1 1 + 1 + 2

4 tal: 1 + 1 + 1 + 1

1 + 3 + 3 + 1 = 8 sätt ✓

tal	sätt
1	1
2	2
3	4
4	8
5	16

4 klossar, 3 luckor:

 1 + 3

 2 + 1 + 1

 4

Varje lucka:
avdelare eller inte,
alltså 2 val
↓
 $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ sätt

Antalet fördubblas för varje tal:

10: $16 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 512$ sätt

10 klossar har 9 luckor:

$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 512$ sätt

Kontroll: 3 har 2 luckor, $2 \cdot 2 = 4$ sätt ✓

Lösning A

Lösning B

I passet	
Ringa in	Frågorna, talen 4, 5 och 10, och orden summa, "positiva heltal" och "ordningen räknas".
Lyft ut	Vi vet: 3 kan skrivas på fyra sätt, och 2 + 1 och 1 + 2 är olika. Vi ska ta reda på: antalet sätt för 4, 5 och 10.
Ord och tal	Fråga: Vad är ett positivt heltal? Varför är 2 + 1 och 1 + 2 två sätt? Räknas 0 + 3?
Förutse	En lista ordnad efter första talet eller efter antalet tal, klossar eller ett mönster. Många missar sätt när de listar utan ordning.
Kör de fast	Föreslå: Skriv alla sätt för 4 och ordna listan. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att talen 1, 2, 3 och 4 kan skrivas på 1, 2, 4 och 8 sätt. Försök använda det!
Säg inte	Varje lucka mellan klossarna får en avdelare eller inte. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Ta talen 1 och 2 först och sedan 4 (1, 2 och 8 sätt). Större: Om ordningen inte räknas, är 2 + 1 och 1 + 2 samma sätt. Hur många sätt finns det då för 4 och 5? (5 och 7 sätt)
Jämför	Antalet fördubblas när talet ökar med 1. I A syns det i tabellen, och i B ger varje ny lucka två val, $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ för 4.
Fel eller osäker	Ni säger att 4 kan skrivas på 5 sätt. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med problemet? Hur vet ni att ni har alla sätt?

ALLA SUMMOR

Talet 3 kan skrivas som en summa av positiva heltal på fyra sätt, när ordningen räknas: 3, $2 + 1$, $1 + 2$ och $1 + 1 + 1$. Talet själv räknas också som ett sätt.

3

 $2 + 1$  $1 + 2$  $1 + 1 + 1$ 

FRÅGORNA

1. På hur många sätt kan talen 4 och 5 skrivas så?
2. På hur många sätt kan 10 skrivas så?
Förklara hur ni vet.

ALLA SUMMOR

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

1 tal: 4

2 tal: 3 + 1 1 + 3 2 + 2

3 tal: 2 + 1 + 1 1 + 2 + 1 1 + 1 + 2

4 tal: 1 + 1 + 1 + 1

1 + 3 + 3 + 1 = 8 sätt ✓

tal	sätt
1	1
2	2
3	4
4	8
5	16

Antalet fördubblas för varje tal:

10: $16 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 512$ sätt

LÖSNING B

4 klossar, 3 luckor:

 1 + 3

 2 + 1 + 1

 4

Varje lucka:
avdelare eller inte,
alltså 2 val



$2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ sätt

10 klossar har 9 luckor:

$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 512$ sätt

Kontroll: 3 har 2 luckor, $2 \cdot 2 = 4$ sätt ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Hur ordnar eleven listan i lösning A så att inget sätt fattas?
2. Varför ger varje lucka två val i lösning B?
3. Var syns det i båda lösningarna att antalet fördubblas?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja för talet 20, och varför?