	2-field accuracy	Class I	Class II	Worst locus	No-call rate (%)	Loss at 36 bp	Europe-Yoruba gap	CPU h (median)	RAM GB (median)
T1K	0.95	0.95	0.95	0.92	0.00	–	0.092	0.27	4.3
HLA-HD	0.93	0.93	0.94	0.86	0.18	0.30	0.083	1.2	4.2
HISAT-genotype	0.93	0.93	0.93	0.88	0.15	–	0.079	9.4	7.4
arcasHLA	0.92	0.91	0.92	0.88	0.44	0.31	0.083	0.098	1.8
RNA2HLA	0.90	0.94	0.83	0.77	0.26	0.15	0.028	0.13	0.1
seq2HLA	0.89	0.94	0.81	0.77	0.00	0.19	0.028	0.38	0.1
HLAforest	0.82	0.80	0.85	0.72	0.04	0.10	0.116	0.34	3.5
PHLAT	0.82	0.87	0.73	0.53	0.22	0.25	0.104	0.73	3.3
HLA-VBSeq	0.81	0.83	0.79	0.74	0.04	0.05	0.125	2	2.4
HLApers	0.78	0.69	0.92	0.44	0.00	0.28	0.022	0.055	1.6
OptiType	0.59	0.98	–	0.97	0.00	0.00	0.007	1	5.5
HLAminer	0.08	0.06	0.10	0.04	1.47	0.01	0.014	0.34	0.4

Shade: rank among callers (darker = better); text: value