

Harout CHOULGIAN, Akira LAFOREST et Nicolas LANDUCCI

ANALYSE DE BASE DE DONNÉES

Analyse de la corrélation spatiale entre les espèces du genre *Asclepias* et *Danaus plexippus* sur  
l'île de Montréal

Présenté à  
Louis-Philippe Précourt  
Cours BIO-N02  
Groupe 2

Collège Jean-de-Brébeuf  
Département de Biologie  
4 novembre 2025

## Table des matières

<b>Introduction</b> .....	<b>1</b>
<b>Contexte théorique</b> .....	<b>1</b>
La corrélation spatiale croisée .....	2
<b>Méthode</b> .....	<b>2</b>
<b>Résultats</b> .....	<b>4</b>
Énoncé des résultats.....	9
<b>Discussion</b> .....	<b>9</b>
<b>Conclusion</b> .....	<b>10</b>
<b>Médiagraphie</b> .....	<b>10</b>

## Introduction

Le monarque (*Danaus plexippus*) est un papillon parmi les plus connus et étudiés au monde. Espèce migratrice, le monarque passe ses hivers dans les forêts du sud des États-Unis et du centre du Mexique (COSEWIC, 2016). La larve de *Danaus plexippus* se nourrit exclusivement d'asclépiades (genre *Asclepias*), une plante endémique du Canada et aux États-Unis sur laquelle elle pond ses œufs (LUNA & DUMROESE, 2013). Cependant, ces dernières, en raison de leur croissance agressive, ont été listées jusqu'en 2014 comme des mauvaises herbes nuisibles ; à la lumière de l'importance qu'ont ces espèces dans le cycle de vie de *Danaus plexippus*, la famille a été délistée afin d'essayer de contrer le déclin du monarque (ABASS & VASSEUR, 2025), dont la population semble avoir diminué de 83 % entre 1994 et 2015 en termes de surface occupée au Mexique (COSEWIC, 2016). L'objectif de ce rapport est d'étudier la corrélation spatiale croisée entre les espèces du genre *Asclepias* et *Danaus plexippus* dans l'agglomération de Montréal. Étant donné le regroupement des espaces verts à Montréal, la corrélation attendue pour chacune des espèces est positive. De même, *Danaus plexippus* se nourrissant exclusivement d'asclépiades au stade larvaire, il est probable que la corrélation entre les observations de monarques adultes et d'asclépiades soit supérieure à celle entre d'autres paires d'espèces.

Afin de corréler les espèces, des observations du *Global Biodiversity Information Facility* (GBIF), une plateforme ouverte d'agrégation d'occurrences biologiques, seront utilisées. Les observations de diverses espèces végétales, dont le genre *Asclepias*, seront corrélées en fonction de la distance avec celles d'espèces de lépidoptères (Lepidoptera), dont *Danaus plexippus*.

## Contexte théorique

La population du papillon monarque est en déclin, un phénomène largement documenté par la communauté scientifique. À ce sujet, les chercheurs s'accordent sur le fait que ce déclin est lié à la destruction des plantes dont se nourrissent les monarques (BOYLE et al., 2019). En effet, les chenilles de *Danaus plexippus* se nourrissent exclusivement de feuilles d'asclépiade, une plante toxique. Les monarques ont développé une résistance au glycoside cardiaque, la toxine présente dans ces feuilles. Cette substance est devenue un mécanisme de défense contre les prédateurs, car elle reste dans l'exosquelette des papillons et rend leur consommation dangereuse pour d'éventuels prédateurs, ce qui est reflété par la coloration aposématique du monarque.

Depuis plusieurs décennies, la population de *Danaus plexippus* a diminué dans les milieux urbains et agricoles, à un point tel qu'il est inscrit en tant qu'espèce en voie de disparition en vertu de la *Loi sur les espèces en péril* au Canada depuis le 8 décembre 2023 (Loi sur les espèces en péril, 2002). Cette baisse est majoritairement due à l'utilisation croissante d'herbicides, qui réduit la présence des asclépiades. Or, la disponibilité de ces plantes est cruciale pour le développement des papillons monarques (U.S. NATIONAL PARK SERVICE, 2023).

En plus de la diminution des populations de sa plante hôte, l'asclépiade, le monarque est également affecté par d'autres facteurs tant biotiques qu'abiotiques, dont les changements climatiques. En effet, le taux de recrutement de *Danaus plexippus* (le taux d'individus arrivant à leur maturité) est négativement affecté par des variations de température : la chaleur ou la sécheresse réduisent l'espérance de vie et le taux de reproduction du monarque, tandis que des conditions trop fraîches ou humides réduisent sa durée de croissance et son taux de ponte (RAGAB et al., 2025 ; RICH et al., 2025). Ainsi, dans chacun des scénarios qu'ils ont évalués, RAGAB et al. projettent une réduction à long terme de l'habitat stable de *Danaus plexippus* par rapport aux modèles à long terme, tant en considérant des scénarios à fortes et à faibles émissions de gaz à effet de serre (GES).

Dans un contexte où de multiples freins affectent le cycle de développement de *Danaus plexippus*, il est important d'évaluer la présence du monarque, notamment en milieu urbain. Dans un tel environnement, les conditions de vie de *Danaus plexippus* diffèrent grandement de celles en milieu rural,

entre autres sur le plan thermique, la présence de surfaces artificielles en milieu urbain engendrant des îlots de chaleur (BATOOL et al., 2024). De plus, le couvert végétal y est significativement plus épars qu'en milieu rural : à Montréal, en 2018, les milieux forestiers et humides représentaient une superficie combinée de 43 km<sup>2</sup> sur un territoire de 625 km<sup>2</sup>, soit environ 7 % du territoire montréalais, une proportion à la baisse depuis 1994. À la même date, les surfaces artificielles y représentaient 449 km<sup>2</sup>, soit environ 72 % de la même région, en hausse depuis 1994. En comparaison, pour les régions du Québec méridional dont les données de couverture dans les années 2010 sont disponibles, les milieux forestiers et humides et les surfaces artificielles représentaient respectivement environ 72 % et 2 % du territoire (BEAUREGARD-DESJARDINS et al., 2024).

## La corrélation spatiale croisée

La corrélation croisée entre deux espèces  $A$  et  $B$  permet de mesurer le caractère attractif ou répulsif de l'interaction entre  $A$  et  $B$ . Pour ce faire, il est possible d'utiliser l'*indice de Ripley bivarié*, qui mesure l'aire équivalente  $K_{AB}(r)$  du nombre d'individus moyen de l'espèce  $B$  présents dans un rayon  $r$  d'un individu de l'espèce  $A$ , dans une zone d'étude donnée. Pour une zone d'étude d'aire  $W$  ayant  $N_A$  individus de l'espèce  $A$  et  $N_B$  individus de l'espèce  $B$ ,

$$K_{AB}(r) = \frac{|W|}{N_A N_B} \sum_{b \in B} \sum_{a \in A} \mathbf{1}(d(a,b) \leq r) \frac{L(c(a,r))}{L(c(a,r) \cap W)}$$

où  $|W|$  est l'aire de  $W$ ,  $d(a,b)$  est la distance entre  $a$  et  $b$ ,  $c(a,r)$  est un cercle de rayon  $r$  centré en  $a$ ,  $L(x)$  est la longueur de  $x$ , et

$$\mathbf{1}(\text{condition}) = \begin{cases} 1 & \text{si la condition est vraie,} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Si un point  $a \in A$  est à une distance inférieure à  $r$  du bord de la zone d'étude  $W$ , on applique ici une *correction isotrope* en multipliant le poids  $\mathbf{1}(d(a,b) \leq r)$  de chaque paire de points  $(a,b)$  par l'inverse de la proportion du périmètre du cercle  $c(a,r)$  qui est contenue dans  $W$ , afin de mitiger les effets de bord.

Si la distribution de l'espèce  $B$  est complètement spatialement aléatoire (CSR, *completely spatially random*), et peut donc être décrite par un processus de Poisson ponctuel de densité  $\lambda_B = N_B/|W|$ , la valeur attendue du nombre d'individus de  $B$ , dans un rayon  $r$  d'un individu de l'espèce  $A$ ,  $n_B$ , est  $\pi r^2 \lambda_B$ . Pour un modèle CSR, la valeur attendue de  $K_{AB}(r)$  est donc  $\pi r^2$ . Par conséquent, à l'échelle d'un rayon  $r$ ,  $K_{AB}(r) > \pi r^2$  est indicatif d'une attraction de l'espèce  $B$  par la présence de l'espèce  $A$  et, *a contrario*,  $K_{AB}(r) < \pi r^2$  est indicatif d'une répulsion de l'espèce  $B$  par la présence de l'espèce  $A$ .

Il est également possible de normaliser  $K_{AB}(r)$  par rapport au modèle CSR, selon  $K_{AB}^*(r) = K_{AB}(r)/\pi r^2$ . Dans un tel cas,  $K_{AB}^*(r) > 1$  est indicatif d'une attraction de l'espèce  $B$  par la présence de l'espèce  $A$ , tandis que  $K_{AB}^*(r) < 1$  est indicatif d'une répulsion de l'espèce  $B$  par la présence de l'espèce  $A$ . En général, à mesure que  $r$  augmente,  $K_{AB}(r)$  tend vers  $\pi r^2$  : en effet, une proportion de plus en plus grande de la zone d'étude est évaluée pour chaque individu de  $A$ , et  $K_{AB}^*(r)$  tend vers 1.

## Méthode

Les occurrences du *Global Biodiversity Information Facility* correspondant au règne Plantae ou à l'ordre Lepidoptera dans l'agglomération de Montréal (GADM, 2022; GBIF.ORG, 2025) ont été téléchargées, et les observations datant de ou d'après 2020 et ayant des coordonnées ont été retenues. Deux groupes d'espèces, **A** (plantes) et **B** (lépidoptères) ont été formés comme suit :

- **A** : *Asclepias syriaca*, *Asclepias incarnata*, *Arctium lappa*, *Solidago canadensis* ;
- **B** : *Danaus plexippus*, *Limenitis archippus*.

Les coordonnées des points, initialement exprimées en WGS84 (EPSG:4326), ont été projetées en NAD83(SCRS)/MTM fuseau 8 (EPSG:2950) afin de minimiser la distorsion. Pour chacune des paires d'espèces  $(A,B) \in \mathbf{A} \times \mathbf{B}$ , l'indice de Ripley bivarié  $K_{AB}(r)$  a été calculé pour une plage de valeurs de  $r$  d'environ 0 à 8000 m, en considérant l'étendue géographique des occurrences et en appliquant une correction isotrope. Pour chacune des paires, un indice normalisé par rapport au modèle CSR,  $K_{AB}^*(r)$ , a également été calculé, selon  $K_{AB}^*(r) = K_{AB}(r)/\pi r^2$ .

Un nuage de points des occurrences par espèce a été produit en ajoutant le contour de l'agglomération de Montréal afin d'obtenir une représentation visuelle de la répartition de *Danaus plexippus* à l'intérieur de cette dernière (figure 1). De plus, pour chacune des paires  $(A,B)$ , un graphique de  $K_{AB}(r)$  a été produit en tenant compte de toutes les valeurs de  $r$  (figure 2). Afin de mieux visualiser les corrélations pour des valeurs de  $r$  faibles (interactions à courte portée), un second graphique de  $K_{AB}(r)$  a été produit pour  $r \leq 1$  km (figure 3).

De même, pour chacune des paires  $(A,B)$ , un graphique de  $K_{AB}^*(r)$  a été produit en tenant compte de toutes les valeurs de  $r$  supérieures à 50 m (figure 4). En effet, étant donné que  $K_{AB}^*(r)$  tend vers  $\infty$  à mesure que  $r$  tend vers 0, écarter les points où  $r < 50$  m permet une meilleure résolution verticale du graphique. Afin de mieux visualiser les corrélations pour des valeurs de  $r$  faibles (interactions à courte portée), un graphique de  $K_{AB}^*(r)$  a été produit pour  $50 \text{ m} \leq r \leq 1 \text{ km}$  (figure 5). De même, dans le but de mieux visualiser les corrélations pour des valeurs de  $r$  élevées (interactions à longue portée), un graphique de  $K_{AB}^*(r)$  a été produit pour  $r \geq 1 \text{ km}$  en écartant les valeurs de  $K_{AB}^*(r)$  élevées associées à des valeurs de  $r$  faibles (figure 6).

## Résultats

FIGURE 1 : Occurrences de diverses espèces végétales et de lépidoptères sur l'île de Montréal depuis 2020




FIGURE 2 : Corrélation entre les espèces




FIGURE 3 : Corrélation entre les espèces pour  $r \leq 1$  km






FIGURE 4 : Corrélation normalisée entre les espèces pour  $r \geq 50$  m




FIGURE 5 : Corrélation normalisée entre les espèces pour  $50 \text{ m} \leq r \leq 1 \text{ km}$





FIGURE 6 : Corrélation normalisée entre les espèces pour  $r \geq 1$  km



## Énoncé des résultats

Pour chacune des paires d'espèces  $(A, B) \in \mathbf{A} \times \mathbf{B}$ , une corrélation positive ( $K_{AB}^*(r) > 1$ ) est présente pour toutes les valeurs de  $r$ .

## Discussion

TODO

Le lien écologique entre le papillon monarque et les asclépiades est bien documenté, mais les villes introduisent des facteurs supplémentaires à considérer. Ces deux espèces ne sont pas également réparties sur un territoire précis. L'analyse s'intéresse aux monarques sur l'île de Montréal, où l'on trouve de nombreux obstacles tels que la fragmentation du paysage, la densité des infrastructures

et la variabilité des microclimats, qui influencent directement la distribution des espèces.

## Conclusion

## Médiagraphie

- ABASS, M., & VASSEUR, L. (2025). Testing germination of common milkweed (*Asclepias syriaca*) from different study sites in the Niagara Region. *Botany*, 103, 1-6. <https://doi.org/10.1139/cjb-2024-0080>
- BATOOL, R., JENAN, J., SCHUSTER, M., & MURRAY, R. L. (2024). How do latitude and urban heat islands affect larval melanization in monarch butterflies (*Danaus plexippus*)? *Canadian Journal of Zoology*, 102(3), 315-321. <https://doi.org/10.1139/cjz-2023-0099>
- BEAUREGARD-DESJARDINS, P., KEITH, M., & ROY-MILLIARD, S. (2024). *Comptes des terres du Québec méridional* (M. MONSENGO, Éd. ; Édition 2024). Institut de la statistique du Québec. <https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/comptes-terres-quebec-meridional-2024.pdf>
- BOYLE, J. H., DALGLEISH, H. J., & PUZEY, J. R. (2019). Monarch butterfly and milkweed declines substantially predate the use of genetically modified crops. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(8), 3006-3011. <https://doi.org/10.1073/pnas.1811437116>
- COSEWIC. (2016). *COSEWIC assessment and status report on the Monarch Danaus plexippus in Canada*. Environment and Climate Change Canada. <https://publications.gc.ca/site/eng/9.832848/publication.html>
- GADM. (2022, juillet). *Global Administrative Areas* (Version 4.1). <https://gadm.org/data.html>
- GBIF.ORG. (2025, octobre). *GBIF Occurrence Download*. The Global Biodiversity Information Facility. <https://doi.org/10.15468/dl.nvd6f9>
- Loi sur les espèces en péril (2002, décembre). <https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/s-15.3/page-10.html>
- LUNA, T., & DUMROESE, R. K. (2013). Monarchs (*Danaus plexippus*) and milkweeds (*Asclepias* species) : The Current Situation and Methods for Propagating Milkweeds. *Native Plants Journal*, 14(1), 5-16. <https://doi.org/10.3368/npj.14.1.5>
- RAGAB, S. H., TYSHENKO, M. G., & HALMY, M. W. A. (2025). Impact of climate change on the habitat range of monarch butterfly (*Danaus plexippus*). *Scientific Reports*, 15(1), 32654. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-17443-x>
- RICH, M., KESSELRING, J. H., GARCIA, A., WALLIN, D., & FEDORKA, K. M. (2025). The impact of temperature on the reproductive development, body condition and mortality of autumn migrating monarch butterflies in the laboratory. *Royal Society Open Science*, 12(8), 250343. <https://doi.org/10.1098/rsos.250343>
- U.S. NATIONAL PARK SERVICE. (2023, mars). *Milkweed and Monarchs*. U.S. National Park Service. <https://www.nps.gov/articles/000/milkweed-and-monarchs.htm>