


**Définitions :**

Une **semi-droite graduée** est une demi-droite qui a :

- un point appelé **origine** ;
- une **unité de longueur** reportée régulièrement à partir de l'origine ;
- un **sens**.



Un point peut alors être repéré par un nombre appelé son **abscisse**. L'abscisse d'un point est sa **distance à l'origine**.




L'abscisse de M est 5. On note **M(5)**.

**Méthode :** Trouver l'abscisse du point A.

- 1 Je calcule l'écart entre deux points dont je connais l'abscisse.


➡ $35 - 15 = 20$.

L'écart est de 20.



- 2 Je compte le nombre d'intervalles qu'il y a entre ces deux points.

➡ Il y a 4 intervalles.




- 3 Je calcule la valeur d'un intervalle (le pas).

➡ $20 \div 4 = 5$. Le pas est 5 unités.

- 4 J'ajoute la valeur de l'intervalle autant de fois que nécessaire pour trouver l'abscisse.


➡ L'abscisse de A est 30.

Je peux noter A(30).



❑ Donne l'abscisse du point B : _____

❑ Place le point C d'abscisse 130.

**Critères de réussite**

- J'ai trouvé la valeur d'un intervalle.
- J'ai correctement trouvé l'abscisse ou placé le point.
- J'ai utilisé une notation correcte ou j'ai fait une phrase réponse sans faute d'orthographe au mot abscisse.

