
a
SESOI
Δ (95% CI)
H1 A vs R, pooled thick sites (179 scans) +0.025 (+0.010 to +0.039)
MS3SEG (100) +0.026 (+0.008 to +0.044)
Muslim (51) +0.025 (−0.002 to +0.052)
PediMS (28 scans, 9 children) +0.018 (−0.030 to +0.056)
S6 A vs R, strict matching (IoU ≥ 0.10) +0.018 (+0.002 to +0.033)
S6 A vs R, without PediMS P9 +0.025 (+0.010 to +0.039)
B vs R (fine-tuning, no augmentation) +0.030 (+0.016 to +0.044)
H3 A vs B (augmentation effect) −0.005 (−0.017 to +0.006)
S4 A vs E (5-fold ensemble) +0.000 (−0.013 to +0.013)
−0.05 0 +0.05
ΔF1, A − R (thick sites)
b
margin
Ratio (95% CI)
0.81 (0.76–0.86)
0.87 (0.80–0.94)
0.77 (0.68–0.87)
0.67 (0.54–0.75)
0.83 (0.79–0.89)
0.81 (0.76–0.86)
0.73 (0.69–0.78)
1.11 (1.05–1.18)
0.98 (0.92–1.05)
0.6 0.8 1.0 1.2
False-lesion ratio
c
−0.03 F1
−0.02 Dice
H2 Pooled 1-mm sites, Δ Dice (32 scans) −0.004 (−0.063 to +0.054)
Pooled 1-mm sites, ΔF1 −0.022 (−0.084 to +0.034)
Ljubljana-10 only, Δ Dice (point) −0.172
Ljubljana-10 only, ΔF1 (point) −0.181
−0.25 −0.20 −0.15 −0.10 −0.05 0 +0.05
Difference, A − R (~1-mm sites)