
a
v3 · pooled leave-one-cohort-out, MSLesSeg ↔ Ljubljana-10
AUROC (95% CI)
Raw fold-0 probability
V3-LR (primary)
V3-GB
V2 as shipped (earlier version)
0.728 (0.703–0.754)
0.742 (0.716–0.772)
0.689 (0.662–0.718)
0.639 (0.611–0.668)
b
v3.1 · three unseen thick-slice sites
Raw fold-0 probability
5-fold ensemble mean
GR-LR (primary)
Ensemble candidates: ensemble mean (post hoc)
Ensemble candidates: GR-LR (post hoc)
0.721 (0.703–0.740)
0.789 (0.774–0.802)
0.832 (0.818–0.846)
0.796 (0.781–0.812)
0.809 (0.794–0.825)
c
v3.2 · 1-mm MS lesions vs healthy-control false candidates
5-fold ensemble mean
Fold disagreement (no training)
GR-LR (v3.1 detector)
GR+C-LR (primary, trained with controls)
Cohort probe (never saw a true lesion)
Controls-only negatives (GR-Conly-LR)
0.805 (0.764–0.846)
0.852 (0.821–0.883)
0.795 (0.757–0.832)
0.822 (0.787–0.857)
0.833 (0.794–0.866)
0.914 (0.890–0.935)
0.60
0.70
0.80
0.90
Lesion-level AUROC