

FONCTIONS ZÊTA SUR GL_n

1. FONCTIONS ZÊTA SUR $GL_1(\mathbb{Q}_p)$

Cette section décrit la théorie de Tate [2] des fonctions zêta sur $GL_1(\mathbb{Q}_p)$. Dans la section 2, on aura besoin de supposer que $n > 1$ et on aura aussi besoin des résultats pour $n = 1$.

1.1. Caractères de \mathbb{Q}_p . Commençons par décrire l'ensemble des caractères de \mathbb{Q}_p . Pour ce faire, on dispose du

Lemme 1. *Soit ψ un caractère non trivial de \mathbb{Q}_p , alors les caractères de \mathbb{Q}_p sont de la forme $x \mapsto \psi(xy)$ avec $y \in \mathbb{Q}_p$.*

Pour avoir une description complète des caractères de \mathbb{Q}_p , il ne nous reste plus qu'à exhiber un caractère non trivial.

Soit $x \in \mathbb{Q}_p$, alors il existe $\mu \in \mathbb{N}$ tel que $p^\mu x \in \mathbb{Z}_p$. On note m l'entier tel que $m = p^\mu x \pmod{p^\mu}$. On pose alors $\lambda(x) = \frac{m}{p^\mu}$, c'est un rationnel bien déterminé mod 1. L'application $x \mapsto e^{2i\pi\lambda(x)}$ est un caractère non trivial de \mathbb{Q}_p .

On note $\mathcal{S}(\mathbb{Q}_p)$ l'ensemble des fonctions $\phi : \mathbb{Q}_p \rightarrow \mathbb{C}$ localement constantes à support compact, on l'appelle l'espace de Schwartz de \mathbb{Q}_p .

Pour $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{Q}_p)$, on définit la transformée de Fourier de ϕ par la formule

$$(1) \quad \hat{\phi}(y) = \int_{\mathbb{Q}_p} \phi(x) e^{-2i\pi\lambda(xy)} dx, y \in \mathbb{Q}_p,$$

où dx est une mesure de Haar sur \mathbb{Q}_p . On choisit la mesure de Haar de façon à avoir la formule d'inversion $\hat{\hat{\phi}}(x) = \phi(-x)$.

1.2. Fonctions zêta, équation fonctionnelle.

Définition 1. *Pour $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{Q}_p)$, ω caractère de \mathbb{Q}_p^\times et $s \in \mathbb{C}$, on pose*

$$(2) \quad \zeta(\omega, \phi, s) = \int_{\mathbb{Q}_p^\times} \phi(x) \omega(x) |x|_p^s d^\times x,$$

où $d^\times x$ est une mesure de Haar sur \mathbb{Q}_p^\times . On choisit la mesure de Haar normalisée de telle façon à avoir $\text{vol}(\mathbb{Z}_p^\times) = 1$.

Lemme 2. *L'intégrale définissant la fonction zêta est absolument convergente pour $\text{Re}(s)$ assez grand.*

Démonstration. Quitte à remplacer ω par $\omega \cdot |\cdot|_p^{-s_0}$, on peut supposer que ω est unitaire. On sépare l'intégrale en deux selon une intégrale pour $|x|_p > 1$ et l'autre pour $|x|_p \leq 1$.

Pour ce qui est de la première intégrale, elle est absolument convergente car ϕ est à support compact. Quant à la seconde intégrale, elle est bornée par

$$(3) \quad \int_{|x|_p \leq 1} |x|_p^{\text{Re}(s)} dx = \sum_{i=0}^{\infty} p^{-i\text{Re}(s)},$$

à une constante près, car ϕ est bornée. Cette dernière intégrale est convergente pour $\text{Re}(s) > 0$. \square

Dans la suite, on veut montrer que les fonctions zêta peuvent être prolongées analytiquement en des fonctions méromorphes. On montre aussi que les fonctions zêta vérifient une équation fonctionnelle. On commence par le

Lemme 3. *Soit $\phi_1, \phi_2 \in \mathcal{S}(\mathbb{Q}_p)$, ω un caractère de \mathbb{Q}_p^\times et $s \in \mathbb{C}$. Alors*

$$(4) \quad \zeta(\omega, \phi_1, s) \zeta(\omega^{-1}, \hat{\phi}_2, 1-s) = \zeta(\omega^{-1}, \hat{\phi}_1, 1-s) \zeta(\omega, \phi_2, s),$$

cette équation étant valable dans le domaine d'absolue convergence.

Démonstration. Développons le membre de gauche,

$$(5) \quad \begin{aligned} \zeta(\omega, \phi_1, s) \zeta(\omega^{-1}, \hat{\phi}_2, 1-s) &= \int_{(\mathbb{Q}_p^\times)^2} \phi_1(x_1) \hat{\phi}_2(x_2) \omega(x_1 x_2^{-1}) |x_1 x_2|_p^s |x_2|_p d^\times x_1 d^\times x_2 \\ (6) \quad &= \int_{(\mathbb{Q}_p^\times)^2} \phi_1(x_1) \hat{\phi}_2(x_1 x_2) \omega(x_2^{-1}) |x_2|_p^{-s} |x_1 x_2|_p d^\times x_1 d^\times x_2 \end{aligned}$$

On ne considère maintenant que la partie qui dépend de la variable x_1 et on utilise la formule définissant la transformée de Fourier, on obtient

$$(7) \quad \int_{\mathbb{Q}_p^\times} \phi_1(x_1) \hat{\phi}_2(x_1 x_2) |x_1|_p d^\times x_1$$

$$(8) \quad = \int_{\mathbb{Q}_p^\times} \int_{\mathbb{Q}_p} \phi_1(x_1) \phi_2(y) |x_1|_p e^{2i\pi\lambda(x_1 x_2 y)} dy d^\times x_1$$

$$(9) \quad = \int_{(\mathbb{Q}_p)^2} \phi_1(x_1) \phi_2(y) e^{2i\pi\lambda(x_1 x_2 y)} dy dx_1$$

$$(10) \quad = \int_{\mathbb{Q}_p^\times} \hat{\phi}_1(x_1 x_2) \phi_2(x_1) |x_1|_p d^\times x_1$$

D'autre part, en développant le membre de droite de l'équation, on a

$$(11) \quad \zeta(\omega^{-1}, \hat{\phi}_1, 1-s) \zeta(\omega, \phi_2, s) = \int_{(\mathbb{Q}_p^\times)^2} \hat{\phi}_1(x_1 x_2) \phi_2(x_1) |x_1|_p \omega(x_2^{-1}) |x_2|_p^{1-s} d^\times x_1 d^\times x_2.$$

On en déduit l'égalité avec $\zeta(\omega, \phi_1, s) \zeta(\omega^{-1}, \hat{\phi}_2, 1-s)$. \square

On démontre maintenant le

Théorème 1. *Soit $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{Q}_p)$, ω un caractère de \mathbb{Q}_p^\times et $s \in \mathbb{C}$. La fonction $\zeta(\phi, \omega, \cdot)$ peut être prolongée analytiquement en une fonction méromorphe sur \mathbb{C} . De plus, elle vérifie*

$$(12) \quad \zeta(\omega, \phi, s) = \gamma(\omega, s) \zeta(\omega^{-1}, \hat{\phi}, 1-s),$$

où γ est une fonction méromorphe indépendante de ϕ .

Démonstration. On suppose tout d'abord que l'équation (12) est vérifiée pour une fonction $\phi_0 \in \mathcal{S}(\mathbb{Q}_p)$ telle que le quotient $\frac{\zeta(\omega, \phi_0, s)}{\zeta(\omega^{-1}, \hat{\phi}_0, 1-s)}$ est défini. D'après le lemme

(3), on en déduit que

$$(13) \quad \zeta(\omega, \phi, s) = \gamma(\omega, s) \zeta(\omega, \hat{\phi}, 1-s),$$

où $\gamma(\omega, s) = \frac{\zeta(\omega, \phi_0, s)}{\zeta(\omega^{-1}, \hat{\phi}_0, 1-s)}$. Ce qui montre l'équation fonctionnelle pour toutes les fonctions $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{Q}_p)$. La suite de cette section, on montre que cette fonction ϕ_0 existe bien et on calcule le facteur γ . \square

1.3. Calcul du facteur γ . Le caractère ω est trivial sur un ensemble de la forme $1 + \mathfrak{p}^m \mathbb{Z}_p$, on suppose m minimal pour cette propriété. L'entier \mathfrak{p}^m est appelé le conducteur de ω .

On choisi alors pour ϕ_0 la fonction telle que $\phi_0(x) = e^{2i\pi\lambda(x)}$ si $x \in \mathfrak{p}^{-m} \mathbb{Z}_p$ et $\phi_0(x) = 0$ sinon.

Lemme 4.

$$(14) \quad \hat{\phi}_0(x) = \begin{cases} \mathfrak{p}^m & \text{si } x = 1 \pmod{\mathfrak{p}^m}, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Dans le cas où le caractère ω est non ramifié, $m = 0$,

$$(15) \quad \zeta(\omega, \phi_0, s) = \frac{1}{1 - \omega(\mathfrak{p})\mathfrak{p}^{-s}},$$

$$(16) \quad \zeta(\omega^{-1}, \hat{\phi}_0, 1-s) = \frac{1}{1 - \omega(\mathfrak{p})^{-1}\mathfrak{p}^{s-1}},$$

$$(17) \quad \gamma(\omega, s) = \frac{1 - \omega(\mathfrak{p})^{-1}\mathfrak{p}^{s-1}}{1 - \omega(\mathfrak{p})\mathfrak{p}^{-s}}.$$

Dans le cas ramifié, $m > 0$,

$$(18) \quad \zeta(\omega, \phi_0, s) = \mathfrak{p}^{-ms} \int_{\mathfrak{p}^{-m} \mathbb{Z}_p} \omega(x) e^{2i\pi\lambda(x)} dx,$$

$$(19) \quad \zeta(\omega, \hat{\phi}_0, s) = \int_{1 + \mathfrak{p}^m \mathbb{Z}_p} dx,$$

$$(20) \quad \gamma(\omega, s) = c \mathfrak{p}^{-ms},$$

où c est une constante non nulle.

Pour finir cette partie sur $GL_1(\mathbb{Q}_p)$, on définit la fonction L d'un caractère ω .

Définition 2. Lorsque ω est non ramifié, on pose

$$(21) \quad L(\omega, s) = \frac{1}{1 - \omega(\mathfrak{p})\mathfrak{p}^{-s}}.$$

Si ω est ramifié, on pose $L(\omega, s) = 1$.

La proposition suivante nous sera utile dans la suite.

Proposition 1. Le quotient $\frac{\zeta(\omega, \phi, s)}{L(\omega, s)}$ est un polynôme en \mathfrak{p}^s et \mathfrak{p}^{-s} .

Démonstration. Dans le cas ramifié,

$$(22) \quad \zeta(\omega, \phi, s) = \sum_{i=1}^{\mathfrak{p}^m-1} \int_{1 + \mathfrak{p}^m \mathbb{Z}_p} \phi(x_i x) \omega(x_i x) |x_i|_p^s d^\times x,$$

où (x_i) est un système de représentant de $\mathbb{Q}_p^\times / (1 + \mathfrak{p}^m \mathbb{Z}_p)$. C'est un polynôme en \mathfrak{p}^s et \mathfrak{p}^{-s} .

Dans le cas non ramifié, on écrit $\phi = \phi_1 + \alpha \phi_0$, avec $\phi_1(0) = 0$ et $\alpha = \phi(0)$. Alors le support de ϕ_1 est inclus dans un nombre fini d'ensembles de la forme $\mathfrak{p}^i \mathbb{Z}_p^\times$. On en déduit que $\zeta(\omega, \phi_1, s)$ est un polynôme en \mathfrak{p}^s et \mathfrak{p}^{-s} . D'autre part,

on a $\zeta(\omega, \phi_0, s) = L(\omega, s)$. Ce qui nous permet de conclure que le quotient $\frac{\zeta(\omega, \phi, s)}{L(\omega, s)}$ est un polynôme en p^s et p^{-s} . \square

2. FONCTIONS ZÊTA SUR $GL_n(\mathbb{Q}_p)$, $n > 1$

Dans la suite, on notera $G = GL_n(\mathbb{Q}_p)$, dg une mesure de Haar sur G et (π, V) une représentation admissible irréductible de G . On pose $K = GL_n(\mathbb{Z}_p)$, c'est un sous-groupe compact maximal de G .

Définition 3. Une représentation $\pi : G \rightarrow GL(V)$ sur un \mathbb{C} -espace vectoriel V est dite admissible si elle vérifie :

- Pour tout $v \in V$, le stabilisateur de v dans G , $\{g \in G, \pi(g)v = v\}$, est un sous-groupe ouvert de G ,
- Pour tout sous-groupe ouvert H de G , le sous-espace

$$V^H = \{v \in V, \pi(h)v = v, \forall h \in H\}$$

des vecteurs stable par H est de dimension fini.

Les coefficients de π sont les fonctions de la forme $g \in G \mapsto \langle \pi(g)v, \tilde{v} \rangle$, où $v \in V$ et $\tilde{v} \in \tilde{V}$. Alors $\check{f}(g) = f(g^{-1}) = \langle v, \tilde{\pi}(g)\tilde{v} \rangle$ est un coefficient de $\tilde{\pi}$.

On note M_n l'ensemble des matrices $n \times n$ à coefficients dans \mathbb{Q}_p et \mathcal{S} l'ensemble des fonctions $\phi : M_n \rightarrow \mathbb{C}$ localement constantes à support compact.

Si f est un coefficient de π , $\phi \in \mathcal{S}$ et $s \in \mathbb{C}$, on pose

$$(23) \quad \zeta(f, \phi, s) = \int_G \phi(g)f(g)|\det g|_p^s dg.$$

On fixe un caractère non trivial ψ de \mathbb{Q}_p et on pose

$$(24) \quad \hat{\phi}(y) = \int_{M_n} \phi(x)\psi(\text{Tr}(xy))dx,$$

où dx est une mesure de Haar sur M_n , normalisée telle que $\hat{\hat{\phi}}(x) = \phi(-x)$.

L'objectif de cette section est de montrer le

Théorème 2. (1) Il existe $s_0 \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $s \in \mathbb{C}$ vérifiant $\text{Re}(s) > s_0$, $\phi \in \mathcal{S}$ et f un coefficient de π , les intégrales

$$(25) \quad \zeta(f, \phi, s) = \int_G \phi(g)f(g)|\det g|_p^s dg$$

$$(26) \quad \zeta(\check{f}, \phi, s) = \int_G \phi(g)\check{f}(g)|\det g|_p^s dg$$

convergent absolument.

(2) Ces intégrales sont des fonctions rationnelles en p^{-s} . Plus précisément, il existe des polynômes Q et \tilde{Q} indépendant de f et ϕ avec $Q(0) \neq 0$ (respectivement $\tilde{Q}(0) \neq 0$) et des polynômes $\Xi(f, \phi, s)$, $\tilde{\Xi}(\check{f}, \phi, s)$ en p^s et p^{-s} tel que

$$(27) \quad \zeta(f, \phi, s + \frac{1}{2}(n-1)) = \frac{\Xi(f, \phi, s)}{Q(p^{-s})},$$

$$(28) \quad \zeta(\check{f}, \phi, s + \frac{1}{2}(n-1)) = \frac{\tilde{\Xi}(\check{f}, \phi, s)}{\tilde{Q}(p^{-s})},$$

pour tout $s \in \mathbb{C}$, $\phi \in \mathcal{S}$ et f coefficient de π .

- (3) On peut choisir un nombre fini, de coefficients f_i de π (respectivement $\tilde{\pi}$) et de fonctions $\phi_i \in \mathcal{S}$, telles que $\sum_i \Xi(f_i, \phi_i, s)$ (respectivement $\sum_i \tilde{\Xi}(f_i, \phi_i, s)$) soit une constante non nulle.
- (4) Il existe une fonction $\epsilon(s, \pi, \psi)$, qui est à une constante près une puissance de p^{-s} , telle que

$$(29) \quad \tilde{\Xi}(\check{f}, \hat{\phi}, 1-s) = \epsilon(s, \pi, \psi) \Xi(f, \phi, s),$$

pour tout $s \in \mathbb{C}$, $\phi \in \mathcal{S}$ et f coefficient de π .

Les conditions (2) et (3) caractérisent (à constante près) les polynômes Q et \tilde{Q} . On normalise Q et \tilde{Q} tel que $Q(0) = \tilde{Q}(0) = 1$, on pose alors

$$(30) \quad L(s, \pi) = \frac{1}{Q(p^{-s})}, \quad L(s, \tilde{\pi}) = \frac{1}{\tilde{Q}(p^{-s})}.$$

L'existence de la fonction $\epsilon(s, \pi, \psi)$ est équivalente à l'existence d'une fonction méromorphe $\gamma(s, \pi, \psi)$ telle que

$$(31) \quad \zeta(\check{f}, \hat{\phi}, 1-s + \frac{1}{2}(n-1)) = \gamma(s, \pi, \psi) \zeta(f, \phi, s),$$

pour tout $\phi \in \mathcal{S}$ et f coefficient de π . Ces deux fonctions étant reliées par la relation

$$(32) \quad \epsilon(s, \pi, \psi) = \gamma(s, \pi, \psi) \frac{L(s, \pi)}{L(1-s, \tilde{\pi})}.$$

En effet, supposons l'existence de $\gamma(s, \pi, \psi)$ alors $\epsilon(s, \pi, \psi)$ vérifie

$$(33) \quad \tilde{\Xi}(\check{f}, \hat{\phi}, 1-s) = \epsilon(s, \pi, \psi) \Xi(f, \phi, s).$$

On a de plus une égalité similaire avec $\epsilon(s, \tilde{\pi}, \psi)$,

$$(34) \quad \Xi(f, s, \hat{\phi}, s) = \epsilon(1-s, \tilde{\pi}, \psi) \tilde{\Xi}(\check{f}, \hat{\phi}, 1-s).$$

Il ne nous reste plus qu'à utiliser la formule $\hat{\phi}(x) = \phi(-x)$ pour obtenir la relation

$$(35) \quad \epsilon(s, \pi, \psi) \epsilon(1-s, \tilde{\pi}, \psi) = \omega(-1),$$

où ω est le caractère de \mathbb{Q}_p^\times tel que $\pi(z) = \omega(z)1$ pour $z \in \mathbb{Q}_p^\times$. D'après (2) et (3) du théorème, $\epsilon(s, \pi, \psi)$ est alors un polynôme en p^s et p^{-s} , on en déduit que $\epsilon(s, \pi, \psi)$ est une puissance de p^{-s} à constante près.

2.1. Réduction au cas supercuspidal. Si π est une représentation admissible (non nécessairement irréductible) de G , les assertions du théorème font sens pour π et $\tilde{\pi}$, mais peuvent être fausses si π n'est pas irréductible.

Supposons le théorème vrai pour π et $\tilde{\pi}$. Soit σ une sous-représentation irréductible de π . Alors les coefficients de σ sont de la forme $\langle \pi(g)v, \tilde{v} \rangle$ avec $v \in V$ et $\tilde{v} \in \tilde{V}$. Cependant, toutes ces fonctions ne sont pas des coefficients de σ . On en déduit la

Proposition 2. *Il existe des polynômes R et \tilde{R} en p^{-s} tel que*

$$(36) \quad L(s, \sigma) = R(p^{-s})L(s, \pi),$$

$$(37) \quad L(s, \tilde{\sigma}) = p^{-s}L(s, \tilde{\pi}).$$

De plus,

$$(38) \quad \gamma(s, \sigma, \psi) = \gamma(s, \pi, \psi).$$

Soit P un sous-groupe parabolique propre maximal de G et U son radical unipotent alors $P/U \simeq G' \times G''$, où l'on note $G' = GL_{n'}(\mathbb{Q}_p)$ et $G'' = GL_{n''}(\mathbb{Q}_p)$.

Soit σ' (respectivement σ'') une représentation admissible de G' (respectivement G''). On ne les suppose pas irréductible, on suppose cependant qu'ils admettent des caractères centraux ω' et ω'' . Alors $\sigma' \boxtimes \sigma''$ est naturellement une représentation de P/U , donc une représentation de P triviale sur U .

Proposition 3. *Notons $\pi = \text{Ind}_P^G(\sigma' \boxtimes \sigma'')$. Supposons le théorème vrai pour σ' et σ'' . Alors le théorème est vrai pour π . De plus, on a*

$$(39) \quad L(s, \pi) = L(s, \sigma')L(s, \sigma''),$$

$$(40) \quad L(s, \tilde{\pi}) = L(s, \tilde{\sigma}')L(s, \tilde{\sigma}''),$$

$$(41) \quad \epsilon(s, \pi, \psi) = \epsilon(s, \sigma', \psi)\epsilon(s, \sigma'', \psi).$$

Démonstration. On notera $M' = M_{n'}(\mathbb{Q}_p)$ et $M'' = M_{n''}(\mathbb{Q}_p)$. Soit f un coefficient de π , $\phi \in \mathcal{S}$ et $s \in \mathbb{C}$.

L'espace vectoriel V sur lequel π agit est l'espace des fonctions $v : G \rightarrow W$ localement constante qui vérifient

$$(42) \quad v(pg) = \delta_P^{\frac{1}{2}}(p)(\sigma' \boxtimes \sigma'')(p)v(g),$$

où δ_P est le caractère modulaire de P et W est l'espace vectoriel sur lequel $\sigma' \boxtimes \sigma''$ agit.

Le coefficient f est alors de la forme

$$(43) \quad f(g) = \langle \pi(g)v, \tilde{v} \rangle$$

$$(44) \quad = \int_K \langle v(kg), \tilde{v}(k) \rangle_W dk.$$

Posons $t = s + \frac{1}{2}(n-1)$, $t' = s + \frac{1}{2}(n'-1)$ et $t'' = s + \frac{1}{2}(n''-1)$. L'intégrale zêta est donc

$$(45) \quad \zeta(f, \phi, s) = \int_G \phi(g) |\det g|_p^t \int_K \langle v(kg), \tilde{v}(k) \rangle dk dg.$$

On échange l'ordre d'intégration et on fait le changement de variables $g \mapsto k^{-1}g$, on obtient

$$(46) \quad \int_K \int_G \phi(k^{-1}g) |\det g|_p^t \langle v(g), \tilde{v}(k) \rangle dg dk.$$

On utilise la décomposition de Cartan pour écrire $g \in G$ sous la forme $g = \begin{pmatrix} g' & u \\ 0 & g'' \end{pmatrix} k'$, où $g' \in G'$, $g'' \in G''$, $u \in U$ et $k' \in K$. On peut alors décomposer la mesure de Haar de G en fonction des mesures de Haar de G' , G'' , U et K . En effet,

$$(47) \quad dg = |\det g'|^{-n''} dg' dg'' du dk'.$$

L'expression (46) devient

$$(48) \quad \int_K \int_{G' \times G'' \times U \times K} \phi(k^{-1} \begin{pmatrix} g' & u \\ 0 & g'' \end{pmatrix} k') |\det g'|^{t'} |\det g''|^{t''} \\ \langle (\sigma'(g') \boxtimes \sigma''(g''))v(k'), \tilde{v}(k) \rangle dg' dg'' du dk' dk.$$

Le facteur $\langle (\sigma'(g') \boxtimes \sigma''(g''))v(k'), \tilde{v}(k) \rangle$ est un coefficient de $\sigma' \boxtimes \sigma''$, donc est une combinaison linéaire de produits de coefficients de σ' et de coefficients de σ'' :

$$(49) \quad \langle (\sigma'(g') \boxtimes \sigma''(g''))v(k'), \tilde{v}(k) \rangle = \sum_{i=1}^l \lambda_i(k, k') f'_i(g') f''_i(g''),$$

où les fonctions $\lambda_i : K \times K \rightarrow \mathbb{C}$ sont localement constante et les f'_i (respectivement f''_i) sont des coefficients de σ' (respectivement σ'').

D'autre part, la fonction

$$(50) \quad (x' \in M', x'' \in M'') \mapsto \int_U \phi(k^{-1} \begin{pmatrix} x' & u \\ 0 & x'' \end{pmatrix} k) du$$

est un élément de l'espace de Schwartz $\mathcal{S}(M' \times M'')$. On peut donc l'écrire sous la forme

$$(51) \quad \int_U \phi(k^{-1} \begin{pmatrix} x' & u \\ 0 & x'' \end{pmatrix} k) du = \sum_{j=1}^{l'} \mu_j(k, k') \phi'_j(x') \phi''_j(x''),$$

où les μ_j sont localement constantes et $\phi'_j \in \mathcal{S}(M')$ (respectivement $\phi''_j \in \mathcal{S}(M'')$).

En remplaçant ces expressions dans l'intégrale (48), on trouve

$$(52) \quad \zeta(f, \phi, t) = \sum_{i,j=1}^{l,l'} \int_{K \times K} \lambda_i(k, k') \mu_j(k, k') dk dk' \zeta(f'_i, \phi'_j, t') \zeta(f''_i, \phi''_j, t'').$$

D'après les hypothèses faites sur σ' et σ'' , les intégrales définissant les $\zeta(f'_i, \phi'_j, t')$ (respectivement $\zeta(f''_i, \phi''_j, t'')$) sont absolument convergentes pour $\text{Re}(s)$ assez grande. Ce qui justifie à posteriori les calculs que l'on vient de faire et prouve la partie (1) du théorème pour π .

D'après (52) et les hypothèses faites sur σ' et σ'' , on obtient la relation

$$(53) \quad \zeta(f, \phi, s) = \sum_{i,j=1}^{l,l'} c_{i,j} \Xi(f'_i, \phi'_j, s) L(s, \sigma') \Xi(f''_i, \phi''_j, s) L(s, \sigma'').$$

Ce qui prouve la partie (2) du théorème pour π .

Passons à la partie (4) du théorème. La valeur $\zeta(\check{f}, \hat{\phi}, t)$ s'obtient en remplaçant f par \check{f} , ce qui remplace les f'_i et f''_i en \check{f}'_i et \check{f}''_i , et ϕ en $\hat{\phi}$. Voyons maintenant comment ce dernier changement affecte l'intégrale. Montrons que l'équation (51) se transforme en

$$(54) \quad \int_U \hat{\phi}(k'^{-1} \begin{pmatrix} x' & u \\ 0 & x'' \end{pmatrix} k) du = \sum_{j=1}^{l'} \mu_j(k, k') \hat{\phi}'_j(x') \hat{\phi}''_j(x'').$$

En effet,

(55)

$$\begin{aligned} \int_{\mathbf{u}} \hat{\phi}(\mathbf{k}'^{-1} \begin{pmatrix} \mathbf{x}' & \mathbf{u} \\ 0 & \mathbf{x}'' \end{pmatrix} \mathbf{k}) d\mathbf{u} &= \int_{\mathbf{u}} \int_{\mathbf{M}_n} \phi(\mathbf{k}^{-1} \mathbf{x} \mathbf{k}') \psi(\text{Tr} \begin{pmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 \\ \mathbf{x}_3 & \mathbf{x}_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{x}' & \mathbf{u} \\ 0 & \mathbf{x}'' \end{pmatrix}) d\mathbf{x} d\mathbf{u} \\ (56) \qquad \qquad \qquad &= \int \phi(\mathbf{k}^{-1} \begin{pmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 \\ 0 & \mathbf{x}_4 \end{pmatrix} \mathbf{k}') \psi(\mathbf{x}_1 \mathbf{x}' + \mathbf{x}_4 \mathbf{x}'') d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 d\mathbf{x}_4 \end{aligned}$$

$$(57) \qquad \qquad \qquad = \sum_{j=1}^{l'} \mu_j(\mathbf{k}, \mathbf{k}') \hat{\phi}'_j(\mathbf{x}') \hat{\phi}''_j(\mathbf{x}'').$$

La première égalité s'obtient en considérant la transformée de Fourier en les variables $(\mathbf{x}_3, \mathbf{u})$. La dernière s'obtient en appliquant la transformée de Fourier sur $\mathbf{M}' \times \mathbf{M}''$ à l'équation (51).

Ces considérations nous donnent une égalité similaire à (52),

(58)

$$\zeta(\check{\mathbf{f}}, \phi, 1-s+\frac{1}{2}(n-1)) = \sum_{i,j=1}^{l,l'} c_{i,j} \Xi(\check{\mathbf{f}}'_i, \hat{\phi}'_j, 1-s) L(1-s, \tilde{\sigma}') \Xi(\check{\mathbf{f}}''_i, \hat{\phi}''_j, 1-s) L(1-s, \tilde{\sigma}'').$$

On obtient ainsi l'équation fonctionnelle

$$(59) \qquad \qquad \qquad \tilde{\Xi}(\check{\mathbf{f}}, \hat{\phi}, 1-s) = \epsilon(s, \sigma', \psi) \epsilon(s, \sigma'', \psi) \Xi(\mathbf{f}, \phi, s),$$

on en déduit que $\epsilon(s, \pi, \psi) = \epsilon(s, \sigma', \psi) \epsilon(s, \sigma'', \psi)$ et la partie (4) du théorème pour π .

Il ne reste plus qu'à prouver la partie (3). Il suffit de montrer que si l'on fixe $\phi' \in \mathcal{S}(\mathbf{M}')$, $\phi'' \in \mathcal{S}(\mathbf{M}'')$ et \mathbf{f} (respectivement \mathbf{f}') coefficient de σ' (respectivement σ'') alors il existe $\phi \in \mathcal{S}(\mathbf{M})$ et \mathbf{f} coefficient de π tel que

$$(60) \qquad \qquad \qquad \zeta(\mathbf{f}, \phi, \mathbf{t}) = \zeta(\mathbf{f}', \phi', \mathbf{t}') \zeta(\mathbf{f}'', \phi'', \mathbf{t}'').$$

En effet, le calcul du produit des fonctions zêta $\zeta(\mathbf{f}', \phi', \mathbf{t}') \zeta(\mathbf{f}'', \phi'', \mathbf{t}'')$ donne

$$(61) \qquad \int_{\mathbf{G}' \times \mathbf{G}''} \phi'(g') \phi''(g'') \mathbf{f}'(g') \mathbf{f}''(g'') |\det g'|_p^{t'} |\det g''|_p^{t''} dg' dg''.$$

On choisit alors $\phi \in \mathcal{S}(\mathbf{M})$ de la forme $\begin{pmatrix} \mathbf{x}' & \mathbf{u} \\ \mathbf{v} & \mathbf{x}'' \end{pmatrix} \mapsto \phi'(\mathbf{x}') \phi''(\mathbf{x}'') \phi_0(\mathbf{u}) \phi_1(\mathbf{v})$, où $\phi_1 \in \mathcal{S}(\mathbf{M}_{n'', n'})$ vérifie $\phi_1(0) = 1$ et $\phi_0 \in \mathcal{S}(\mathbf{M}_{n', n''})$ est d'intégrale 1. Avec ce choix, on a

$$(62) \qquad \qquad \qquad \int_{\mathbf{u}} \phi \left(\begin{pmatrix} g' & \mathbf{u} \\ 0 & g'' \end{pmatrix} \right) = \phi'(g') \phi''(g'').$$

De plus, il existe une fonction localement constante $\eta : \mathbf{K} \rightarrow \mathbb{C}$ telle que

$$(63) \qquad \qquad \qquad \int_{\mathbf{u} \times \mathbf{K}} \phi \left(\begin{pmatrix} g' & \mathbf{u} \\ 0 & g'' \end{pmatrix} \right) \mathbf{k} \eta(\mathbf{k}) d\mathbf{u} d\mathbf{k} = \phi(g') \phi(g'').$$

On pose aussi $\mathbf{f}(g) = \delta_p^{\frac{1}{2}} \left(\begin{pmatrix} g' & \mathbf{u} \\ 0 & g'' \end{pmatrix} \right) \eta(\mathbf{k}) \mathbf{f}(g') \mathbf{f}(g'')$, alors \mathbf{f} est bien un coefficient de π . De plus, en intégrant sur $\mathbf{U} \times \mathbf{K}$ l'expression (61) devient

$$(64) \qquad \int_{\mathbf{G}} \phi \left(\begin{pmatrix} g' & \mathbf{u} \\ 0 & g'' \end{pmatrix} \right) \mathbf{k} \mathbf{f}(g) |\deg g|_p^{t'} \delta_p \left(\begin{pmatrix} g' & \mathbf{u} \\ 0 & g'' \end{pmatrix} \right) dg' dg'' d\mathbf{u} d\mathbf{k},$$

qui est bien $\zeta(f, \phi, t)$. Ce qui termine la preuve de la proposition. \square

2.2. Représentation supercuspidale. Dans cette partie, on suppose que π est une représentation supercuspidale irréductible de G . Avant d'aller plus loin, commençons par rappeler un résultat fondamental sur les représentations supercuspidales.

Proposition 4. *Les coefficients de π sont à support compact modulo \mathbb{Q}_p^\times .*

Soit f un coefficient de π et $\phi \in \mathcal{S}$, alors il existe un sous-groupe compact K' de G tel que f et ϕ sont invariant à gauche par K' . De plus, le support de f est, d'après la proposition, à support compact modulo \mathbb{Q}_p^\times . Il existe donc un nombre fini d'éléments $(g_i)_{1 \leq i \leq N}$ de G tel que

$$(65) \quad \text{supp}(f) \subset \cup_{i=1}^N K' \mathbb{Q}_p^\times g_i.$$

On en déduit que

$$(66) \quad \zeta(f, \phi, s) = \text{vol}(K') \sum_{i=1}^N f(g_i) |\det g_i|_p^s \int_{\mathbb{Q}_p^\times} \phi(xg_i) |x|_p^{ns} \omega(x) dx,$$

où ω est le caractère central de π . Cette dernière intégrale est absolument convergente pour $\text{Re}(s) > 0$. De plus, le quotient $\frac{\zeta(f, \phi, s)}{L(n, s, \omega)}$ est un polynôme en p^s et p^{-s} . Ce qui prouve les parties (1) et (2) du théorème pour π .

Posons $G^0 = \{g \in G, |\det g|_p = 1\}$, alors $G^0 \cap \mathbb{Q}_p^\times = \mathbb{Z}_p^\times$ est compact. On choisit $\phi \in \mathcal{S}$ tel que $\phi(g) = \overline{f(g)}$ si $g \in G^0$ et $\phi(g) = 0$ sinon. Alors

$$(67) \quad \zeta(f, \phi, s) = \int_{G^0} f(g) \overline{f(g)} dg > 0$$

est une constante non nulle, ce qui prouve la partie (3) du théorème pour π . Il ne nous reste plus qu'à montrer l'équation fonctionnelle.

Commençons par définir l'opérateur zêta,

$$(68) \quad \zeta(\pi, \phi, s) = \int_G \phi(g) |\det g|_p^s \pi(g) dg.$$

C'est l'opérateur dont les coefficients sont exactement les $\zeta(f, \phi, s)$ pour f coefficient de π .

Posons $\mathcal{S}_0 = \{\phi \in \mathcal{S} | \text{supp}(\phi), \text{supp}(\hat{\phi}) \subset G\}$. Le résultat qui va nous permettre de prouver l'équation fonctionnelle est la

Proposition 5. *Pour $\phi \in \mathcal{S}, \phi' \in \mathcal{S}_0$, on a*

$$(69) \quad \zeta(\tilde{\pi}, \hat{\phi}', n-s) \zeta(\pi, \phi, s) = \zeta(\pi, \phi', s) \zeta(\tilde{\pi}, \hat{\phi}, n-s),$$

où $\tilde{\pi}(g) = \pi(g^{-1})$.

Démonstration. La proposition est une conséquence immédiate du

Lemme 5. *Soit $\phi \in \mathcal{S}, \phi' \in \mathcal{S}_0, v \in V$ et $\tilde{v} \in \tilde{V}$, pour $0 < \text{Re}(s) < n$, les intégrales*

$$(70) \quad \int_G \int_G \phi(g) \hat{\phi}'(h) \langle \pi(g)v, \tilde{\pi}(h)\tilde{v} \rangle |\det g|_p^s |\det h|_p^{n-s} dg dh,$$

$$(71) \quad \int_G \int_G \hat{\phi}(g) \phi'(h) \langle \pi(g^{-1}v, \tilde{\pi}(h^{-1})\tilde{v} \rangle |\det g|_p^{n-s} |\det h|_p^s dg dh,$$

sont absolument convergentes et coïncident. De plus, ces intégrales sont les coefficients des opérateurs $\zeta(\tilde{\pi}, \hat{\phi}', n-s) \zeta(\pi, \phi, s)$ et $\zeta(\pi, \phi', s) \zeta(\tilde{\pi}, \hat{\phi}, n-s)$.

□

Proposition 6. *Pour $s \in \mathbb{C}$, il existe un opérateur $\gamma(s) : V \rightarrow V$ tel que*

$$(72) \quad \zeta(\tilde{\pi}, \hat{\phi}, \mathbf{n} - s) = \gamma(s) \zeta(\pi, \phi, s), \forall \phi \in \mathcal{S}_0.$$

De plus, l'opérateur $\gamma(s)$ est un scalaire.

Démonstration. Unicité : On choisit $\phi \in \mathcal{S}_0$ tel que $\zeta(\pi, \phi, s) = \text{Id}_V$, alors $\gamma(s) = \zeta(\tilde{\pi}, \hat{\phi}, \mathbf{n} - s)$.

Existence : Il faut démontrer que les différents $\phi \in \mathcal{S}_0$ tel que $\zeta(\pi, \phi, s) = \text{Id}_V$ donnent un même opérateur $\zeta(\tilde{\pi}, \hat{\phi}, \mathbf{n} - s)$. Soit $\phi_1, \phi_2 \in \mathcal{S}_0$ tel que $\zeta(\pi, \phi_1, s) = \zeta(\pi, \phi_2, s) = \text{Id}_V$. D'après la proposition (5), on en déduit que $\zeta(\tilde{\pi}, \hat{\phi}_1, \mathbf{n} - s) = \zeta(\tilde{\pi}, \hat{\phi}_2, \mathbf{n} - s)$.

On pose $\gamma(s) = \zeta(\tilde{\pi}, \hat{\phi}_0, \mathbf{n} - s)$ pour $\phi_0 \in \mathcal{S}_0$ tel que $\zeta(\pi, \phi, s) = \text{Id}_V$. Alors, d'après la proposition (5),

$$(73) \quad \gamma(s) \zeta(\pi, \phi, s) = \zeta(\tilde{\pi}, \hat{\phi}_0, \mathbf{n} - s) \zeta(\pi, \phi, s)$$

$$(74) \quad = \zeta(\pi, \phi_0, s) \zeta(\tilde{\pi}, \hat{\phi}, \mathbf{n} - s)$$

$$(75) \quad = \zeta(\tilde{\pi}, \hat{\phi}, s),$$

pour tout $\phi \in \mathcal{S}$.

Montrons maintenant que $\gamma(s) \in \text{Hom}_G(\pi, \pi)$, le lemme de Schur nous permet de conclure que $\gamma(s)$ est un scalaire.

Pour $\phi \in \mathcal{S}$, on pose $\phi_h = \phi(h \cdot)$. Alors $\hat{\phi}_h = |\det h|_p^{-n} \hat{\phi}(h^{-1} \cdot)$. Ce qui nous permet d'obtenir

$$(76) \quad \zeta(\tilde{\pi}, \hat{\phi}_h, \mathbf{n} - s) = |\det h|_p^{-n} \zeta(\tilde{\pi}, \hat{\phi}(h^{-1} \cdot), \mathbf{n} - s)$$

$$(77) \quad = |\det h|_p^{-s} \pi(h^{-1}) \zeta(\tilde{\pi}, \hat{\phi}, \mathbf{n} - s)$$

$$(78) \quad = |\det h|_p^{-s} \pi(h^{-1}) \gamma(s) \zeta(\pi, \phi, s).$$

D'autre part, on a

$$(79) \quad \gamma(s) \zeta(\pi, \phi_h, s) = |\det h|_p^{-s} \gamma(s) \pi(h^{-1}) \zeta(\pi, \phi, s).$$

Par unicité de l'opérateur $\gamma(s)$, on en déduit que $\pi(h^{-1}) \gamma(s) = \gamma(s) \pi(h^{-1})$. Autrement dit, $\gamma(s) \in \text{Hom}_G(\pi, \pi)$. □

Lemme 6. *Soit $v \in V, \tilde{v} \in \tilde{V}$ et $s \in \mathbb{C}$, il existe $\phi \in \mathcal{S}_0$ tel que*

$$(80) \quad \zeta(\pi, \phi, s) w = \langle w, \tilde{v} \rangle v, \forall w \in V.$$

En particulier, il existe $\phi \in \mathcal{S}_0$ tel que $\zeta(\pi, \phi, s) = \text{Id}_V$.

Démonstration. Soit $\phi \in \mathcal{S}_0$ tel que $\phi(g) = |\det g|_p^s < v, \tilde{\pi} \tilde{v} >$ si $|\det g|_p \in \{1, p, \dots, p^{n-1}\}$ et $\phi(g) = 0$ sinon. Alors

$$(81) \quad \langle \zeta(\pi, \phi, s) w, \tilde{w} \rangle = \int_{G/\mathbb{Q}_p^\times} \langle v, \tilde{\pi}(g) \tilde{v} \rangle \langle \pi(g) w, \tilde{w} \rangle dg$$

$$(82) \quad = c \langle v, \tilde{w} \rangle \langle w, \tilde{v} \rangle,$$

pour tout $w \in V, \tilde{w} \in \tilde{V}$. La dernière égalité est une conséquence du lemme de Schur. Ce qui montre que $\zeta(\pi, \phi, s)$ est proportionnel à $w \mapsto \langle w, \tilde{v} \rangle v$. □

Lemme 7. *Soit $v \in V$ non nul, alors*

$$W = \{u \in V, \exists \phi \in S_0, c \neq 0, l \in \mathbb{Z}, \zeta(\pi, \phi, s) = cp^{-ls}u \forall s \in \mathbb{C}\}$$

engendre V .

Démonstration. Si $u \in W$, alors $\pi(h)u$ l'est aussi pour $h \in G$. En effet, $\zeta(\pi, \phi(.h^{-1}), s) = cp^{-ls}|\det h|_p^{-s}u$. Comme V est irréductible, il suffit de montrer que $W \neq 0$.

Soit $\phi \in S_0$ tel que $\phi(g) = \langle v, \pi(g)v \rangle$ si $g \in G^0$ et $\phi(g) = 0$ sinon. Alors

$$(83) \quad u = \zeta(\pi, \phi, s)v = \int_{G^0} \langle v, \pi(g)v \rangle \pi(g)v dg$$

est indépendant de s et non nul puisque

$$(84) \quad \langle \zeta(\pi, \phi, s)v, v \rangle = \int_{G^0} |\langle v, \pi(g)v \rangle|^2 dg > 0.$$

Ce qui montre que $u \in W$ et u non nul. \square

Montrons que $\gamma(s)$ est non seulement une fraction rationnelle en p^{-s} , mais en fait une puissance de p^s . En effet, on a

$$(85) \quad \zeta(\check{f}, \hat{\phi}, n-s) = \gamma(s)\zeta(f, \phi, s), \forall \phi \in S_0.$$

D'après le lemme, on peut choisir $\phi \in S_0$ et f coefficient de π tel que $\zeta(f, \phi, s) = p^{-ls}$. Alors $\gamma(s) = \zeta(\check{f}, \hat{\phi}, n-s)p^{ls}$ est un polynôme en p^{-s} et p^s . En appliquant le lemme à $\tilde{\pi}$, on en déduit que γ n'admet pas de zéros, c'est donc une puissance de p^s .

Proposition 7. *Pour π supercuspidale irréductible, on a $L(s, \pi) = 1$.*

Démonstration. Si ω est ramifié, alors $L(s, \omega) = 1$. On en déduit que $L(s, \pi) = \frac{L(s, \pi)}{L(ns, \omega)}$ est un polynôme en p^{-s} , donc $L(s, \pi) = 1$.

Si ω est non ramifié, on peut supposer sans perte de généralité que $\omega = 1$, alors

$$(86) \quad L(s, \omega) = \frac{1}{1-p^{-s}}, \quad L(ns, \omega) = \frac{1}{\prod_{\mu \in T}(1-\mu p^{-s})} = \frac{1}{1-p^{-ns}}.$$

Ce qui nous permet d'en déduire que

$$(87) \quad L(s, \pi) = \frac{1}{\prod_{\mu \in T}(1-\mu p^{-s})}, \quad L(s, \tilde{\pi}) = \frac{1}{\prod_{\mu \in T'}(1-\mu p^{-s})},$$

où T et T' sont des sous-ensembles des racines n -ième de l'unité.

On vient de montrer précédemment que γ est une puissance de p^s , il en est alors de même pour $\epsilon(s, \pi, \psi)$ et $\frac{L(s, \pi)}{L(1-s, \tilde{\pi})}$ d'après la relation (32). Ce qui montre que la fraction

$$(88) \quad \frac{\prod_{\mu \in T'}(1-\mu p^{s-1})}{\prod_{\mu \in T}(1-\mu p^{-s})}$$

est une puissance de p^s , d'où $L(s, \pi) = L(s, \tilde{\pi}) = 1$. \square

2.3. Représentation sphérique. L'importance des représentations sphériques vient du fait que dans la théorie globale presque toutes les composantes locales sont des représentations sphériques.

Définition 4. Une représentation sphérique de G est une représentation (π, V) admissible irréductible de G telle qu'il existe un vecteur $v \in V$ non nul invariant par K .

Notons $P_0 \subset G$ l'ensemble des matrices triangulaires supérieures. Soit χ_1, \dots, χ_n des caractères non ramifiés de \mathbb{Q}_p^\times , on note $\chi = \chi_1 \boxtimes \dots \boxtimes \chi_n$ le caractère de P_0 trivial sur son radical unipotent. On pose $\pi = \text{Ind}_{P_0}^G(\chi)$.

Alors π contient un vecteur invariant par K , φ_0 définie par $\varphi_0(pk) = \delta_P(p)^{\frac{1}{2}} \chi(p)$. On considère le coefficient f_0 défini par $f_0(g) = \langle \pi(g)\varphi_0, \tilde{\varphi}_0 \rangle$, où $\tilde{\varphi}_0$ est un vecteur de $\tilde{\pi}$ invariant par K défini par $\tilde{\varphi}_0(pk) = \delta_P(p)^{\frac{1}{2}} \chi(p)^{-1}$. C'est un coefficient d'une représentation admissible irréductible que l'on note π_0 , cette représentation est sphérique.

De plus, toutes les représentations sphériques sont de cette forme (à isomorphisme près).

Lemme 8. On note ϕ_0 l'indicatrice de $M_n(\mathbb{Z}_p)$. Alors

$$(89) \quad \zeta(f_0, \phi_0, s) = \prod_{i=1}^n L(s, \chi_i).$$

Démonstration. Comme φ_0 et $\tilde{\varphi}_0$ sont K -invariant, on en déduit que

$$(90) \quad f_0(g) = \int_K \varphi_0(kg) \tilde{\varphi}_0(k) dk = \varphi_0(g).$$

De plus,

$$(91) \quad \zeta(f_0, \phi_0, s) = \int_G \phi_0(g) \varphi_0(g) |\det g|^s dg$$

$$(92) \quad = \int_P \int_K \phi_0(pk) \varphi_0(pk) |\det p|^s \delta_P(p)^{-\frac{1}{2}} dp dk$$

$$(93) \quad = \prod_{i=1}^n \int_{\mathbb{Z}_p} |a_i|^s \chi_i(a_i) da_i$$

$$(94) \quad = \prod_{i=1}^n L(s, \chi_i).$$

□

On en déduit le calcul de la fonction L d'une représentation sphérique.

Proposition 8. En reprenant les notations précédentes,

$$(95) \quad L(s, \pi_0) = \prod_{i=1}^n L(s + \frac{1}{2}(n-1), \chi_i).$$

2.4. Représentation de carré intégrable. Cette partie provient de [3].

Définition 5. Une représentation admissible (π, V) de G est dite de carré intégrable si son caractère central est unitaire et $\int_{G/\mathbb{Q}_p^\times} |f(g)|^2 dg < \infty$ pour tout coefficient f de π .

On décrit maintenant la classification de Bernstein-Zelevinsky des représentations admissibles irréductibles de carré intégrable. Soit r, d des entiers > 0 , soit τ une représentation supercuspidale de $GL(r, \mathbb{Q}_p)$ de caractère central unitaire. On note $P_{r,d}$ le sous-groupe parabolique de $GL(rd, \mathbb{Q}_p)$ des matrices triangulaires supérieures par bloc où les blocs diagonaux sont de tailles $r \times r$. Alors

$$(96) \quad \text{Ind}_{P_{r,d}}^{GL(rd, \mathbb{Q}_p)} (|\cdot|_p^{\frac{1-d}{2}} \tau \boxtimes \dots \boxtimes |\cdot|_p^{\frac{d-1}{2}} \tau)$$

admet un unique quotient irréductible que l'on note τ' . La représentation τ' est admissible irréductible de carré intégrable. De plus, toutes les représentations admissibles irréductibles de carré intégrable sont de cette forme (à isomorphisme près) avec $n = rd$.

Proposition 9. *En reprenant les notations précédentes,*

$$(97) \quad L(s, \tau') = \begin{cases} L(s, |\cdot|_p^{\frac{1-n}{2}} \tau), & \text{si } r = 1 \\ 1, & \text{si } r > 1. \end{cases}$$

Démonstration. Si $r > 1$, par la compatibilité de l'induction,

$$(98) \quad L(s, \text{Ind}_{P_{r,d}}^{GL(rd, \mathbb{Q}_p)} (|\cdot|_p^{\frac{1-d}{2}} \tau \boxtimes \dots \boxtimes |\cdot|_p^{\frac{d-1}{2}} \tau)) = \prod_{i=0}^{n-1} L(s, |\cdot|_p^{\frac{1-d}{2}+i} \tau) = 1,$$

la dernière égalité vient du calcul de la fonction L d'une représentation supercuspidale. On en déduit immédiatement que $L(s, \tau') = 1$.

Supposons maintenant que $r = 1$. Soit $\phi \in \mathcal{S}$, f un coefficient de τ' et $s \in \mathbb{C}$. Alors, d'après l'équation fonctionnelle,

$$(99) \quad \zeta(f, \phi, s) = \gamma(s, \tau', \lambda) \zeta(\check{f}, \hat{\phi}, s).$$

Les propriétés du facteur γ et le calcul pour $GL_1(\mathbb{Q}_p)$ donnent

$$(100) \quad \gamma(s, \tau', \lambda) = \prod_{i=0}^{n-1} \frac{1 - \tau(p)^{-1} p^{s-1+\frac{n-1}{2}-i}}{1 - \tau(p) p^{-s-\frac{n-1}{2}+i}}.$$

Ce qui nous permet d'en déduire immédiatement que

$$(101) \quad \prod_{i=0}^{n-1} (1 - \tau(p) p^{-s-\frac{n-1}{2}+i}) \zeta(f, \phi, s) = \prod_{i=1}^n (1 - \tau(p)^{-1} p^{s+\frac{n-1}{2}-i}) \zeta(\check{f}, \hat{\phi}, 1-s).$$

On utilise maintenant le fait que

$$(102) \quad (1 - \tau(p)^{-1} p^{s+\frac{n-1}{2}+i}) = \tau(p)^{-1} p^{s+\frac{n-1}{2}-i} (1 - \tau(p) p^{-s-\frac{n-1}{2}-i}),$$

pour simplifier l'équation (101), ce qui nous donne

$$(103) \quad (1 - \tau(p) p^{-s-\frac{n-1}{2}}) \zeta(f, \phi, s) = \tau(p)^{-n+1} p^{s(n-1)+\frac{n(n+1)}{2}-1} (1 - \tau(p)^{-1} p^{s-\frac{n+1}{2}}) \zeta(\check{f}, \hat{\phi}, s).$$

Pour les représentations de carré intégrable, on dispose d'une information plus précise sur le domaine de convergence de l'intégrale zêta.

Lemme 9 ([3]). *L'intégrale définissant la fonction zêta pour τ' ,*

$$(104) \quad \zeta(f, \phi, s) = \int_G \phi(g) f(g) |\det g|_p^s dg$$

est absolument convergente pour $\text{Re}(s) > 0$.

Ce lemme nous permet d'en déduire que les deux membres de l'équation (103) sont holomorphes dans les régions $\operatorname{Re}(s) > 0$ et $\operatorname{Re}(s) < 1$. Ceci nous permet voir immédiatement que $L(s, \tau') = (1 - \tau(p)p^{-s - \frac{n-1}{2}})$ ou 1. Il nous suffit donc de montrer que $L(s, \tau') \neq 1$ pour avoir le résultat voulu.

On choisit $\phi \in \mathbb{S}$ et f un coefficient de π tel que $\zeta(\check{f}, \hat{\phi}, 1-s)$ est une constante non nulle. Alors le membre de droite de l'équation (103) ne s'annule pas en $s = -\frac{n-1}{2}$. On en déduit que $\zeta(f, \phi, s)$ doit avoir un pôle en $s = -\frac{n-1}{2}$, d'où $L(s, \tau') \neq 1$. \square

3. SECONDE PREUVE DU THÉORÈME 2

On veut montrer l'équation fonctionnelle suivante

$$(105) \quad \zeta(f, \phi, s) = \gamma(s) \zeta(\check{f}, \hat{\phi}, n-s),$$

où γ est une fonction rationnelle en p^s et $\check{f}(g) = f(g^{-1})$.

Pour montrer cette équation fonctionnelle, on va utiliser la

Propriété 1. *Les opérateurs $\zeta(.,., s)$ et $\zeta(\check{.}, \hat{.}, n-s)$ sont des opérateurs d'entrelacements, éléments de $\operatorname{Hom}_{G \times G}((\tilde{\pi} \boxtimes \pi) \otimes \mathbb{S}, |\det|_p^s \boxtimes |\det|_p^{-s})$.*

On précise que l'action de $G \times G$ sur \mathbb{S} est $(g_1, g_2) \cdot \phi(x) = \phi(g_1^{-1} x g_2)$. De plus, on identifie l'ensemble des coefficients de π avec l'espace $\check{V} \otimes V$; l'action de $G \times G$ sur $\tilde{\pi} \boxtimes \pi$ est $(g_1, g_2) \cdot f(g) = f(g_1^{-1} g g_2)$.

Démonstration. L'action de $G \times G$ sur $\zeta(f, \phi, s)$ donne

$$(106) \quad \int_G \phi(g_1^{-1} g g_2) f(g_1^{-1} g g_2) |\det g|_p^s dg.$$

On effectue le changement de variable $g \mapsto g_1 g g_2^{-1}$, le groupe G étant unimodulaire l'intégrale devient

$$(107) \quad |\det g_1 g_2^{-1}|^s \int_G \phi(g) f(g) |\det g|_p^s dg.$$

D'autre part, l'action de $G \times G$ sur $\zeta(\check{f}, \hat{\phi}, n-s)$ donne

$$(108) \quad \int_G \hat{\phi}_{g_1, g_2}(g) \check{f}_{g_1, g_2}(g) |\det g|_p^{n-s} dg,$$

où l'on a noté $\phi_{g_1, g_2}(x) = \phi(g_1^{-1} x g_2)$ et $f_{g_1, g_2}(g) = f(g_1^{-1} g g_2)$.

Un calcul immédiat, montre que $\check{f}_{g_1, g_2}(g) = \check{f}(g_2^{-1} g g_1)$. De plus,

$$(109) \quad \hat{\phi}_{g_1, g_2}(g) = \int_{M_n} \phi(g_1^{-1} x g_2) \psi(\operatorname{Tr}(xg)) dx.$$

Après le changement de variable $x \mapsto g_1 x g_2^{-1}$ l'intégrale devient

$$(110) \quad |\det g_1^{-1} g_2|_p^n \int_{M_n} \phi(x) \psi(\operatorname{Tr}(x g_2^{-1} g g_1)) dx,$$

qui n'est autre que $|\det g_1 g_2^{-1}|_p^n \hat{\phi}(g_2^{-1} g g_1)$. L'intégrale (108) devient donc, après le changement de variable $g \mapsto g_2 g g_1^{-1}$,

$$(111) \quad |\det g_1^{-1} g_2|_p^n |\det g_2 g_1^{-1}|_p^{n-s} \int_G \hat{\phi}(g) \check{f}(g) |\det g|_p^{n-s} dg.$$

\square

Dans le but de comprendre l'espace $\text{Hom}_{G \times G}((\tilde{\pi} \boxtimes \pi) \otimes \mathcal{S}, |\det|_p^s \boxtimes |\det|_p^{-s})$, on va décomposer \mathcal{S} selon le rang des matrices. Soit r un entier compris entre 1 et n , on note S_r l'espace des matrices $n \times n$ de rang r et $S^{(n)}$ l'espace des matrices $n \times n$ de rang $< r$.

Si X est un espace localement compact totalement discontinu, on note $C_c^\infty(X)$ l'espace des fonctions $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ localement constantes à support compact. L'espace \mathcal{S} est donc égal à $C_c^\infty(M_n)$.

Le groupe G est un ouvert de M_n et $M_n \setminus G = S^{(n)}$. Cette décomposition donne la suite exacte

$$(112) \quad 0 \rightarrow C_c^\infty(G) \rightarrow C_c^\infty(M_n) \rightarrow C_c^\infty(S^{(n)}) \rightarrow 0,$$

où l'inclusion de $C_c^\infty(G)$ dans $C_c^\infty(M_n)$ se fait par extension par 0 et l'application $C_c^\infty(M_n) \rightarrow C_c^\infty(S^{(n)})$ est l'application de restriction.

Cette suite exacte commute avec l'action de $G \times G$, on la voit donc comme une suite exacte de représentations de $G \times G$. On applique le foncteur $\text{Hom}_{G \times G}(\cdot, (\pi \boxtimes \tilde{\pi}) \otimes (|\det|_p^s \boxtimes |\det|_p^{-s}))$, qui est exact à gauche, on en déduit alors l'inégalité suivante :

$$(113) \quad \dim \text{Hom}_{G \times G}((\tilde{\pi} \boxtimes \pi) \otimes \mathcal{S}, |\cdot|_p^s) \leq \dim \text{Hom}_{G \times G}((\tilde{\pi} \boxtimes \pi) \otimes C_c^\infty(G), |\cdot|_p^s) \\ + \dim \text{Hom}_{G \times G}((\tilde{\pi} \boxtimes \pi) \otimes C_c^\infty(S^{(n)}), |\cdot|_p^s),$$

où l'on a abrégé $|\cdot|_p^s = |\det|_p^s \boxtimes |\det|_p^{-s}$.

On décompose ensuite $S^{(n)}$ selon le rang r , ce qui donne, en utilisant le même raisonnement, que

$$(114) \quad \dim \text{Hom}_{G \times G}((\tilde{\pi} \boxtimes \pi) \otimes \mathcal{S}, |\cdot|_p^s) \leq \sum_{r=0}^n \dim \text{Hom}_{G \times G}((\tilde{\pi} \boxtimes \pi) \otimes C_c^\infty(S_r), |\cdot|_p^s).$$

Il ne nous reste plus qu'à calculer la dimension de ces différents espaces, pour cela on dispose de la

Proposition 10. *Pour $r = n$ ($S_r = G$), on a*

$$(115) \quad \dim \text{Hom}_{G \times G}((\tilde{\pi} \boxtimes \pi) \otimes C_c^\infty(G), |\cdot|_p^s) = 1;$$

et pour $r < n$, on a

$$(116) \quad \dim \text{Hom}_{G \times G}((\tilde{\pi} \boxtimes \pi) \otimes C_c^\infty(S_r), |\cdot|_p^s) = 0$$

sauf pour un nombre fini de valeurs de s modulo $\frac{2i\pi}{(n-r)\log p} \mathbb{Z}$.

Démonstration. Commençons par le cas $r = n$,

$$(117) \quad \text{Hom}_{G \times G}((\tilde{\pi} \boxtimes \pi) \otimes C_c^\infty(G), |\cdot|_p^s) \simeq \text{Hom}_{G \times G}((\tilde{\pi} \boxtimes \pi) \otimes |\cdot|_p^{-s}, C^\infty(G))$$

$$(118) \quad \simeq \text{Hom}_H((\tilde{\pi} \boxtimes \pi) \otimes |\cdot|_p^{-s}, \mathbb{C})$$

$$(119) \quad \simeq \text{Hom}_G(\tilde{\pi}, \tilde{\pi});$$

où le groupe H désigne la diagonale de $G \times G$. Ce dernier espace est bien de dimension 1 d'après le lemme de Schur.

Le premier isomorphisme provient de la dualité entre $C_c^\infty(G)$ et $C^\infty(G)$. Le deuxième isomorphisme est une application de la réciprocité de Frobenius avec l'identification $C^\infty(G) = \text{Ind}_H^{G \times G}(1)$. Pour finir, le dernier isomorphisme provient du fait que l'action diagonale de H sur $\tilde{\pi} \boxtimes \pi$ correspond à l'action de G sur $\tilde{\pi} \otimes \pi$ et que $|\cdot|_p^{-s}$ est trivial sur H .

Passons au cas $r < n$, S_r est l'orbite de $\begin{pmatrix} 1_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ sous l'action de $G \times G$ par translation à gauche du premier facteur et translation à droite de l'inverse sur le second facteur. On calcule le stabilisateur,

$$(120) \quad H = \text{Stab}_{G \times G} \begin{pmatrix} 1_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \left\{ \left(\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a & 0 \\ d & e \end{pmatrix} \right) \right\} \subset G \times G,$$

où a décrit $GL_r(\mathbb{Q}_p)$; c, e décrivent $GL_{n-r}(\mathbb{Q}_p)$; b décrit $M_{r, n-r}(\mathbb{Q}_p)$ et d décrit $M_{n-r, r}(\mathbb{Q}_p)$.

On note $P = MN$ le sous-groupe parabolique de G des matrices de la forme $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$ et $\bar{P} = M\bar{N}$ le groupe parabolique opposé, alors $H \subset P \times \bar{P}$.

$$(121)$$

$$\text{Hom}((\tilde{\pi} \boxtimes \pi) \otimes C_c^\infty(S_r), |\cdot|_p^s) \simeq \text{Hom}_{G \times G}((\tilde{\pi} \boxtimes \pi) \otimes |\cdot|_p^{-s}, \text{Ind}_H^{G \times G}(\delta_H))$$

$$(122) \quad \simeq \text{Hom}_{M \times M}((\tilde{\pi} \boxtimes \pi)_{N \times \bar{N}} \otimes |\cdot|_p^{-s}, \text{Ind}_{(M \times M) \cap H}^{M \times M}(\delta_H))$$

$$(123) \quad \simeq \text{Hom}_{(M \times M) \cap H}((\tilde{\pi} \boxtimes \pi)_{N \times \bar{N}}, \delta_H \otimes |\cdot|_p^s),$$

où δ_H est le caractère modulaire de H .

Le premier isomorphisme provient de l'identification de $C_c^\infty(S_r) = \mathbf{c} - \text{Ind}_H^{G \times G}(1)$ et de la dualité entre $\mathbf{c} - \text{Ind}_H^{G \times G}(1)$ et $\text{Ind}_H^{G \times G}(\delta_H)$. Pour le deuxième isomorphisme, on utilise la transitivité de l'induction, $H \subset P \times \bar{P} \subset G \times G$, et l'adjonction entre $\text{Ind}_{P \times \bar{P}}^{G \times G}$ et le foncteur de Jacquet; en remarquant, que $N \times \bar{N}$ agit trivialement sur $|\cdot|_p^s$. Le dernier isomorphisme n'est autre que la réciprocité de Frobenius.

On utilise le fait que $(\tilde{\pi} \boxtimes \pi)_{N \times \bar{N}}$ est de longueur finie; en effet le foncteur de Jacquet préserve la longueur finie. Il existe donc des représentations admissibles V_i de $M \times M$ telles que

$$(124) \quad 0 = V_0 \subset V_1 \subset \dots \subset V_l = (\tilde{\pi} \boxtimes \pi)_{N \times \bar{N}},$$

avec V_i/V_{i-1} irréductibles.

En reprenant un raisonnement que l'on a déjà fait, la suite exacte de représentations de $M \times M$

$$(125) \quad 0 \rightarrow V_{i-1} \rightarrow V_i \rightarrow V_i/V_{i-1} \rightarrow 0$$

permet d'obtenir l'inégalité suivante :

$$(126) \quad \dim \text{Hom}_{(M \times M) \cap H}((\tilde{\pi} \boxtimes \pi)_{N \times \bar{N}}, |\cdot|_p^s \delta_H) \leq \sum_{i=1}^l \dim \text{Hom}_{(M \times M) \cap H}(V_i/V_{i-1}, |\cdot|_p^s \delta_H).$$

Il nous suffit donc de montrer que ces derniers espaces sont nuls sauf pour au plus une valeur de s modulo $\frac{2i\pi}{(n-r)\log p} \mathbb{Z}$.

En tant que représentation irréductible de $M \times M \simeq GL_r^2(\mathbb{Q}_p) \times GL_{n-r}^2(\mathbb{Q}_p)$, on peut décomposer $V_i/V_{i-1} \otimes \delta_H^{-1}$ sous la forme $\sigma^{(i)} \boxtimes (\tau_1^{(i)} \boxtimes \tau_2^{(i)})$, où $\sigma^{(i)}$ est une représentation irréductible de $GL_r^2(\mathbb{Q}_p)$ et $\tau_1^{(i)}, \tau_2^{(i)}$ sont des représentations irréductibles de $GL_{n-r}(\mathbb{Q}_p)$.

D'après le lemme de Schur, la représentation $\tau_2^{(i)}$ admet un caractère central $\omega^{(i)}$. On en déduit que

$$(127) \quad \text{Hom}_{(M \times M) \cap H}(V_i/V_{i-1}, |\cdot|_p^s \delta_H) = 0,$$

sauf si $\omega^{(i)} = |\cdot|_p^{-(n-r)s}$ sur \mathbb{Q}_p^\times . Cette dernière équation ne peut être vérifiée que pour au plus une valeur de s modulo $\frac{2i\pi}{(n-r)\log p}\mathbb{Z}$. \square

Terminons la preuve de l'équation fonctionnelle. Rappelons que les opérateurs $\zeta(\cdot, \cdot, s)$ et $\zeta(\cdot, \cdot, n-s)$ sont des éléments de $\text{Hom}_{G \times G}((\tilde{\pi} \boxtimes \pi) \otimes \mathcal{S}, |\det|_p^s \boxtimes |\det|_p^{-s})$, qui est de dimension 1 sauf pour un nombre fini de valeurs de s modulo $\sum_{r=0}^{n-1} \frac{2i\pi}{(n-r)\log p}\mathbb{Z}$.

Autrement dit, pour s en dehors de cet ensemble de valeurs exceptionnelles, il existe $\gamma(s) \in \mathbb{C}$ tel que

$$(128) \quad \zeta(\cdot, \cdot, s) = \gamma(s) \zeta(\cdot, \cdot, n-s).$$

Les fonctions zêta étant des fonctions rationnelles en p^s et l'ensemble des valeurs de s pour lesquelles γ est ainsi défini est dense pour la topologie de Zariski, on en déduit que l'on peut étendre γ en une fonction rationnelle en p^s pour laquelle l'équation (128) est vérifiée en tant qu'égalité de fonctions rationnelles en p^s .

4. FONCTIONS ZÊTA SUR $GL_n(\mathbb{A})$

Dans cette partie, on note $G = GL_n(\mathbb{Q})$, $G_{\mathbb{A}} = GL_n(\mathbb{A})$. On pose $K = O_n(\mathbb{R}) \times \prod_p GL_n(\mathbb{Z}_p)$, c'est un sous-groupe compact maximal de $G_{\mathbb{A}}$.

4.1. Formes cuspidales. On commence par donner la définition des formes automorphes (et cuspidales), on renvoie à [1] et [3] pour plus de détails.

On fixe un caractère unitaire $\omega : \mathbb{A}^\times / \mathbb{Q}^\times \rightarrow \mathbb{S}^1$.

Définition 6. Une forme automorphe de caractère central ω est une fonction $\varphi : G_{\mathbb{A}} \rightarrow \mathbb{C}$ lisse et G -invariante qui vérifie de plus :

- φ est K -finie à droite,
- φ est $Z(\mathfrak{g})$ -finie,
-

$$(129) \quad \varphi(zg) = \omega(z)\varphi(g) \quad \forall g \in G_{\mathbb{A}}, z \in \mathbb{A}^\times,$$

- φ est à croissance modérée.

On note $\mathcal{A}(G_{\mathbb{A}}, \omega)$ l'espace des formes automorphes de caractère central ω .

On rajoute aussi une condition d'annulation dont on aura besoin pour la preuve de l'équation fonctionnelle. Ce qui donne la

Définition 7. Une forme cuspidale φ de caractère central ω est une forme automorphe de caractère central ω qui vérifie de plus les conditions :

$$(130) \quad \int_{U \backslash U_{\mathbb{A}}} \varphi(ug) du = 0$$

pour tout radical unipotent U d'un sous-groupe parabolique propre de $G_{\mathbb{A}}$ et tout $g \in G_{\mathbb{A}}$.

On note $\mathcal{A}_0(G_{\mathbb{A}}, \omega)$ l'espace des formes cuspidales de caractère central ω .

L'espace de Schwartz de $M_n(\mathbb{A})$ est, par définition, $\mathcal{S}(M_n(\mathbb{A})) = \otimes_v' \mathcal{S}(M_n(\mathbb{Q}_v)) = \{\phi = \otimes \phi_v, \phi_v \in \mathcal{S}(M_n(\mathbb{Q}_v)), \phi_v = \mathbb{1}_{\mathbb{Z}_v} \text{ sauf pour un nombre fini de } v\}$.

Pour $\varphi \in \mathcal{A}_0(G_{\mathbb{A}}, \omega)$, $\phi \in \mathcal{S}(M_{\mathbb{A}})$ et $s \in \mathbb{C}$, on pose

$$(131) \quad \zeta(\varphi, \phi, s) = \int_{G_{\mathbb{A}}} \phi(g) \varphi(g) |\det g|_{\mathbb{A}}^s dg,$$

où $dg = \otimes_v dg_v$ est une mesure de Haar sur $GL_n(\mathbb{A})$ et $|\cdot|_{\mathbb{A}} = \prod_v |\cdot|_v$ est la valeur absolue adélique.

Notons $G_{\mathbb{A}}^0 = \{g \in G_{\mathbb{A}}, |\det g|_{\mathbb{A}} = 1\}$. Comme $\mathbb{R}_{>0} \subset \mathbb{A}^{\times} = Z(G_{\mathbb{A}})$, l'application $|\det|_{\mathbb{A}} : G_{\mathbb{A}} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ est surjective de noyau $G_{\mathbb{A}}^0$.

La factorisation $G_{\mathbb{A}} = \mathbb{R}_{>0} G_{\mathbb{A}}^0$ permet d'obtenir que

$$(132) \quad \zeta(\varphi, \phi, s) = \int_0^\infty \int_{G_{\mathbb{A}}^0} \phi(tg) \omega(t) \varphi(g) t^{ns} dg \frac{dt}{t}$$

$$(133) \quad = \int_0^\infty \int_{G \backslash G_{\mathbb{A}}^0} \sum_{x \in G} \phi(txg) \varphi(g) \omega(t) t^{ns} dg \frac{dt}{t}.$$

Comme dans la preuve de l'équation fonctionnelle de la fonction zêta de Riemann, on scinde l'intégrale en 1 dans le but de faire apparaître une symétrie. Autrement dit,

$$(134) \quad \begin{aligned} \zeta(\varphi, \phi, s) &= \int_0^1 \int_{G \backslash G_{\mathbb{A}}^0} \sum_{x \in G} \phi(txg) \varphi(g) \omega(t) t^{ns} dg \frac{dt}{t} \\ &+ \int_1^\infty \int_{G \backslash G_{\mathbb{A}}^0} \sum_{x \in G} \phi(txg) \varphi(g) \omega(t) t^{ns} dg \frac{dt}{t}. \end{aligned}$$

La seconde intégrale converge absolument pour tout $s \in \mathbb{C}$, c'est une fonction entière. Pour la première intégrale, on fait le changement de variable $t \mapsto t^{-1}$, ce qui donne

$$(135) \quad \int_1^\infty \int_{G \backslash G_{\mathbb{A}}^0} \sum_{x \in G} \phi(t^{-1}xg) \varphi(g) \omega^{-1}(t) t^{-ns} dg \frac{dt}{t}.$$

On va maintenant utiliser la formule de Poisson sur $M_n(\mathbb{A})$, ce qui donne pour la fonction $x \mapsto \phi(t^{-1}xg)$:

$$(136) \quad \sum_{x \in M_n(\mathbb{Q})} \phi(t^{-1}xg) = t^{n^2} \sum_{x \in M_n(\mathbb{Q})} \hat{\phi}(txg^{-1}),$$

on se rappelle que $g \in G_{\mathbb{A}}^0$, donc $|\det g|_{\mathbb{A}} = 1$. On scinde la somme selon le rang de la matrice et on obtient :

$$(137) \quad \begin{aligned} \sum_{x \in G} \phi(t^{-1}xg) &= t^{n^2} \sum_{x \in G} \hat{\phi}(txg^{-1}) \\ &+ \sum_{r < n, \text{rg}(x)=r} \left(t^{n^2} \hat{\phi}(txg^{-1}) - \phi(t^{-1}xg) \right). \end{aligned}$$

La contribution de la dernière somme s'avèrera nulle. Ce qui nous permet d'en déduire la

Proposition 11. *Si $\varphi \in \mathcal{A}_0(G_{\mathbb{A}}, \omega)$ et $\phi \in \mathcal{S}(M_n(\mathbb{A}))$, la fonction $\zeta(\varphi, \phi, \cdot)$ peut être prolongée en une fonction entière et vérifie l'équation fonctionnelle*

$$(138) \quad \zeta(\varphi, \phi, s) = \zeta(\check{\varphi}, \hat{\phi}, n - s),$$

où $\check{\varphi}(g) = \varphi(g^{-1})$.

Démonstration. Il suffit de prouver que la contribution dans la formule de Poisson des matrices de rang $r < n$ est effectivement nulle. On considère l'action de G par translation à droite sur l'ensemble des matrices de rang r . Chaque orbite contient

un représentant de la forme $\begin{pmatrix} * & 0 \\ * & 0 \end{pmatrix}$, on note X l'ensemble des matrices de cette forme. On pose P le sous-groupe parabolique de G des matrices de la forme $\begin{pmatrix} * & 0 \\ * & * \end{pmatrix}$ et U son radical unipotent.

On réécrit la somme sur les matrices de rang r grâce au système de représentant X ,

$$(139) \quad \sum_{rg(x)=r} \phi(xg) = \sum_{\gamma \in P \setminus G} \sum_{x \in X} \phi(x\gamma g).$$

On en déduit que la contribution des matrices de rang r dans la seconde intégrale est

$$(140) \quad \int_{P \setminus G_{\mathbb{A}}^0} \sum_{x \in X} \phi(t^{-1}xg) \varphi(g) dg.$$

De plus, on remarque que, $xu = x$, pour tout $x \in X$ et $u \in U_{\mathbb{A}}$. Ce qui nous permet de réécrire cette intégrale sous la forme

$$(141) \quad \int_{PU_{\mathbb{A}} \setminus G_{\mathbb{A}}^0} \sum_{x \in X} \phi(t^{-1}xg) \int_{U \setminus U_{\mathbb{A}}} \varphi(ug) du dg.$$

Cette dernière intégrale s'annule, car f est cuspidale. On montre de même de l'intégrale correspondant au terme en \hat{f} sur les matrices de rang $r < n$ s'annule aussi. Ce qui nous donne, grâce à la formule de Poisson et le raisonnement précédent, la formule

$$(142) \quad \begin{aligned} \zeta(\varphi, \phi, s) &= \int_1^\infty \int_{G \setminus G_{\mathbb{A}}^0} \sum_{x \in G} \hat{f}(txg^{-1}) \varphi(g) \omega^{-1}(t) t^{n(n-s)} dg \frac{dt}{t} \\ &+ \int_1^\infty \int_{G \setminus G_{\mathbb{A}}^0} \sum_{x \in G} \phi(txg) \varphi(g) \omega(t) t^{ns} dg \frac{dt}{t}, \end{aligned}$$

ce qui démontre l'équation fonctionnelle en effectuant le changement de variable $g \mapsto g^{-1}$ dans la première intégrale. \square

4.2. Représentations automorphes. L'espace des formes cuspidales $\mathcal{A}_0(G_{\mathbb{A}}, \omega)$ est stable par l'action de $U(\mathfrak{g})$ par opérateurs différentiels et par translation à droite de $O_n(\mathbb{R})$ et $GL_n(\mathbb{A}_f)$, c'est un $(\mathfrak{g}, O_n(\mathbb{R})) \times GL_n(\mathbb{A}_f)$ -module.

Un coefficient f de $\mathcal{A}_0(G_{\mathbb{A}}, \omega)$ est de la forme

$$(143) \quad f(g) = \langle \pi(g)\varphi, \tilde{\varphi} \rangle = \int_{\mathbb{A} \times G \setminus G_{\mathbb{A}}} \varphi(hg) \tilde{\varphi}(h) dh,$$

où $\varphi \in \mathcal{A}_0(G_{\mathbb{A}}, \omega)$ et $\tilde{\varphi} \in \mathcal{A}_0(G_{\mathbb{A}}, \omega^{-1})$.

Pour un coefficient f de $\mathcal{A}_0(G_{\mathbb{A}}, \omega)$, $\phi \in \mathcal{S}(M_{\mathbb{A}})$ et $s \in \mathbb{C}$, on pose

$$(144) \quad \zeta(f, \phi, s) = \int_{G_{\mathbb{A}}} \phi(g) f(g) |\det g|_{\mathbb{A}}^s dg.$$

On peut d  duire les propri  t  s de cette fonction z  ta gr  ce    ce que l'on vient de faire pour les formes cuspidales. Plus pr  cis  ment, on a

$$(145) \quad \zeta(f, \phi, s) = \int_{G_{\mathbb{A}}} \phi(g) \int_{\mathbb{A} \times G \backslash G_{\mathbb{A}}} \varphi(hg) \tilde{\varphi}(h) dh |\det g|_{\mathbb{A}}^s dg$$

$$(146) \quad = \int_{\mathbb{A} \times G \backslash G_{\mathbb{A}}} \tilde{\varphi}(h) \int_{G_{\mathbb{A}}} \phi(h^{-1}g) \varphi(g) |\det g|_{\mathbb{A}}^s dg |\det h|_{\mathbb{A}}^{-s} dh$$

$$(147) \quad = \int_{\mathbb{A} \times G \backslash G_{\mathbb{A}}} \tilde{\varphi}(h) \zeta(\varphi, \phi(h^{-1} \cdot), s) |\det h|_{\mathbb{A}}^{-s} dh,$$

o   la deuxi  me   galit   s'obtient gr  ce au changement de variable $g \mapsto h^{-1}g$. Ceci nous permet de d  montrer la

Proposition 12. *Si f est un coefficient de $\mathcal{A}_0(G_{\mathbb{A}}, \omega)$ et $\phi \in \mathcal{S}(M_{\mathbb{A}})$, la fonction $\zeta(f, \phi, \cdot)$ peut   tre prolong  e en une fonction enti  re et v  rifie l'  quation fonctionnelle*

$$(148) \quad \zeta(f, \phi, s) = \zeta(\check{f}, \hat{\phi}, n - s),$$

o   $\check{f}(g) = f(g^{-1})$.

D  monstration. On utilise l'  quation fonctionnelle (138) et le fait que la transform  e de Fourier de $\phi(h^{-1} \cdot)$ est $|\det h|_{\mathbb{A}}^n \hat{\phi}(\cdot h)$,

$$(149) \quad \zeta(f, \phi, s) = \int_{\mathbb{A} \times G \backslash G_{\mathbb{A}}} \tilde{\varphi}(h) \zeta(\check{\varphi}, \hat{\phi}(\cdot h), n - s) |\det h|_{\mathbb{A}}^{n-s} dh$$

$$(150) \quad = \int_{\mathbb{A} \times G \backslash G_{\mathbb{A}}} \tilde{\varphi}(h) \int_{G_{\mathbb{A}}} \hat{\phi}(gh) \varphi(g^{-1}) |\det g|_{\mathbb{A}}^{n-s} dg |\det h|_{\mathbb{A}}^{n-s} dh.$$

On effectue maintenant le changement de variable $g \mapsto gh^{-1}$, ce qui donne

$$(151) \quad \int_{\mathbb{A} \times G \backslash G_{\mathbb{A}}} \tilde{\varphi}(h) \int_{G_{\mathbb{A}}} \hat{\phi}(g) \varphi(hg^{-1}) |\det g|_{\mathbb{A}}^{n-s} dg dh,$$

qui est bien $\zeta(\check{f}, \hat{\phi}, n - s)$. \square

Si l'on combine cette proposition avec les r  sultats locaux, on peut construire la fonction L attach  e    une repr  sentation cuspidale irr  ductible.

D  finition 8. *Une repr  sentation cuspidale est un $(\mathfrak{g}, O_n(\mathbb{R})) \times GL_n(\mathbb{A}_f)$ -module qui est isomorphe    un sous-quotient de $\mathcal{A}_0(G_{\mathbb{A}}, \omega)$.*

Plus pr  cis  ment, on montre le

Th  or  me 3. *Soit π une repr  sentation cuspidale irr  ductible.*

Le produit $L(s, \pi) = \prod_v L(s, \pi_v)$, qui est d  fini pour $\operatorname{Re}(s) > n$, se prolonge en une fonction enti  re. De plus, $L(s, \pi)$ v  rifie l'  quation fonctionnelle

$$(152) \quad L(s, \pi) = \epsilon(s, \pi) L(1 - s, \tilde{\pi}),$$

o   $\epsilon(s, \pi) = \prod_v \epsilon(s, \pi_v)$.

D  monstration. La repr  sentation π se d  compose en facteurs locaux, $\pi \simeq \otimes'_v \pi_v$, o   π_v est une repr  sentation admissible irr  ductible de $GL_n(\mathbb{Q}_v)$ (un $(\mathfrak{g}, O_n(\mathbb{R}))$ -module irr  ductible pour la place archim  dienne) et pour presque toutes les places π_v est sph  rique (contient la repr  sentation unit   de $GL_n(\mathbb{Z}_v)$).

D'après les résultats locaux, pour chaque place v , il existe un nombre fini $(\phi_{\alpha_v})_{\alpha_v \in I_v}$ d'éléments de $\mathcal{S}(M_v)$ et de coefficient $(f_{\alpha_v})_{\alpha_v \in I_v}$ de π_v tel que

$$(153) \quad \sum_{\alpha_v \in I_v} \zeta(f_{\alpha_v}, \phi_{\alpha_v}, s + \frac{1}{2}(n-1)) = L(s, \pi_v).$$

De plus, d'après l'équation fonctionnelle locale

$$(154) \quad \sum_{\alpha_v \in I_v} \zeta(\check{f}_{\alpha_v}, \hat{\phi}_{\alpha_v}, 1-s + \frac{1}{2}(n-1)) = \epsilon(s, \pi_v) L(1-s, \tilde{\pi}_v).$$

Notons $I = \prod_v I_v$. Pour presque toutes les places v , π_v est sphérique, I_v est un singleton ; donc I est fini.

Pour $\alpha = (\alpha_v) \in I$, on pose

$$(155) \quad \phi_\alpha = \prod_v \phi_{\alpha_v}, \quad f_\alpha = \prod_v f_{\alpha_v}.$$

Alors $\phi_\alpha \in \mathcal{S}(M_\mathbb{A})$ et f_α est un coefficient de π qui est un sous-quotient de $\mathcal{A}_0(G_\mathbb{A}, \omega)$. De plus,

$$(156) \quad \zeta(f_\alpha, \phi_\alpha, s) = \prod_v \zeta(f_{\alpha_v}, \phi_{\alpha_v}, s).$$

On en déduit que

$$(157) \quad L(s, \pi) = \prod_v L(s, \pi_v) = \prod_v \sum_{\alpha_v \in I_v} \zeta(f_{\alpha_v}, \phi_{\alpha_v}, s + \frac{1}{2}(n-1))$$

$$(158) \quad = \sum_{\alpha \in I} \zeta(f_\alpha, \phi_\alpha, s + \frac{1}{2}(n-1))$$

est une somme finie de fonction zêta, qui chacune se prolonge en une fonction entière. De plus,

$$(159) \quad L(s, \pi) = \sum_{\alpha \in I} \zeta(f_\alpha, \phi_\alpha, s + \frac{1}{2}(n-1))$$

$$(160) \quad = \sum_{\alpha \in I} \zeta(\check{f}_\alpha, \hat{\phi}_\alpha, 1-s + \frac{1}{2}(n-1))$$

$$(161) \quad = \prod_v \sum_{\alpha_v \in I_v} \zeta(\check{f}_{\alpha_v}, \hat{\phi}_{\alpha_v}, 1-s + \frac{1}{2}(n-1))$$

$$(162) \quad = \prod_v \epsilon(s, \pi_v) L(1-s, \tilde{\pi}_v)$$

$$(163) \quad = \epsilon(s, \pi) L(1-s, \tilde{\pi}).$$

□

RÉFÉRENCES

- [1] D. BUMP, *Automorphic Forms and Representations*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, Cambridge University Press, 1997.
- [2] J. CASSELS, A. FRÖLICH, L. M. SOCIETY, AND I. M. UNION, *Algebraic Number Theory : Proceedings of an Instructional Conference. Edited by J. W. S. Cassels and A. Fröhlich*, 1976.
- [3] D. GOLDFELD AND J. HUNDLEY, *Automorphic Representations and L-Functions for the General Linear Group* ; no. vol. 1 in Cambridge Studies in Advanced Mathematics, Cambridge University Press, 2011.