

Apuntes de un Curso de Fundamentos de Física

Nicolás Pérez Julve

Versión 11 de agosto de 2017

Prefacio

Este apunte de estudio fue hecho con el propósito de ayudar a estudiantes universitarios en sus primeros cursos de física. Cualquier sugerencia o error puede ser advertido a nicolasperezjulve@gmail.com.

IMPORTANTE: Este apunte fue diseñado para ser impreso a doble cara, es por esta razón que antes y después del prefacio hay una página en blanco.

“La vida no es fácil, para ninguno de nosotros. Pero... ¡Qué importa! Hay que perseverar y, sobre todo, tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y que esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste.”

Marie Curie

Índice general

1. Magnitudes Físicas, Unidades y Mediciones	1
1.1. Magnitudes Físicas	1
1.2. Sistema Internacional de Unidades (SI)	2
1.2.1. Reglas para el uso del SI	3
1.3. Cambio de Unidades al SI	4
1.3.1. Cambio de unidades de magnitudes fundamentales	4
1.3.2. Cambio de unidades de magnitudes derivadas	4
1.4. Mediciones	5
1.4.1. Precisión y exactitud	5
1.4.2. Tipos de errores	6
1.4.3. Cifras significativas	6
1.4.4. Aproximación y redondeo	6
1.4.5. Orden de magnitud	7
2. Vectores	8
2.1. Vectores	8

Capítulo 1

Magnitudes Físicas, Unidades y Mediciones

1.1. Magnitudes Físicas

En física, existen **magnitudes fundamentales**¹ de las cuales se pueden definir otras magnitudes.

Definición 1.1. *Las **magnitudes fundamentales** son un conjunto de magnitudes tal que ninguna magnitud puede ser expresada en función de otra **magnitud fundamental**.* **Magnitud fundamental**

Ejemplo 1.1. ***Magnitudes fundamentales** son: masa, longitud, tiempo, temperatura entre otras.*

Por otro lado existen **magnitudes derivadas**¹ las cuales se forman combinando las **magnitudes fundamentales**.

Definición 1.2. *Las **Magnitudes derivadas** son todas aquellas que pueden ser expresadas en función de otras magnitudes.* **Magnitud derivada**

Ejemplo 1.2. ***Magnitudes derivadas** son: rapidez, aceleración, presión, entre otras.*

La **rapidez** es una **magnitud derivada** por dos **magnitudes fundamentales** y la construcción de esta cantidad es la “división” de una **longitud** determinada sobre un **tiempo** determinado (más adelante se dará una definición exacta del concepto de **rapidez**). Pero, ¿qué es exactamente la **longitud** y el **tiempo**? Dado que estas magnitudes son fundamentales, no es posible comprenderlas como la combinación de otras magnitudes, por esta razón, estas magnitudes son deducidas mediante una **definición operacional**

Definición 1.3. *Una **definición operacional**² constituye el conjunto de procedimientos que describe las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales (sonidos, impresiones visuales o táctiles, etc.), que indican la existencia* **Definición operacional**

¹JCGM 200:2008(E/F), International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms (VIM) :4

²Extracto de <http://www.tecnicas-de-estudio.org/investigacion/investigacion36.htm>

de un concepto teórico en mayor o menor grado. En otras palabras, especifica qué actividades u operaciones deben realizarse para medir una variable.

De esta forma la masa, la longitud y el tiempo son magnitudes que pueden ser descritas mediante una **definición operacional**.

Masa **Definición 1.4.** *El estándar de masa, el **kilogramo** (que se abrevia kg), se define como la masa de un cilindro de aleación platino-iridio específico que se conserva en la oficina Internacional de Pesos y Medidas en Sèvres, cerca de París.*

Longitud **Definición 1.5.** *El estándar de longitud, el **metro** (que se abrevia en m) es la distancia que recorre la luz en el vacío en $1/299\,792\,458$ segundos.*

Tiempo **Definición 1.6.** *El estándar de tiempo, el **segundo** (que se abrevia como s) se basa en un reloj atómico que usa la diferencia de energía entre los dos estados energéticos más bajos del átomo de cesio. Al bombardearse con microondas de cierta frecuencia, el átomo de cesio sufre una transición entre dichos estados. Un **segundo** se define como el tiempo que tardan $9\,192\,631\,770$ oscilaciones de la radiación emitida producto de la transición.*

Con estas tres magnitudes físicas, es posible construir los fundamentos de la Mecánica Newtoniana, como se verá en los próximos capítulos.

1.2. Sistema Internacional de Unidades (SI)

Se ha visto que las tres magnitudes fundamentales expuestas en la sección anterior, presentan estándares para su medición. Estos estándares corresponden a la unidad de medida para cada magnitud fundamental. A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de cuantificar objetos, distancias entre otras cosas, inventando distintas unidades de medidas, como el largo de un pie, de un antebrazo etc. Durante mucho tiempo, la diversidad de unidades de medida provocó incertidumbre respecto a las mediciones que se hacían.

Las mediciones exactas y confiables requieren unidades inmutables que los observadores puedan volver a utilizar en distintos lugares. El sistema de unidades empleado por los científicos e ingenieros por todo el mundo se denomina comúnmente “sistema métrico.” aunque, desde 1960, su nombre oficial es **Sistema Internacional** o **SI**. En las Tablas (1.1) y (1.2), se muestran algunas unidades.

Tabla 1.1: Unidades de algunas magnitudes fundamentales en el SI

Magnitud	Unidad	Símbolo
Longitud	metro	<i>m</i>
Masa	kilogramo	<i>kg</i>
Tiempo	segundo	<i>s</i>
Cantidad de sustancia	mol	<i>mol</i>

Tabla 1.2: Unidades de algunas magnitudes derivadas en el SI

Magnitud	Unidad	Símbolo
Velocidad lineal	metro cuadrado	m^2
Volumen	metro cúbico	m^3
Densidad de masa	kilogramo sobre metro cúbico	kg/m^3
Velocidad lineal	metro sobre segundo	m/s
Frecuencia	hertz	Hz
Energía	joule	J

El SI también admite prefijos para las unidades de medida, con el fin de expresar las cantidades de una forma mas compacta. En la Tabla (1.3) se muestran los prefijos aceptados en el SI.

Tabla 1.3: Prefijos del SI

Nombre	Símbolo	Factor	Nombre	Símbolo	Factor
exa	E	10^{18}	deci	d	10^{-1}
penta	P	10^{15}	centi	c	10^{-1}
tera	T	10^{12}	mili	m	10^{-3}
giga	G	10^9	micro	μ	10^{-6}
mega	M	10^6	nano	n	10^{-9}
kilo	k	10^3	pico	p	10^{-12}
hecto	h	10^2	femto	f	10^{-15}
deca	da	10^1	atto	a	10^{-18}

Con las unidades de medida y los prefijos del SI, se puede expresar **todas** las cantidades medibles.

1.2.1. Reglas para el uso del SI

1. No se colocarán puntos luego de los símbolos de las unidades SI, sus múltiplos o submúltiplos. **Ejemplo:** kg , dm , m .
2. Cuando sea necesario referirse a una unidad, se recomienda escribir el nombre completo de una unidad, salvo casos en los cuales no exista riesgo de confusión al escribir únicamente el símbolo.
3. El símbolo de una unidad será el mismo para el singular como el plural. **Ejemplo:** un kilogramo 1kg - cinco kilogramos 5 kg.
4. No se acepta utilización de abreviaturas para designar las unidades SI. Existe símbolos no abreviaturas. **Ejemplo:** kgs no corresponde a kilogramos, lo correcto es: kg.
5. Cuando se deba escribir (o pronunciar) el plural del nombre de una unidad SI, se usarán las reglas de la Gramática Española. **Ejemplo:** (singular) metro - (plural) metros, (singular) mol - (plural) moles.
6. Se usarán prefijos SI y sus símbolos para formar respectivamente los nombres y los símbolos de los múltiplos y submúltiplos de las unidades SI. **Ejemplo:**

centímetro = cm.

7. No deberán combinarse nombres y símbolos al expresar el nombre de una unidad derivada. **Ejemplo: metro/s , lo correcto es: m/s o metro/segundo.**

1.3. Cambio de Unidades al SI

1.3.1. Cambio de unidades de magnitudes fundamentales

Si se quiere transformar las magnitudes de masa, longitud y tiempo se puede proseguir como en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 1.3. Si se quiere transformar la cantidad de 100 g a kg se prosigue como sigue (tomando en cuenta que 1 kg son 1000 g):

$$\cancel{100g} \xrightarrow{1} \frac{1kg}{\cancel{1000g} \xrightarrow{10}} = \frac{1kg}{10} = 0,1kg \quad (1.1)$$

La idea de este procedimiento se basa utilizar la razón entre kilogramo y gramo, como sabes 1kg : 1000g.

Ejemplo 1.4. Transformar la cantidad de 100 minutos a segundos. Sabemos que 1 minuto corresponde a 60 segundos, cuya razón se escribe 1 min : 60 s o bien 60 s : 1 min. La transformación se hace como:

$$\cancel{100min} \xrightarrow{100} \frac{60s}{\cancel{1min} \xrightarrow{1}} = 6000s \quad (1.2)$$

Ejemplo 1.5. Transforme la cantidad de 1 centímetro a metro. Para realizar esta transformación, sabemos que 1 m : 100 cm.

$$\cancel{1cm} \xrightarrow{1} \frac{1m}{\cancel{100cm} \xrightarrow{100}} = \frac{1m}{100} = 0,01m \quad (1.3)$$

Ejercicio 1.1. Transforme 1 hora a SI.

1.3.2. Cambio de unidades de magnitudes derivadas

Para el cambio de magnitudes derivadas, se utiliza el mismo procedimiento agregando la razón de cualquier otra magnitud en cuestión.

Ejemplo 1.6. Transforme 36 km/h al SI. Para este caso sabemos que 1000 m : 1 km y 1 h : 3600 s. La operación es:

$$36 \frac{\cancel{km}}{\cancel{h}} \frac{1000m}{\cancel{1km}} \frac{1\cancel{h}}{3600s} = 10 \frac{m}{s} \quad (1.4)$$

Ejemplo 1.7. *Transforme la densidad del agua ($1\text{g} / \text{cm}^3$). Para realizar esta operación es necesario comprender que hay que elevar una cantidad al cuadrado, como muestra la operación:*

$$1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \left(\frac{100\text{cm}}{1\text{m}} \right)^3 \frac{1\text{kg}}{1000\text{g}} = \frac{1}{1000} \frac{\text{kg}}{\text{cm}^3} \frac{100^3 \cancel{\text{cm}^3}}{\text{m}^3} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad (1.5)$$

Ejercicio 1.2. *Transforme 20 cm^2 a SI.*

Ejercicio 1.3. *Transforme 1000 cm^3 a SI.*

1.4. Mediciones

1.4.1. Precisión y exactitud

Definición 1.7. *Se refiere al número de cifras significativas que representan una cantidad o extensión en lecturas de un instrumento.* **Precisión**

Definición 1.8. *Se refiere a la aproximación de una medida al valor verdadero.* **Exactitud**




Figura 1.1: Exactitud vs precisión

1.4.2. Tipos de errores

Definición 1.9 (Error aleatorio). *Al repetir una medida varias veces, se obtienen diferentes resultados que están relacionados a la precisión de los datos obtenidos. Esta dispersión se debe a la presencia del error aleatorio.*

Definición 1.10 (Error sistemático). *Este tipo de error está relacionado con la exactitud del resultado, a mayor exactitud menor es el error sistemático. Las fuentes de este tipo de error podrían ser la mala calibración del instrumento de medición o un método que siempre sobre estime o sub estime un valor medido.*

Definición 1.11 (Equivocación). *Este tipo de error es cuando en el conjunto de medidas se encuentran algunos datos malos y no tienen relación con el experimento ensí. Un ejemplo de equivocación podría ser un error de escritura al transferir los datos.*

1.4.3. Cifras significativas

El número de cifras significativas de un número, lo obtenemos mirando los dígitos de dicho número de izquierda a derecha y comenzando a contar desde el primer dígito distinto de cero hasta el último dígito, sea o no cero. La mencionada cantidad de dígitos nos entrega el número de cifras significativas.

Algunos ejemplos:

1	1 cifra significativa
25	2 cifras significativas
10 000	5 cifras significativas
0,00045	2 cifras significativas

Ejercicio 1.4. *¿Cuántas cifras significativas tienen los números 10,00078 y 00,004506?*

1.4.4. Aproximación y redondeo

Si queremos expresar el número $\pi = 3,1415\dots$ con n cifras significativas, debemos desechar todas las cifras que se encuentren a la derecha del n -ésimo lugar

Reglas

1. Si la cifra que se encuentra en el lugar $(n + 1)$ es mayor que 5, se le agrega una cantidad a la cifra que se encuentra en el lugar n -ésimo.
2. Si la cifra que se encuentra en el lugar $(n + 1)$ es menor que 5, dejamos la cifra n -ésima inalterable.
3. Si la cifra que se encuentra en el lugar $(n + 1)$ es igual a 5, adoptaremos el siguiente criterio:
 - Si la n -ésima cifra es impar, se le agrega una unidad.
 - Si la n -ésima cifra es par, la dejamos inalterable

Este último criterio es totalmente arbitrario y para asegurarnos que realmente es al azar el que la cifra enésima aumente o quede inalterable, debemos cerciorarnos que la posibilidad que sea par es la misma que sea impar. Para estos efectos consideramos al cero como número par.

Para expresar el resultado de una operación con números de distintas cifras significativas, se utiliza la siguiente regla:

1. Suma y sustracción: El resultado se expresa con tantos decimales como el número de menor cantidad de decimales que participa de la operación.
2. Multiplicación y división: El resultado se expresa con tantas cifras significativas como la magnitud que tenga menor número de cifras significativas.

1.4.5. Orden de magnitud

El orden de magnitud es la potencia de diez más cercana a algún número.

Ejemplo 1.8. *Algunos ejemplos son:*

1. 7,2 es de orden 10^1
2. 4,3 es de orden 10^0
3. 150,4 es de orden 10^2

Capítulo 2

Vectores

2.1. Vectores

Escalar **Definición 2.1.** Un ***Escalar*** es un solo valor que no tiene indicador direccional y que representa una cantidad.

Vector **Definición 2.2.** Un ***vector*** es un arreglo de números (que puede ser expresado en 1,2,3 ... dimensiones) llamadas *componentes de vectores* que se combinan con indicadores direccionales (bases) para formar una cantidad vecotorial (magnitud, dirección y sentido).