

Nombre : Tatiana Moris Guerra Rut: 23.590.325-3 Fecha: 12 de Octubre 2023



NERVIOSO

1. ¿Qué tipos de edemas existen?

a) Edema vasogénico y edema hipoxico.

b) Edema vasogénico y edema citotóxico.

c) Edema citotóxico y edema transitorio

d) Solo existe el edema vasogénico.

2. ¿Qué afirmación es correcta con respecto a la presión intracraneal?

a) Puede aumentar por un aumento del colesterol.

b) Puede aumentar por un aumento del líquido cerebroespinal.

c) Puede disminuir por una hemorragia.

d) Puede disminuir por un tumor.

3. El daño axonal difuso puede:

a) Producir mareos, dolores de cabeza y daño asimétrico.

b) Producir hemorragia

c) Producir edema transitorio

d) Ninguna de las anteriores

4. Un accidente cerebrovascular genera:

I. Parálisis

II. Dolor de cabeza

III. Sensibilidad en las extremidades

a) I

b) Ninguna

c) I y II

d) I, II y III

5. ¿Cuáles son los factores de riesgo para un accidente cerebrovascular?

- I. Hipertensión arterial
- II. Diabetes mellitus
- III. Demencia
- IV. Colesterol alto

- a) I, IV
- b) I, II
- c) I, II y III
- d) I, II y IV

6. Las enfermedades degenerativas incluyen a:

- I. Demencia tipo alzhéimer
- II. Esclerosis múltiple
- III. Demencia vascular

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I, II y III

8. ¿Qué es la esclerosis múltiple?

- a) Destrucción de la vaina de mielina en los axones
- b) Destrucción de un axón
- c) Un tipo de accidente cerebrovascular
- d) Ninguna de las anteriores

9. ¿Para qué sirve el test MME?

- a) Para hacer un diagnóstico de control de emociones
- b) Para hacer un diagnóstico de accidente cerebrovascular
- c) Para hacer un diagnóstico de demencia
- d) Todas las anteriores

10. ¿Qué tipo de accidente cerebrovascular implica fragmentos que se desprenden de un trombo fuera del cerebro?

- a) Hemorrágico
- b) Isquémico trombótico
- c) Embólico
- d) Hipoperfusión global

11. Son enfermedades neurológicas degenerativas:

- a) Alzheimer

- b) Epilepsia
- c) Papiledema
- d) Todas las anteriores

12 Entre los factores de riesgo de un accidente cerebrovascular se encuentran:

- a) Policitemia
- b) Fibrilación auricular
- c) Anticonceptivos orales
- d) Todas las anteriores

13 ¿Qué estructuras cerebrales experimentan contracción en la enfermedad de Alzheimer?

- a) Ventrículos y surcos
- b) Cerebelo y tálamo
- c) Hipotálamo y ganglios basales
- d) Amígdala y corteza cerebral

14 ¿Qué sustancia se produce en el núcleo de Meynert y se pierde en la enfermedad de Alzheimer?

- a) Dopamina
- b) Acetilcolina
- c) Serotonina
- d) Glutamato

15 ¿Cuál es uno de los factores genéticos relacionados con la enfermedad de Alzheimer?

- a) Gen en el cromosoma 8
- b) Gen en el cromosoma 3
- c) Gen en el cromosoma 21
- d) Gen en el cromosoma 13

ENDOCRINO

1) La insulina cause la disminución de los niveles de glucosa, por otra parte el glucagón produce el incremento de los niveles de glucosa, la relación entre las dos hormonas se puede decir que es

- a) Sinérgica
- b) Permisiva
- c) Antagonista
- d) Expresiva
- e) ninguna de las anteriores

2) Los factores de riesgo para la diabetes tipo 2 incluyen

I.- Ser miembro de una población de riesgo

II.- Historia familiar

III.- Obesidad

IV.- Alteraciones genéticas

- a) Solo I
- b) Solo II
- c) I, II y III
- d) I, III y IV
- e) Todas las anteriores

3) Los factores de riesgos de la diabetes tipo 1 incluyen

- I.- Sedentarismo
- II.- Historia familiar
- III.- obesidad
- IV.- Disminución de la glucosa sanguínea

- a) Solo I
- b) Solo II**
- c) I y III
- d) I, IV
- e) Ninguna de las anteriores

4) Las causas de la diabetes tipo 1 no se encuentran bien dilucidadas, sin embargo se puede decir que podría ser causada por:

- I.- Infecciones virales
- II.- Factores ambientales
- III.- Procesos autoinmunes
- IV.- Productos lácteos animales

- a) Solo I
- b) Solo II
- c) solo III
- d) I, III y IV
- e) Todas las anteriores**

5) El principal daño producido durante la diabetes tipo 1 es:

- I.- Destrucción de las células alfa pancreáticas
- II.- Destrucción de las células beta pancreáticas
- III.- Incremento de la circulación pancreática
- IV.- Activación de las proteasas pancreáticas

- a) Solo I
- b) Solo II**
- c) Solo III
- d) I, II y IV
- e) Ninguna de las anteriores

6) el aumento de los niveles sanguíneos de glucosa durante la diabetes tipo 1 se produce por

- I.- Destrucción de la célula alfa pancreática
- II.- Disminución en el transporte de glucosa en el tejido adiposo y musculo
- III.- Destrucción de la célula beta pancreática
- IV.- Incremento en la unión de la insulina al receptor de insulina

- a) Solo II
- b) I y II
- c) II y III**
- d) I, II y IV
- e) Todas las anteriores

7) En pacientes diabéticos, cual(es) de las siguientes alteraciones se producen en el metabolismo de los lípidos

- I.- Disminución de los niveles de NADP
- II.- Incremento del oxaloacetato
- III.- Aumento de los cuerpos cetónicos
- IV.- hipertrigliceridemia

- a) Solo II
- b) II y III
- c) I, II y IV
- d) I, III y IV**
- e) III y IV

8) En cuanto al transporte exógeno de lípidos en el organismo se puede decir que:

I.- Ocurre entre la célula hepática y tejidos como el músculo y los adipocitos

II.- La principal lipoproteína de transporte es la LDL

III.- La principal proteína de transporte son quilomicrones

IV.- Se produce entre las células intestinales (enterocito) y el hígado

a) Solo I

b) Solo II

c) III y IV

d) II, III y IV

e) Todas las anteriores

9) Las causas de la diabetes tipo 2 son

I.- Obesidad

II.- Factores genéticos

III.- Daño a las células alfa-pancreáticas

IV.-Daño a las células beta-pancreáticas

a) Solo I

b) Solo II

c) I, II y III

d) I, II y IV

e) I, III y IV

10) la enfermedad de Graves se relaciona con:

I.- hipotirodismo

II.- hipertiroidismo

III Niveles elevados de TSH

IV Niveles bajos de TRH

a) Solo II

b) I, II y IV

c) III y IV

e) Solo I

11) la enfermedad de Hashimoto se relaciona con:

I.- hipotirodismo

II.- hipertiroidismo

III Niveles elevados de TSH

IV Niveles bajos de TRH

a) Solo I

b) I, II y IV

c) I y III

e) Solo II

12) La Diabetes insípida se produce por:

a) Insuficiencia de ACTH

b) Sobreproducción de ADH

c) Insuficiencia de ADH

d) hipotirodismo

e) hipetiroidismo

13) El síndrome de Cushing se relaciona con:

a) Insuficiencia de ADH

b) Sobreproducción de ACTH

c) Sobreproducción de cortisol

d) Insuficiencia de cortisol

e) b y c

14) La enfermedad de Hashimoto y Graves se producen por:

- a) Deficiencia de Yodo
- b) sobreconsumo de Yodo
- c) Reacción Autoinmune
- d) Todas las anteriores
- e) Ninguna anterior

15) La hiperprolactinemia produce:

- a) Galactorrea
- b) Alteraciones en el ciclo menstrual
- c) Infertilidad
- d) Todas las anteriores

