

La aterosclerosis y la arterioesclerosis se diferencian en:

- a) La presencia de placas de ateroma
- b) El estrechamiento del lumen arterial
- c) El endurecimiento de la pared arterial
- d) Todas las anteriores
- e) No se diferencian

La placa de ateroma está formada por:

- a) Lípidos
- b) Colesterol
- c) Músculo liso
- d) Todas las anteriores
- e) Ninguna de las anteriores

El infarto al miocardio consiste en:

- a) Disminuye el flujo coronario
- b) Aumenta el flujo coronario
- c) Aumenta la presión coronaria
- d) Todas las anteriores
- e) Ninguna de las anteriores

Los accidentes cerebrovasculares se correlacionan positivamente:

- a) Hipertensión
- b) Sedentarismo
- c) Obesidad
- d) Todas las anteriores
- e) Ninguna de las anteriores

Las secuelas del accidente cerebrovascular incluyen:

- a) Parálisis
- b) Muerte de neuronas
- c) Edema cerebral
- d) Todas las anteriores
- e) Ninguna de las anteriores

Los límites superiores de la presión arterial normal son:

- a) 120 y 80 mm Hg
- b) 110 y 60 mm Hg

- c) 180 120 mm Hg
- d) No hay límites superiores, sólo inferiores
- e) Ninguna de las anteriores

Los medicamentos para tratar la hipertensión incluyen:

- a) Diuréticos
- b) Vasoconstrictores
- c) Aspirina
- d) Todas las anteriores
- e) Ninguna de las anteriores

Los determinantes de la presión osmótica de la sangre:

- a) Proteínas
- b) Sodio
- c) Globulinas
- d) Todas las anteriores
- e) Ninguna de las anteriores

La hipertensión arterial crónica, no tratada, afecta los siguientes órganos:

- a) Riñón
- b) Ojo
- c) Corazón
- d) Todas las anteriores
- e) Ninguna de las anteriores

Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina se usan en el tratamiento de:

- a) Fiebre
- b) Asma
- c) Hipertensión
- d) Enfermedad obstructiva crónica
- e) Ninguna de las anteriores

La hipertensión se asocia a:

- a) Alcoholismo
- b) Tabaquismo
- c) Estrés
- d) Sedentarismo
- e) Todas las anteriores

Los factores de la dieta que facilitan la hipertensión incluyen:

- a) Consumo de sodio

- b) Dieta pobre en fibra vegetal
- c) Consumo de grasas animales
- d) Bajo consumo de potasio
- e) Todas las anteriores

La hipertensión secundaria tiene como causas a:

- a) Hipertiroidismo
- b) Hiperaldosteronismo
- c) Hiperplasia renal
- d) Neuritis cerebral
- e) Glomerulonefritis
- f) Todas las anteriores



Un nivel alto de LDL produce aterosclerosis debido a que:

- a) Se acumula en la pared arterial porque se une a receptores de LDL endoteliales
- b) Estimula la hiperglicemia
- c) Disminuye el flujo sanguíneo cerebral
- d) Todas las anteriores
- e) Ninguna de las anteriores



Las enfermedades obstructivas crónicas son:

- a) Bronquitis crónica
- b) Asma
- c) Bronquiectasias
- d) Enfisema
- e) Todas las anteriores

Del enfisema se puede decir:

- a) Se debe pérdida de elasticidad
- b) Es irreversible
- c) Produce hipoxemia
- d) Todas las anteriores
- e) Ninguna de las anteriores

Los síntomas comunes en las enfermedades obstructivas crónicas son:

- a) Disnea
- b) Tos
- c) Hemoptisis
- d) Todas las anteriores

e) Ninguna de las anteriores

El colon irritable se puede manifestar como:

a) Hipomotilidad intestinal

b) Hiperomotilidad intestinal

c) Meteorismo

d) Dolor abdominal

e) Todas las anteriores

Las consecuencias del cólera que constituyen la urgencia médica son:

1. Deshidratación

2. Pérdida de electrolitos

3. Aumento del potasio

a) sólo 1

b) sólo 2

c) sólo 3

d) 1 y 2

e) 1, 2 y 3

Verdadero y Falso:

F El sistema cardiovascular se encarga de regular la temperatura corporal.

V El reflujo ácido se origina en una función deficiente del esfínter esofágico inferior.

F La colitis inflamatoria se trata farmacológicamente con agentes protectores del estómago.

F El colon irritable se origina en una inflamación de la mucosa.

¿Por qué se caracteriza el asma?

a) broncoconstricción

b) obstrucción del flujo de aire de las vías respiratorias

c) presencia de sibilancias, sensación de estrechez del tórax, disnea y tos

d) Todas

e) Ninguna

El proceso fisiológico fundamental en las enfermedades obstructivas es:

a) Aumento de la resistencia del flujo de aire

b) Aumento del volumen de aire

c) Disminuye el volumen de aire

d) Ninguna

e) A y B son correctas

Con respecto al ateroma se puede decir que:

---

- a) Se asocia a exceso de colesterol LDL en la sangre.
- b) Puede involucrar mal funcionamiento de válvula
- c) Ocurre en la aterosclerosis
- d) Puede causar isquemia
- e) Todas.

Con respecto a la hipertrofia cardíaca:

I.- Solo ocurre en el ventrículo izquierdo

II.- Se trata de un aumento del grosor del miocardio

III.- Solo ocurre en el ventrículo derecho

IV.- Puede ser una respuesta secundaria a una estenosis pulmonar debido a una reducción del flujo sanguíneo al pulmón

- a) I y II
- b) Solo III
- c) II, III y IV
- d) II y IV

La deficiencia en la producción de bilis afectará la digestión de:

- a) los carbohidratos
- b) las grasas
- c) las proteínas
- d) las sales minerales
- e) las vitaminas hidrosolubles

"Es una inflamación en el tracto gastrointestinal, que se extiende a través de todas las capas de la pared intestinal". Esta definición se refiere a:

- a) Enfermedad celíaca.
- b) Obstrucción intestinal.
- c) Enfermedad de Crohn.
- d) Colitis Ulcerativa.
- e) Apendicitis.

Respecto a la disfagia es correcto decir que:

- a) Se puede presentar por formación de cicatrices, debido a la ingesta de alimentos muy grandes.
- b) Puede ocurrir por tumores.
- c) Se puede presentar por alteraciones o malformaciones de la mucosa.
- d) a, b y c.
- e) a y c.

Respecto a la colitis ulcerosa podemos afirmar:

- a) Es una enfermedad inflamatoria de la mucosa del recto y el colon.
- b) La incidencia anual en América del Norte se ha estimado entre 2 y 14 por 100.000

personas.

- c) Comienza como una inflamación en la base de las criptas de Lieberkuhn.
- d) Hay daño en el epitelio, invasión de leucocitos y formación de abscesos en las criptas.
- e) Todas.

¿Cuáles son los factores patogénicos y etiológicos del síndrome intestinal irritable?

- a) La mayoría de los casos se debe a factores genéticos.
- b) Las causas son desconocidas.
- c) Estrés psicológico.
- d) Infecciones del tracto intestinal reiteradas.
- e) Dietas.

¿En qué se diferencia la diarrea secretora de la exudativa?

- a) La diarrea secretora tiene presencia de moco, proteínas y sangre, mientras en la exudativa no hay absorción.
- b) La diarrea secretora tiene presencia de toxinas bacterianas de *Vibrio cholerae* o *Staphylococcus aureus*, mientras la exudativa se relaciona con un disturbio en la motilidad intestinal.
- c) La diarrea secretora tiene presencia de toxinas bacterianas de *Vibrio cholerae* o *Staphylococcus aureus*, mientras la exudativa tiene presencia de moco, proteínas y sangre.
- d) a y b.
- e) Ninguna de las anteriores.

¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta respecto al dolor esofágico?

- a) Se manifiesta como una sensación de ardor en la zona del hipogastrio.
- b) Puede ser causado por la acidez estomacal (pirosis), cuyo contenido gástrico refluye hacia el esófago generando una sensación de ardor retro esternal.
- c) Se divide en tres alteraciones: dolor esofágico osmótico, dolor esofágico secretor y dolor esofágico bacteriano.
- d) El consumo de grasas, café y alcohol es beneficioso para el tratamiento de este padecimiento.
- e) Es provocado por problemas cardiovasculares y del sistema nervioso central.

"Dolor al deglutir, que puede acompañar a la disfagia"

- a) Obstrucción.
- b) Odinofagia.
- c) Dispareunia.
- d) Pirois.
- e) Constipación.