

## Matemática Discreta 2023

Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getulio Vargas  
Professora Maria Soledad Aronna

---

### Lista 1

**Exercício 1** Em um torneio, o Flamengo venceu o Fluminense uma vez, o Botafogo venceu o Vasco uma vez, o Flamengo venceu o Botafogo duas vezes, o Fluminense venceu o Vasco uma vez e o Fluminense venceu o Flamengo uma vez. Nos itens a seguir, use um grafo para modelar o torneio. Os times são os vértices. Descreva o tipo de grafo usado em cada item (grafo trivial, grafo não-direcionado, grafo direcionado, grafo simples).


- (a) Há uma aresta entre os times se eles se enfrentaram no torneio.
- (b) Há uma aresta entre os times para cada partida jogada entre eles.
- (c) Há uma aresta do time  $t_i$  para o time  $t_j$  se  $t_i$  venceu  $t_j$  pelo menos uma vez.
- (d) Há uma aresta do time  $t_i$  para o time  $t_j$  para cada vitória de  $t_i$  sobre  $t_j$ .

**Exercício 2** Faça a representação gráfica dos seguintes grafos  $G = (V, E)$ :


- (a)  $V = \{\square, \bigcirc, \diamond, \triangle\}$ ,  $E = \{\{\square, \bigcirc\}, \{\bigcirc, \diamond\}, \{\bigcirc, \triangle\}, \{\diamond, \triangle\}\}$
- (b)  $V = \{A, B, C, D\}$ ,  $E = \{\}$
- (c)  $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ ,  
 $E = \{\{1, 2\}, \{2, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{6, 7\}, \{6, 8\}, \{7, 8\}\}$ .

**Exercício 3** Explique por que nenhum dos grafos dos itens a seguir contém um caminho que começa e termina no vértice  $a$  passando em cada aresta uma única vez.


(a)



(b)




(c)




**Exercício 4** Mostre que cada grafo dos itens a seguir tem um caminho que começa e termina no vértice  $a$  passando em cada aresta exatamente uma vez, encontrando tal caminho por inspeção.


(a)



(b)



**Exercício 5** Para o grafo  $G = (V, E)$  abaixo, encontre  $V$ ,  $E$ , todas as arestas paralelas, loops, vértices isolados e determine se  $G$  é um grafo simples. Também escreva em quais vértices a aresta  $e_1$  é incidente.



**Exercício 6** Esboce grafos  $G_1$ ,  $G_2$ ,  $G_3$  e  $G_4$ , cada um com 5 vértices e 8 arestas, satisfazendo as seguintes condições:

- (a)  $G_1$  é um grafo simples;
- (b)  $G_2$  é um grafo não-simples sem loops;
- (c)  $G_3$  é um grafo não-simples sem arestas paralelas;
- (d)  $G_4$  é um grafo não-simples contendo tanto loops quanto arestas paralelas.

**Exercício 7** Abaixo temos a definição de  $K_n$ :

**Definição** ( $K_n$ ). Chamamos de *grafo completo com  $n$  vértices*, denotado por  $K_n$ , o grafo simples de  $n$  vértices no qual existe uma aresta entre cada par de vértices distintos.


- (a) Desenhe  $K_3$  e  $K_5$ .
- (b) Encontre uma fórmula para o número de arestas em  $K_n$ .

**Exercício 8** Vejamos a definição de Grafo Bipartido:


**Definição** (Grafo Bipartido). Um grafo  $G = (V, E)$  é *bipartido* se existem subconjuntos  $V_1$  e  $V_2$  (ambos possivelmente vazios) de  $V$  tais que  $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ ,  $V_1 \cup V_2 = V$  e cada aresta em  $E$  é incidente em um vértice de  $V_1$  e um vértice de  $V_2$ .

Diga quais dos grafos a seguir são bipartidos. Se o grafo for bipartido, especifique os conjuntos disjuntos de vértices.

(a)



(b)



**Exercício 9** Vamos introduzir também a definição de  $K_{m,n}$ :

**Definição** ( $K_{m,n}$ ). É chamado de *grafo bipartido completo com  $m$  e  $n$  vértices*, denotado por  $K_{m,n}$ , um grafo simples cujo conjunto de vértices é particionado nos conjuntos  $V_1$  e  $V_2$ , com  $|V_1| = m$  e  $|V_2| = n$ , no qual o conjunto de arestas consiste em todas as arestas da forma  $\{v_1, v_2\}$  com  $v_1 \in V_1$  e  $v_2 \in V_2$ .

- (a) Desenhe  $K_{2,3}$  e  $K_{3,3}$ .
- (b) Encontre uma fórmula para o número de arestas em  $K_{m,n}$ .

**Exercício 10** É possível existir um grupo de 7 pessoas tal que cada pessoa conheça exatamente 3 outras pessoas neste grupo?

**Exercício 11** (a) Seja  $G$  um grafo com 4 vértices e com a sequência de graus  $(4, 3, 2, 1)$ . Dê o número de arestas de  $G$  e construa um grafo com tais características.

(b) Existe algum grafo simples com 4 vértices e com sequência de graus  $(4, 3, 2, 1)$ ?

**Exercício 12** Paul Erdős (1913-1996) foi um dos matemáticos mais prolíficos de todos os tempos. Ele foi o autor ou co-autor de por volta de 1500 artigos. Matemáticos que foram co-autores de um artigo com Erdős têm o número de Erdős igual a 1. Matemáticos que não foram co-autores de um artigo com Erdős mas foram co-autores de um artigo com um matemático cujo número de Erdős é 1 têm o número de Erdős igual a 2. Os números de Erdős seguintes são definidos de maneira similar. Por exemplo, Richard Johnsonbaugh (o autor do livro onde consta este exercício) tem o número de Erdős 5. Johnsonbaugh foi co-autor de um artigo com Tadao Murata, Murata foi co-autor de um artigo com A. T. Amin, Amin foi co-autor de um artigo com Peter J. Slater, Slater foi co-autor de um artigo com Frank Harary e Harary foi co-autor de um artigo com Erdős. Desenvolva um modelo gráfico para os números de Erdős. No seu modelo, o que é um número de Erdős?