

2^a versão

giovedì 19 settembre 2024 09:18



Eg: $\forall n \exists m (n \leq m \wedge P(n, m))$
 per ogni n esiste una m ,
 tale che $n \leq m$ e $P(n, m)$

Online Procedures

$$\begin{array}{c} \neg \rightarrow \wedge \vee \rightarrow \Rightarrow \\ \wedge \vee \Rightarrow \Leftrightarrow (\text{kontrola}) \end{array}$$
$$Es: (A \wedge (\neg B) \vee C) \Rightarrow (D \Rightarrow (B \vee (C \vee E)))$$

Se A e not B oppure C
quindi P allora $\neg B \vee C$ è vero


Teaie degt lasini

Principi Campnessiana $A = \{X \mid P(X)\}$

Caratteristiche { = Apparenza
= Comportamento

$$\{\{x\}\} \quad x \notin B$$

Due espressioni
l'elemento dimettente
il primo livello
e in modo uguale

$$1 \notin \{1, 2, 3\}$$
$$\{1\} \subseteq \{1, 2, 3\}$$
$$\{1,3\} \subseteq \{1,2,3\}$$
$$\{1, 3\} \notin \{\{4, 3\}c\}$$
$$\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1, 1, 2\}$$


Perdossu:

$X = \{y \mid y \neq y\}$

$\downarrow$

$X \in X$ se $X \notin X$

3^a lesson

20 Sept. 14

Teori mendasar dari teori

↓ g_{max} : Zmax (d-1) $\rightarrow$ V (22) $\rightarrow$ 22.2.15' ...

↓
3. Parallelismus:

2. Sejam $\phi = \phi(t)$ uma função contínua e

$\frac{1}{2}x + y$

Assiomi di compattezza: $\forall x, \forall y, (x \neq y) \Rightarrow \exists z, (z \neq x \wedge z \neq y)$

for $a_i, x \in Y$ 2 spp

due insieme
246 uguali 246, 246 2 299

hans gi stori elenki

Definire di curva collinare: $X \in Y \left(\frac{dY}{dX} \right) \left(\frac{dY}{dX} \right)$

definitiva: e' una alternativa $\rightarrow$ si potrebbe anche ob

(no postal / no letterbox)

onedrive.live.com/redir?resid=

