

Ottimizzazione

Nicolò Giuliani

Indice


1	Modelli di Problemi di Ottimizzazione	2
1.1	Intro	2
1.1.1	Preliminari	2
1.1.2	Problemi di ottimizzazione	3
1.2	Modelli	7
1.2.1	Problema dello zaino	8
1.2.2	Problema MST	8
1.2.3	Problema TSP	9
1.2.4	Problema Min Cardinality Machine Scheduling	10
1.2.5	Selezione di sottoinsiemi	10
1.2.6	Set Covering Problem	10
1.2.7	Progetto di reti	12
1.2.8	Costo fisso di produzione	12
1.2.9	Ordinamento di lavori su macchine	13
1.2.10	Min Makespan Machine Scheduling	13
1.2.11	min Funzioni convesse	14
1.2.12	Modello PLI	15
1.2.13	Altri modelli PLI	15
1.2.14	Bin Packing Problem (BPP)	16
1.3	GNU	17
1.3.1	Caratteristiche avanzate	18
2	Problemi di ottimizzazione su reti	19
3	Algoritmi per PL e PLI	19
3.1	Geometria Della Programmazione Lineare	19
3.2	Dualità, Direzioni Ammissibili e di Crescita	23
3.3	L'algoritmo del Simplex	24
3.4	La tecnica Branch-and-Bound	25

1 Modelli di Problemi di Ottimizzazione

1.1 Intro

1.1.1 Preliminari

Definizione: z è **combinazione convessa** di x, y se $\exists \lambda \in [0, 1]$ t.c. $z = \lambda x + (1 - \lambda)y$




Definizione: z è **combinazione convessa** di K punti $p_1, p_2, \dots, p_K \in \mathbb{R}^n$

$$z = \sum_{i=1, K} \lambda_i p_i \quad \text{con } \lambda_i \geq 0$$


e

$$\sum_{i=1, K} \lambda_i = 1$$



Definizione $F \subseteq \mathbb{R}^n$ è un **insieme convesso** se


$$\forall x, y \in F \text{ e } \forall \lambda \in [0, 1] \\ z = \lambda x + (1 - \lambda)y \in F$$



Proprietà degli insiemi convessi:


- $\mathbb{R}^n$ è convesso

- Se abbiamo F_i convessi allora $F = \bigcap F_i$ è convesso



Definizione: z è **vertice** di un insieme convesso F se e solo se non è combinazione convessa di altri punti di F

Definizione: dato un insieme di punti $P = \{p_1, \dots, p_K\} \subset \mathbb{R}^n$ si dice **chiusura convessa** di P ($\text{conv}(P)$) il più piccolo insieme che contiene P .



Definizione: Dato $F \subseteq \mathbb{R}^n$ convesso, allora


$$\phi : F \rightarrow \mathbb{R}$$

è convessa se:

$$\forall x, y \in F, \forall \lambda \in [0, 1]$$

si ha allora:

$$\phi(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda \phi(x) + (1 - \lambda)\phi(y)$$



1.1.2 Problemi di ottimizzazione

Un problema di ottimizzazione cerca la risposta che dipende da parametri e variabili. Un problema P viene descritto dai suoi parametri, variabili e i loro legami; e la descrizione delle soluzioni che devono avere.

Un'istanza del problema P si ottiene specificando valori concreti per tutti i parametri (NON VARIABILI!)

Problema	Istanza
$ax^2 + bx + c = 0$	$5x^2 - 6x + 1 = 0$
$Ax \leq 0$	$\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$

Possiamo dire che


- $x = (x_1, \dots, x_n) \in F'$ vettore di **variabili decisionali**
- $F \subseteq F'$ insieme **soluzioni ammissibili**
- $c : F \rightarrow \mathbb{R}$ funzione **costo**

Per esempio vogliamo trovare il minimo con


$$(P) \quad \min c(x) : x \in F$$

ovvero trovare $x^* \in F$ (ottimo globale) tale che

$$z(P) = c(x^*) \leq c(x) \forall x \in F$$




I problemi di ottimizzazione possono essere sia di minimizzazione che massimizzazione. Dato $(P) \quad \min c(x) : x \in F$, il problema $(P') \quad -\max -c(x) : x \in F$ è equivalente a (P) . Ossia $z(P) = z(P')$, i due problemi hanno lo stesso insieme di soluzioni ottime.



Regione ammissibile La regione ammissibile di F può essere definita come

- esplicitamente: specificando le proprietà di $x \in F$
- implicitamente: attraverso equazioni e disequazioni



Vedremo come sia più conveniente avere solo una tipologia di forma (solo disequazioni/equazioni, ecc). Dato un modello in forma generale possiamo costruire un nuovo modello con la forma desiderata. Per esempio

$$\min\{c(x) : x \in F\} = -\max\{-c(x) : x \in F\}$$

- Da disequazione a equazione:

$$\begin{aligned} -x_1 \leq d_1 &\rightarrow x_1 + x_s = d_1 \text{ con } x_s \text{ variabile } \mathbf{slack} \\ -x_1 \geq d_1 &\rightarrow x_1 - x_s = d_1 \text{ con } x_s \text{ variabile } \mathbf{surplus} \end{aligned}$$

- Da equazione a disequazione

$$a_j^T x = d_i \rightarrow \begin{cases} a_j^T x \geq d_j \\ -a_j^T x \geq -d_j \end{cases}$$

Le trasformazioni possono aumentare i vincoli o le variabili del modello rispetto a quello originale.


Segno delle variabili Generalmente le variabili sono vincolate ($x_j \geq 0$ o $x_j \leq 0$), nel caso non avessimo i vincoli ci si può sempre ricondurre ad un modello con variabili tutte ≥ 0

$$x_j \leq 0 \rightarrow y_i = -x_j \geq 0$$

Soluzioni Abbia quattro casi possibili:

- Problema impossibile: ($F = \emptyset$), allora si assume $z(P) = +\infty$
- Problema inferiormente (superiormente) illimitato: scelto un numero M abbiamo una soluzione $x \in F$ t.c. $c(x) \leq M$ (o $\geq M$)
- Il problema ha valore ottimo finito $-\infty < z(P) < \infty$ ma non ha soluzione ottima (non esiste $x \in F$ t.c. $c(x) = z(P)$)
- Il problema ha valore ottimo finito ed ammette soluzione ottima

Minimi Locali e Globali Non è detto che esista x^* ($F = \emptyset$) o che sia unica. Possono esistere ottimi (minimi) locali e globali



(P) richiede di trovare almeno un ottimo globale

La risoluzione di un problema di ottimizzazione richiede l'impiego di un metodo di calcolo (numerico e iterativo) codificato mediante un algoritmo.

- Algoritmo **esatto** per P : dato un'istanza di P fornisce in output la soluzione ottima x^* di P (se esiste)
- Algoritmo **euristico** per P : determina una qualsiasi soluzione $x \in F$ attraverso una approssimazione (minimo/massimo)
 - Dato ϵ -approssimazione allora x è approssimato se $c(x) \leq \epsilon$.

$$\text{Errore assoluto : } \epsilon_P = |c(x) - z(P)|$$

$$\text{Errore relativo : } R_P = \frac{\epsilon_P}{|z(P)|} = \frac{|c(x) - z(P)|}{|z(P)|}$$

Alcune volte anche calcolare l'errore diventa un problema se $z(P)$ non è noto. Allora risolviamo un nuovo problema approssimando quello originale.

Dato P definiamo **rilassamento** di P un problema del tipo


$$\bar{P} = \min\{\bar{c}(x) : x \in \bar{F}\}$$

t.c.

- $z(\bar{P}) \leq z(P)$
- $F \subseteq \bar{F}$ e $\forall x \in \bar{F}, \bar{c}(x) \leq c(x)$
- Se la soluzione ottima $\bar{x}^*$ di $\bar{P}$ soddisfa $\bar{x}^* \in F$ e $\bar{c}(\bar{x}^*) = c(\bar{x}^*)$ allora è ottima anche per P

Ovviamente gli algoritmi numerici non hanno una visione completa di c e F ma valuta $c(x)$ solo per un intervallo limitato di $x \in F$. Generalmente gli algoritmi di ottimizzazione sono iterativi, la soluzione converge verso una soluzione ottima (locale) con iterazioni molto alte o quando si raggiunge una approssimazione desiderata.


Definizione: $y \in F$ è **ottimo locale** se $\exists$ un interno $N \subseteq F$ tale che $c(y) \leq c(x) \forall x \in N$



N è **esatto** se un ottimo locale rispetto ad N è ottimo globale

(Es. $N \equiv F$)

Teorema: Dato $P(F, c)$ con $F \subseteq \mathbb{R}^n$ convesso e c convessa, l'intorno euclideo $N_\epsilon(y) = \{x \in F : \|y - x\| \leq \epsilon\}$ è **esatto** $\forall \epsilon > 0$.
 Ottimo locale $\equiv$ ottimo globale



Dimostrazione: OC2026-2-Intro_Ottimizzazione - Ver.2.0.pdf, pagina 40.


1.2 Modelli

Definito il problema dobbiamo classificarlo su un certo tipo. Attraverso un modello favoriamo l'astrazione e similitudini. Ci occuperemo di programmazione lineare:

Un problema di programmazione lineare (PL, LP) è un problema di ottimizzazione definito da

- numero finito di variabili decisionali $n \in \mathbb{N}$: $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$
- funzione obiettivo $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ nella forma $f(x) = c(x)$
- insieme m di vincoli lineari in una delle seguenti forme $ax = b$, $ax \leq b$, $ax \geq b$ con $a \in \mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}$

Alcune volte dobbiamo assumere $z \in \mathbb{Z}^n$ vettore delle soluzioni (di numeri interi). Allora siamo in caso di programmazione lineare intera (PLI, ILP) o programmazione lineare mista (PLM, MILP) se solo una parte delle variabili sono intere.



Possiamo definire un problema PL nella seguente forma

$$\min\{cx | Ax \leq b\}$$

con $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$.

Variabili booleane: condizioni binarie (0,1), spesso vengono usate come variabili ausiliarie per che stabiliscono il verificarsi o meno di condizioni specifiche.

1.2.1 Problema dello zaino

Dato uno zaino di capacità b e un insieme $E = \{1, 2, \dots, n\}$ di n oggetti caratterizzato da peso a_i e profitto c_i . Determinare il sottoinsieme $S \subseteq E$ t.c. profitto massimo e peso totale inferiore a b .

$$F = \{S \subseteq E : \sum_{i \in S} a_i \leq b\}$$

$$c(S) = \sum_{i \in S} c_i$$

Le soluzioni sono tutti i sottoinsiemi di E t.c. $2^{|E|} = 2^n$.

La soluzione ottimale è

$$S^* = \min\{c(S) : S \in F\}$$

Selezione:

$$\forall i = 1, \dots, n \quad x_i = \begin{cases} 1 & \text{se } i \text{ selezionato } (\in S^*) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\max c(x) = \sum_{i=1}^n c_i x_i$$

KP:

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i \leq b \quad x_i \in 0, 1$$

Min-cost Spanning Tre

Dato un grafo non orientato $G = (N, A)$, con $|N| = n$, $|A| = m$ e $\forall a \in A \ c_a \geq 0$. Vogliamo cercare il grafo parziale $G' = (N, A')$ connesso e aciclico di costo minimo

$$F = \{T \subseteq A : (N, T) \text{ è uno } ST \text{ di } G\}$$

$$c(T) = \sum_{a \in A} c_a$$

La soluzione ottima è $T^* = \min\{c(T) : T \in F\}$.

Selezione:

$$\forall a \in A, \quad x_a = \begin{cases} 1 & \text{se } a \text{ selezionato } (\in T^*) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

1.2.2 Problema MST

$$\forall a \in A, \quad x_a = \begin{cases} 1 & \text{se } a \text{ selezionato } (\in T^*) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\min c(x) = \sum_{a \in A} c_a x_a$$

MST:

$$\sum_{a \in A(N', N'')} x_a \geq 1 \quad \forall (N', N'') \quad x_a \in \{0, 1\} \quad a \in A$$

1.2.3 Problema TSP

Traveling salesman problem

$$F = \{P \subseteq A : (N, P) \text{ è ciclo Hamiltoniano di } G\}$$

$$c(P) = \sum_{(i,j) \in P} c_{i,j}$$

Dovendo visitare ogni nodo una sola volta P dovrà contenere esattamente due archi incidenti in ciascuna città : $\sum_{j:(i,j) \in A} = 2$ Soluzione ottima:

$$P^* = \min\{c(P) : P \in F\}$$

Selezione:

$$\forall (i, j) \in A, \quad x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } (i, j) \text{ selezionato } (\in P^*) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$
$$\min c(x) = \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}$$

TSP:

$$\sum_{(i,j) \in A(N', N'')} x_{ij} \geq 1 \quad \forall (N', N'') \quad x_{ij} \in 0, 1 \quad (i, j) \in A$$

Notiamo come MST è un rilassamento di TSP!

Relazioni logiche tra variabili

Le relazioni logiche tra operatori hanno natura logica. Possiamo modificare le relazioni logiche attraverso vincoli lineari.

- **Negazione:** $y = \neg x \Rightarrow y = 1 - x$
- **Implicazione:** $x \rightarrow y \Rightarrow y \geq x$ (se $x = 0$ y è libera)
- **Intersezione (AND):** $z = (x \wedge y) \Rightarrow \begin{cases} z \leq x \\ z \leq y \\ z \geq x + y - 1 \end{cases}$
- **Unione (OR):** $z = (x \vee y) \Rightarrow \begin{cases} z \geq x \\ z \geq y \\ z \leq x + y \end{cases}$

Vincoli di assegnamento Spesso dobbiamo modellare associazioni tra entità del problema.

$$\forall (i, j) \quad x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se oggetto } i \text{ assegnato a luogo } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- **Semi-assegnamento:** ogni oggetto può essere assegnato ad 1 solo luogo

$$\sum_{j=1}^m x_{ij} = 1 \quad i = 1, \dots, n$$

- Assegnamento completo: ogni oggetto può essere assegnato ad 1 solo luogo, ad ogni luogo un solo oggetto

- caso $m = n$
 $\sum_{j=1}^m x_{ij} = 1 \quad i = 1, \dots, n \quad \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad j = 1, \dots, m$
- caso $m > n$ (luoghi non utilizzati):
 $\sum_{j=1}^m x_{ij} = 1 \quad i = 1, \dots, n \quad \sum_{i=1}^n x_{ij} \leq 1 \quad j = 1, \dots, m$
- caso $m < n$ (lavori non assegnati)
 $\sum_{j=1}^m x_{ij} \leq 1 \quad i = 1, \dots, n \quad \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad j = 1, \dots, m$

Ordinamento di lavori su macchine

Dati n lavori, il loro tempo di lavoro d_i e m macchine identiche. Dobbiamo assegnare i lavori alle macchine senza sovrapposizione e minimizzando il numero di macchine usate.

1.2.4 Problema Min Cardinality Machine Scheduling

Due lavori possono essere lavorati sulla stessa macchina se gli intervalli di lavorazione sono disgiunti. Se gli intervalli di lavorazione sono sovrapposti due lavori non possono essere eseguiti sulla stessa macchina.

$$\begin{aligned}
 \min c(y) &= \sum_{j=1}^m y_j \\
 \text{(MCMS)} \quad &\sum_{j=1}^m x_{ij} = 1 \quad i = 1, \dots, n \\
 &x_{ij} + x_{hj} \leq 1 \quad i = 1, \dots, n-1; \\
 &\quad \quad \quad h \in S(i); j = 1, \dots, m \\
 &x_{ij} \leq y_j \quad i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m \\
 &x_{ij} \in \{0,1\} \quad i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m \\
 &y_j \in \{0,1\} \quad j = 1, \dots, m
 \end{aligned}$$

1.2.5 Selezione di sottoinsiemi

N insieme di elementi, $F = F_1, \dots, F_n$ famiglia di suoi sottoinsiemi. Dobbiamo trovare un insieme di sottoinsiemi D di costo minimo che soddisfi i vincoli.

1.2.6 Set Covering Problem

D richiede di selezionare un sottoinsieme di F_j .

$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{se } j \in D \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad j = 1, \dots, m$$

Funzione obbiettivo:

$$\min \sum_{j=1}^m c_j x_j$$

Set Covering Problem

ogni elemento $i \in N$ deve essere in almeno un sottoinsieme di D .

$$\sum_{j=1}^m a_{ij}x_j \geq 1 \quad i = 1, \dots, n$$
$$\min c(x) = \sum_{j=1}^m c_jx_j$$

SCP:

$$\sum_{j=1}^m a_{ij}x_j \geq 1 \quad i = 1, \dots, n$$
$$x_j \in \{0, 1\} \quad j = 1, \dots, m$$

Set Partitioning Problem

ogni elemento $i \in N$ deve essere esattamente in un sottoinsieme di D .

$$\sum_{j=1}^m a_{ij}x_j = 1 \quad i = 1, \dots, n$$
$$\min c(x) = \sum_{j=1}^m c_jx_j$$

SPP:

$$\sum_{j=1}^m a_{ij}x_j = 1 \quad i = 1, \dots, n$$
$$x_j \in \{0, 1\} \quad j = 1, \dots, m$$

Set Packing Problem

ogni elemento $i \in N$ deve essere al più in un sottoinsieme di D .

$$\sum_{j=1}^m a_{ij}x_j \leq 1 \quad i = 1, \dots, n$$

- problema di min: $D = \emptyset$
- problema di max:

$$\max c(x) = \sum_j 1^m c_jx_j$$

SPkP

$$\sum_{j=1}^m a_{ij}x_j \leq 1 \quad i = 1, \dots, n$$
$$x_j \in \{0, 1\} \quad j = 1, \dots, m$$

Variabili a valori discreti

Spesso le variabili sono vincolate ad assumere valori in un insieme che è $\{0, 1\}, N, [\dots]$. Per esempio x deve appartenere ad un insieme $\{v_1, \dots, v_k\}$ di valori reali.

Introduciamo k variabili binarie $y_i \in \{0, 1\}$ t.c.

$$\sum_{i=1}^k y_i = 1 \quad x = \sum_{i=1}^k v_i y_i$$

1.2.7 Progetto di reti

I collegamenti della rete sono descritti da un grafo orientato $G(V, A)$ con b_i come quantità massima per arco.

Per ogni nodo della rete il flusso portato dagli archi uscenti deve essere = al flusso entrante più la quantità prodotta nel nodo.


Minima quantità positiva

Quando x rappresenta un livello di produzione lo possiamo definire $\{0\} \cup [l, u]$. (0 rappresenta l'assenza di produzione). Introduciamo $y \in \{0, 1\}$ che ci indica la presenza di produzione

$$ly \leq x \quad x \leq uy$$

1.2.8 Costo fisso di produzione

Funzione con carico fisso, problema di mix di produzione. Se non produciamo prodotto ($x_j = 0$) allora non abbiamo costi, se produciamo ($x_j > 0$) allora abbiamo un costo fisso F_j più un costo variabile $p_j x_j$.



$$y_j = \begin{cases} 1 & \text{se } x_j > 0 \\ 0 & \text{se } x_j = 0 \end{cases}$$

$$\min \sum_{j=1}^n F_j y_j + p_j x_j$$

$$Ax \geq b$$

$$x \geq 0$$

$$y \in \{0, 1\}^n$$

Validita' del vincolo:

- se $x_j > 0$ allora $y_j = 1$ e il vincolo $x_j \leq +\infty$
- se $x_j = 0$ allora $y_j = 0$ o $y_j = 1$

oppure

- se $y_j = 0$ allora $x_j = 0$
- se $y_j = 1$ allora $x_j \geq 0$ ($\leq +\infty$)

Quindi cerchiamo

$$\begin{aligned} \min \sum_{j=1}^n F_j y_j + p_j x_j \\ Ax \geq b \\ x_j \leq M y_j \\ x_j \geq 0 \\ y_j \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

1.2.9 Ordinamento di lavori su macchine

Variante di MCMS, dati n lavori, m macchine identiche. Assegnare i lavori alle macchine senza sovrapposizione e minimizzando il tempo massimo di completamento dei lavori sulle macchine.

$$\forall(i, j) \quad x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se lavoro } i \text{ assegnato a macchina } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad i = 1, \dots, n \quad j = 1, \dots, m$$

Ogni lavoro deve essere assegnato ad una macchina

$$\sum_{j=1}^m x_{ij} = 1 \quad i = 1, \dots, n$$

Il tempo di completamento di una macchina j è la somma dei tempi di lavorazione dei lavori assegnati a essa:

$$t_j = \sum_{i=1}^n d_i x_{ij} \quad j = 1, \dots, m$$

Il tempo massimo di completamento è $t_{max} = \max\{t_j \mid j = 1, \dots, m\}$, che può essere definito da m vincoli lineari:

$$t_j \geq \sum_{i=1}^n d_i x_{ij} \quad j = 1, \dots, m$$

1.2.10 Min Makespan Machine Scheduling

Anche noto come $P||C_{max}$.

$$\min_t \sum_{j=1}^m x_{ij}$$

MMMS:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^m x_{ij} \leq t \\ x_{ij} \in \{0, 1\} \quad i = 1, \dots, n \quad j = 1, \dots, m \end{aligned}$$

Valore Assoluto

Dobbiamo rappresentare $|g(x)|$.

Vincoli: $|g(x)| \leq b$ puo' essere espresso dalla coppia di vincoli $g(x) \leq b$ e $-g(x) \leq b$.

Funzione obbiettivo: $z = \min |g(x)|$ puo' essere calcolato risolvendo separatamente $z' = \max\{f(x) \mid x \in F\}$ e $z'' = \max\{f(x) \mid x \in F\}$, e definiamo $z = \max\{z', z''\}$.

Funzioni lineari a tratti

Come nel carico fisso si possono usare variabili binarie per rappresentare funzioni lineari a tratti.

$$y_1 = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in [a_1, a_2] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad y_2 = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in (a_2, a_3] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Poiche' x deve appartenere ad un solo intervallo, allora $y_1 + y_2 = 1$.

Introduciamo anche 2 variabili ausiliare quantitative:

$$z_1 = \begin{cases} x - a_1 & \text{se } x \in [a_1, a_2] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad z_2 = \begin{cases} x - a_2 & \text{se } x \in (a_2, a_3] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Le variabili ausiliare sono completamente definite dai vincoli

$$0 \leq z_1 \leq (a_2 - a_1)y_1$$

$$0 \leq z_2 \leq (a_3 - a_2)y_2$$

$$y_1 + y_2 = 1$$

$$y_1, y_2 \in \{0, 1\}$$

Funzioni convesse

Una funzione f lineare ad n tratti e' convessa se e' continua e la derivata non crescente.

1.2.11 min Funzioni convesse

$$\begin{aligned} \min & b_1 + c_1 a_1 + \sum_{i=1}^n z_i \\ & 0 \leq z_i \leq a_{i+1} - a_i \quad i = 1, \dots, n-1 \end{aligned}$$

Se il valore ottimo e' $\bar{x}$ si avra':

$$z_i = a_{i+1} - a_i \quad i = 1, \dots, h$$

$$z_h = \bar{x} - a_h \quad i = h$$


$$z_i = 0 \quad i = h+1, \dots, n$$

Analogamente vale per le max funzioni concave.

1.2.12 Modello PLI

Funzioni a tratti

Giornali		TV	
n. annunci	Nuovi utenti per annuncio	n. annunci	Nuovi utenti per annuncio
1-10	900	1-5	10000
11-20	600	6-10	5000
21-30	300	11-15	2000



Si possono utilizzare variabili binarie per rappresentare funzioni a tratti, per indicare se le variabili decisionali sono nella prima, seconda, terza fascia. Vincoli di tipo logico come per il costo fisso.

$$\begin{aligned}
 \max & 900G_1 + 600G_2 + 300G_3 + 10000T_1 + 5000T_2 + 2000T_3 \\
 & G_1 + G_2 + G_3 + 10T_1 + 10T_2 + 10T_3 \leq 150 \\
 & G_1, G_2, G_3 \leq 10 \\
 & T_1, T_2, T_3 \leq 5 \\
 & G_1, G_2, G_3, T_1, T_2, T_3 > 0 \text{ INTERE}
 \end{aligned}$$

1.2.13 Altri modelli PLI

Variante KP: KP-bounded

Il generico oggetto i e' disponibile in p_i esemplari. Puo' essere scelto p_i volte

$$\forall i = 1, \dots, n \quad x_i \geq 0 \text{ intera} = \text{n. di copie } i \text{ scelte}$$

$$\max c(x) = \sum_{i=1}^n c_i x_i$$

KP-b:

$$\begin{aligned}
 & \sum_{i=1}^n a_i x_i \leq b \\
 & 0 \leq x_i \leq p_i \text{ interi} \quad i = 1, \dots, n
 \end{aligned}$$

Variante KP: Subset-sum Problem

Il generico oggetto i ha profitto c_i e peso $a_i = c_i$. Dato un insieme di n numeri selezionare un sottoinsieme di numeri di somma massima e non eccedente a b . (Taglio di barre e minimizzazione

scarto)

$$\forall i = 1, \dots, n \quad x_i = \begin{cases} 1 & \text{se } i \text{ selezionato } (\in S^*) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$
$$\max c(x) = \sum_{i=1}^n c_i x_i$$

SSP:

$$\sum_{i=1}^n c_i x_i \leq b$$
$$x_i \in \{0, 1\} \quad i = 1, \dots, n$$

Problema KP multiplo (MKP)

Modello MKP

n oggetti, c_i profitto, a_{ij} peso su risorsa j . m contenitori di capacità b_j . Un oggetto può andare al più in un contenitore, ogni contenitore può contenere più oggetti.

Impaccare nei contenitori un sottoinsieme di oggetti avente massimo profitto in modo che la somma dei pesi degli oggetti inseriti in ogni contenitore non superi la corrispondente capacità b_i .

$$\forall i, j \quad x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i \text{ inserito nel contenitore } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$
$$\max c(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_i x_{ij}$$
$$\sum_{j=1}^m x_{ij} \leq 1 \quad i = 1, \dots, n$$

MKP:

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} x_{ij} \leq b_j \quad j = 1, \dots, m$$
$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad i = 1, \dots, n \quad j = 1, \dots, m$$

1.2.14 Bin Packing Problem (BPP)

n oggetti, a_i peso, ∞ contenitori di capacità b . Impaccare nei contenitori un sottoinsieme di oggetti avente massimo profitto in modo che la somma dei pesi degli oggetti inseriti in ogni contenitore non superi la corrispondente capacità b .

Modello PLI

$$\forall i, j = 1, \dots, n \quad x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i \text{ inserito nel contenitore } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$
$$\forall j = 1, \dots, n \quad y_j = \begin{cases} 1 & \text{se contenitore } j \text{ utilizzato} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Modello BPP

$$\begin{aligned} \min \sum_{j=1}^n y_j \\ \sum_{j=1}^m x_{ij} = 1 \quad i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

BPP:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n a_i x_{ij} &\leq b y_j \quad j = 1, \dots, n \\ x_{ij} &\in \{0, 1\} \quad i = 1, \dots, n \quad j = 1, \dots, n \\ y_j &\in \{0, 1\} \quad j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Variante: Vector Packing (VPP)

Oltre al peso ogni oggetto i ha un volume v_i ed ogni contenitore ha anche una capacità massima di volume V .

Impaccare nei contenitori un sottoinsieme di oggetti avente massimo profitto in modo che la somma dei pesi e dei volumi degli oggetti inseriti in ogni contenitore non superi le corrispondenti capacità b e V .

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n a_i x_{ij} &\leq b y_j \quad j = 1, \dots, n \\ \sum_{i=1}^n v_i x_{ij} &\leq V y_j \quad j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Variante: Bin con capacità variabile

Il generico contenitore j ha una capacità b_j e un costo c_j .

Impaccare nei contenitori un sottoinsieme di oggetti avente massimo profitto in modo che la somma dei pesi degli oggetti inseriti in ogni contenitore non superi le corrispondenti capacità b_j e minimizzando il costo totale dei contenitori utilizzati.

$$\begin{aligned} \min \sum_{j=1}^n c_j y_j \\ \sum_{i=1}^n a_i x_{ij} \leq b_j y_j \quad j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

1.3 GNU

GNU MathProg è un linguaggio in cui è possibile scrivere dei modelli di programmazione lineare, per poi venire risolti con GLPK (*GNU Linear Programming Kit*).

Prendiamo in considerazione il problema

$$\begin{aligned} \max_{x_1, x_2} \quad & 80x_1 + 100x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + 4x_2 \leq 80 \\ & 80x_1 + 60x_2 \leq 2400 \end{aligned}$$

Possiamo risolvere il problema con GNU:

```
# decision variables
var x1>=0; # product A
var x2>=0; # product B

maximize pounds: 80*x1 + 100*x2; # objective

# constraints
s.t. hours:      2*x1 + 4*x2 <= 80;
s.t. material: 80*x1 + 60*x2 <= 2400;
solve;

# Output code
printf "The optimal production per day is:\n";
printf " %.1f pallets of product A,\n",x1;
printf " %.1f pallets of product B \n",x2;
printf "This will return a profit of %.2f pounds\n",pounds;
end;
```

Che ci dara' come output:

```
The optimal production per day is:
 24.0 pallets of product A,
  8.0 pallets of product B
This will return a profit of 2720.00 pounds
```

1.3.1 Caratteristiche avanzate

Prima abbiamo utilizzato l'istruzione **printf** per presentare i risultato del processo di ottimizzazione. Pero' possiamo scrivere direttamente il valore con **display**:

```
display x1, x2;
display pounds;
```

che ci restituirà:

```
Display statement at line 16
x1.val = 24
x2.val = 8
Display statement at line 17
pounds.val = 2720
```

Tramite la keyword **param** è possibile definire dei parametri numerici, in modo da evitare di inserire il dato numerico direttamente nel modello.

```
param m, integer, > 0; # number of agents
param n, integer, > 0; # number of tasks
```

Si possono usare le keyword `set`, assieme alle istruzioni **sum** e **for**, in modo da parametrizzare ulteriormente la definizione dei modelli.

```
set I := 1..m; # set of agents
set J := 1..n; # set of tasks

param c{i in I, j in J}, >= 0; /* cost of allocating task j to agent
    i */

var x{i in I, j in J}, >= 0; /* x[i,j] = 1 means task j is assigned
    to agent */
```

Possiamo anche combinarlo con *printf* per stampare tabelle

```
printf "Agent Task Cost\n";
printf{i in I} "%5d %5d %10g\n", i, sum{j in J} j * x[i,j], sum{j in
    J} c[i,j] * x[i,j];
printf "-----\n";
```

Per avere in output


Agent	Task	Cost
1	1	13
2	8	8
3	7	13
4	5	12
5	2	6
6	6	16
7	4	3
8	3	5

2 Problemi di ottimizzazione su reti



3 Algoritmi per PL e PLI


3.1 Geometria Della Programmazione Lineare



Lo spazio di ricerca, nei problemi PL, è in linea di principio infinito, però lo spazio di ricerca può essere in qualche caso ridotto ad un insieme finito, ossia l'insieme dei vertici del poliedro che definisce la regione ammissibile.


La domanda cui cercheremo di dare una risposta in questa prima sezione è la seguente: è possibile generalizzare quest'argomento al caso di problemi in $n > 2$ variabili?

Definizione Iperpiano: Insieme $\{x \in \mathbb{R}^n | ax = b\}$ delle soluzioni dell'equazione lineare $ax = b$ dove $a \in \mathbb{R}^n$ e $b \in \mathbb{R}$




Definizione Semispazio: Insieme $\{x \in \mathbb{R}^n | ax \leq b\}$ delle soluzioni dell'equazione lineare $ax = b$ dove $a \in \mathbb{R}^n$ e $b \in \mathbb{R}$.

Un *iperpiano* è il confine del corrispondente semispazio.




Definizione Poliedro: Intersezione P di un numero finito m di semispazi. Devono esistere una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e un vettore $b \in \mathbb{R}$ tali che $P = \{x | Ax \leq b\}$.




Definizione Insieme convesso: Un insieme $C \subseteq \mathbb{R}^n$ tale che tutti i punti che connettono $x, y \in C$ sono anche essi in C ossia

$$\forall x, y \in C \quad \forall a \in [0, 1] \quad ax + (1 - a)y \in C$$



Definizione Faccia: Se I è tale che P_I non è vuoto, chiamiamo il poliedro P_I faccia di P .



Soluzioni di Base Dato un poliedro $P = \{x | Ax \leq b\}$, supponiamo che $I = B$ sia t.c. A_B matrice quadrata e invertibile. Allora:

- B e' detta base
- A_B e' detta matrice di base
- $x_B = A_B^{-1}b_B$ e' detta soluzione di base

Una soluzione di base x_B t.c. $x_B \in P$ e' detta **ammissibile**, altrimenti **non ammissibile**. E' facile rendersi conto che i vertici di P sono tutte e sole le sue soluzioni di base ammissibili.

Vincoli attivi Se $x \in P$ allora i vincoli che vengono soddisfatti come uguaglianze sono detti **attivi** in x . Indichiamo con $I(x)$ l'insieme degli indici dei vincoli attivi in x :

$$I(x) = \{i | A_i x = b_i\}$$


Per ogni $J \subseteq I(x)$ l'insieme P_J e' una faccia di P , $P_{I(x)}$ e' la faccia minimale tra esse.

Definizione Inviluppi Convessi: I poliedri fin'ora li abbiamo rappresentati per facce, ma possono essere rappresentati anche per punti.

Dato un insieme di punti $X = \{x_1, \dots, x_S\} \subseteq \mathbb{R}^n$ l'**inviluppo convesso** di X e' definito come l'insieme

$$\text{conv}(X) = \{x = \sum_{i=1}^S \lambda_i x_i \mid \sum_{i=1}^S \lambda_i = 1 \wedge \lambda_i \geq 0\}$$

Per esempio per $X = \{(1, 3), (3, 1), (2, 5), (6, 3)\}$



Definizione Coni convessi: Un insieme $C \subseteq \mathbb{R}^n$ e' detto **cono** sse per ogni $x \in C$ e per ogni $a \in \mathbb{R}^+$ vale che $ax \in C$.


I coni che siano anche insiemi convessi (detti coni convessi) sono caratterizzabili equivalentemente come gli insiemi C tali che

$$x, y \in C \wedge \lambda, \mu \in \mathbb{R}^+ \Rightarrow \lambda x + \mu y \in C$$

Anche per i coni convessi esiste una rappresentazione basata sulle direzioni: dato un insieme $V = \{v_1, \dots, v_t\} \subset \mathbb{R}^n$, il **cono finitamente generato** da V è:

$$\text{cono}(V) = \{v = \sum_{i=1}^t \mu_i v_i \mid \mu_i \in \mathbb{R}^+\}$$


Per esempio per $X = \{(1, 3), (3, 1), (2, 5), (6, 3)\}$



Il Teorema di Motzkin (Decomposizione) Dati $X, Y \subseteq \mathbb{R}^n$, indichiamo con $X + Y$ il sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ definito ponendo

$$X + Y = \{x + y | x \in X \wedge y \in Y\}$$

Teorema (Motzkin): $P \subseteq \mathbb{R}^n$ è un poliedro sse esistono X, V finiti tali che $P = \text{conv}(X) + \text{cono}(V)$



Due Rappresentazioni

- Poliedri come intersezioni di semispazi
- Poliedri come somma di un politopo e di un cono

Le due rappresentazioni sono equivalenti (grazie al teorema di Motzkin) ma non hanno la stessa dimensione.

Teorema: Sia $P = \{x | Ax \leq b\}$ e siano $x_1, \dots, x_s, v_1, \dots, v_t \in \mathbb{R}^n$ tali che

$$P = \text{conv}(\{x_1, \dots, x_s\}) + \text{cono}(\{v_1, \dots, v_t\})$$

Allora il problema $\max\{cx | Ax \leq b\}$ ha ottimo finito sse $cv_j \leq 0$ per ogni $j \in \{1, \dots, t\}$. In tal caso esiste inoltre un $k \in \{1, \dots, s\}$ tale che x_k è una soluzione ottima.

3.2 Dualità, Direzioni Ammissibili e di Crescita

La teoria della dualità è una branca dell'algebra lineare che risulta estremamente utile nella costruzione degli algoritmi per PL.

La teoria della dualità si basa sulla definizione di un'involuzione (ossia di una funzione inversa di sé stessa) che mappa ogni problema PL nel suo duale.

- Primale: $\max\{cx | Ax \leq b\}$
- Duale: $\min\{yb | (yA = c) \wedge (y \geq 0)\}$

Proprietà Primale e Duale È abbastanza facile dimostrare che il duale del duale è il primale.

Teorema Debole di Dualità: Se $\bar{x}$ e $\bar{y}$ sono soluzioni ammissibili per il primale e il duale, rispettivamente, allora $c\bar{x} \leq \bar{y}b$.

Corollario:

- Se il primale è illimitato, allora il duale è impossibile (vuoto)
- Se $\bar{x}$ e $\bar{y}$ sono soluzioni ammissibili per il primale e il duale, rispettivamente, e $c\bar{x} = \bar{y}b$, allora $\bar{x}$ e $\bar{y}$ sono soluzioni ottime

Direzioni Ammissibili — I Data una coppia asimmetrica, consideriamo una soluzione ammissibile $\bar{x}$ per il primale, e chiediamoci se spostandoci lungo una direzione dell'iperspazio a partire da $\bar{x}$, si resta o meno nella regione ammissibile.

Un vettore $\xi \in \mathbb{R}^n$ e' detto **Direzione Ammissibile** se esiste $\bar{\lambda} > 0$ t.c. $x(\lambda) = \bar{x} + \lambda\xi$ e' ammissibile nel primale per ogni $\lambda \in [0, \bar{\lambda}]$.

Direzioni Ammissibili — II Il vettore ξ e' direzione ammissibile per $\bar{x}$ sse $A_{I(\bar{x})}\xi \leq 0$.

Direzioni di Crescita Una direzione $\xi \in \mathbb{R}^n$ e' una **direzione di crescita** per $\bar{x}$ spostamento λ lungo ξ fa crescere il valore della funzione obiettivo ossia se:

$$cs(\lambda) = c\bar{x} + \lambda c\xi > c\bar{x} \iff c\xi > 0$$

La nozione di direzione di crescita, dunque, non dipende dal punto $\bar{x}$!

3.3 L'algoritmo del Simplexso

Algorithm 1 Simplex Primal

```

1:  $N \leftarrow \{1, \dots, m\} \setminus B$ 
2:  $\bar{x} \leftarrow A_B^{-1}b_B$ 
3:  $\bar{y}_B \leftarrow c_B A_B^{-1}$ 
4:  $\bar{y}_N \leftarrow 0$ 
5: if  $\bar{y}_B \geq 0$  then
6:   return  $\bar{x}, \bar{y}$  ▷ soluzione ottima
7: end if
8:  $h \leftarrow \min\{i \in B \mid \bar{y}_i < 0\}$ 
9: Sia  $\xi$  la colonna di indice  $h$  in  $-(A_B^{-1})$ 
10: if  $A_i\xi \leq 0$  per ogni  $i$  then
11:   return  $\xi$  ▷ problema illimitato
12: end if
13:  $k \leftarrow \arg \min \left\{ \frac{b_i - A_i\bar{x}}{A_i\xi} \mid A_i\xi > 0, i \in N \right\}$ 
14:  $B \leftarrow (B \cup \{k\}) \setminus \{h\}$ 
15: goto 1

```

L'algoritmo lavora mantenendo i seguenti tre invarianti:

- B e' una **base ammissibile**
- $\bar{x}$ e' **soluzione ammissibile** per il problema primale

$$\max\{cx \mid Ax \leq b\}$$

mentre $\bar{y}A = c$.

- Di conseguenza, $\bar{y}$ è soluzione per il duale sse $\bar{y}_B > 0$

$$\max\{yb \mid yA = c, y \geq 0\}$$

Se, quindi $\bar{y}_B \geq 0$, allora l'algoritmo correttamente **termina**, restituendo $\bar{x}$ e $\bar{y}$ che sono soluzioni ottime per il primale e per il duale (riga 5.)

Se, invece, c'è un elemento di $\bar{y}$ strettamente negativo, allora non vale l'ottimalità. Cerchiamo quindi una direzione ammissibile e di crescita per $\bar{x}$.

3.4 La tecnica Branch-and-Bound

Finora ci siamo occupati della ricerca dell'ottimo in programmi lineari in cui tutte le variabili siano reali. Alla PLI si applica però una tecnica, detta branch-and-bound che, anche se esponenziale in tempo nel caso peggiore, permette in molti casi di evitare l'enumerazione esaustiva. Perché la tecnica del branch-and-bound sia applicabile ad una certa classe di problemi di ottimizzazione (che assumiamo di minimo), devono valere due requisiti:

- **Rilassamento:** Deve essere possibile, in ogni momento, passare da un problema $\mathbb{P}$ ad un suo rilassamento $\mathbb{T} = \text{RELAX}(\mathbb{P})$, tipicamente più semplice da risolvere da un punto di vista computazionale. (In questo modo si possono facilmente calcolare limitazioni *inferiori* al valore ottimo di $\mathbb{P}$.)

$$\text{RELAX}(\min\{cx \mid Ax \leq b \wedge x \in \mathbb{Z}^n\}) = \min\{cx \mid Ax \leq b\}$$

- **Branching:** Deve esistere un modo per *partizionare* l'insieme delle soluzioni ammissibili di $\mathbb{P}$ ottenendo due sottoproblemi $\text{PARTITION}(\mathbb{P}) = (\mathbb{T}, \mathbb{Q})$.

$$\text{PARTITION}(\min\{cx \mid Ax \leq b \wedge x \in \mathbb{Z}^n\}) = \min\{cx \mid Ax \leq b \wedge x_i \geq n+1 \wedge x \in \mathbb{Z}^n\}$$

Algorithm 2 Branch and Bound per $\mathcal{P}$

```
1:  $S \leftarrow \{\mathcal{P}\}; \quad v^* \leftarrow \infty$ 
2: if  $S = \emptyset$  then
3:   return soluzione ottima  $x^*$  se definita
4: end if
5: Scegli un problema  $T \in S; \quad S \leftarrow S \setminus \{T\}$ 
6: if RELAX( $T$ ) è vuoto then
7:   goto 2
8: end if
9: if RELAX( $T$ ) è illimitato then
10:   $(Q, S') \leftarrow \text{PARTITION}(T)$ 
11:   $S \leftarrow S \cup \{Q, S'\}$ 
12:  goto 2
13: end if
14: Siano  $x$  e  $v$  la soluzione e il valore ottimo di RELAX( $T$ )
15: if  $v \geq v^*$  then
16:   goto 2
17: end if
18: if  $x$  è ammissibile per  $T$  e  $v < v^*$  then
19:   $v^* \leftarrow v; \quad x^* \leftarrow x$ 
20:  goto 2
21: end if
22: if  $x$  non è ammissibile per  $T$  e  $v < v^*$  then
23:   $(Q, S') \leftarrow \text{PARTITION}(T)$ 
24:   $S \leftarrow S \cup \{Q, S'\}$ 
25:  goto 2
26: end if
```
