

Probabilità e statistica

Nicolò Giuliani

Indice

1	Spazi di probabilità	3
1.1	Teoria degli insiemi	3
1.2	Modello matematico di un esperimento aleatorio	4
1.3	Assiomi della probabilità	5
1.4	Conseguenze degli assiomi	6
2	Probabilità codizionata e indipendenza	7
2.1	Regola della catena	9
2.2	Eventi indipendenti	9
2.3	Formula delle probabilità totali	10
2.4	Formula di Bayes	11
3	Calcolo combinatorio	11
3.1	Cardinalità e corrispondenza biunivoca	11
3.2	Fattoriale e coefficiente binomiale	12
3.3	Metodo delle scelte successive	12
3.4	Disposizioni e combinazioni	13
3.5	Variabili aleatorie	14
3.5.1	Distribuzione di una variabile aleatoria	15
3.5.2	Funzione di ripartizione (CDF)	16
4	Variabili aleatorie discrete	17
4.1	Caratterizzazione delle variabili aleatorie discrete	19
4.2	Indici di sintesi di una distribuzione: μ e σ^2	19
4.2.1	Media o valore atteso	19
4.2.2	Varianza	20
4.3	Distribuzioni discrete notevoli	20
5	Variabili aleatorie continue	22
5.1	Definizioni di densità continua e v.a. continua	23
5.1.1	Dalla funzione di ripartizione alla densità continua	24
5.1.2	Funzioni di variabili aleatorie continue	24
5.2	Indici di sintesi di una distribuzione: μ e σ^2	24
5.2.1	Media o valore atteso	24
5.2.2	Varianza	25
5.3	Distribuzioni continue notevoli	25

6	Vettori aleatori	28
6.1	Introduzione	28
6.1.1	Distribuzione o legge di un vettore aleatorio	28
6.1.2	Indipendenza di variabili aleatorie	29
6.2	Vettori aleatori discreti	29
6.2.1	Densita' discreta congiunta e densita' discrete marginali	30
6.2.2	Indipendenza e densita' discreta congiunta	30
6.3	Valore atteso e varianza di una funzione di (X, Y)	31
6.4	Indici di sintesi della distribuzione di un vettore aleatorio discreto	31
6.5	Statistica descrittiva e teoremi limite	32
6.5.1	Statistica descrittiva	32
6.5.2	Le frequenze: tabelle e grafici	32
6.5.2.1	Classi di frequenza	32
6.5.3	Indici	33
6.5.3.1	Indici di dispersione	33
6.5.4	Dati bivariati: correlazione e regressione	34
6.5.4.1	Insiemi di dati bivariati e frequenza congiunta	34
6.5.5	Coefficiente di correlazione lineare	35
6.5.6	Metodo dei minimi quadrati e regressione lineare	36
7	Catene di Markov	36

1 Spazi di probabilità

Con *probabilità* intendiamo la misura della certezza assoluta che un evento si verifichi o no. In matematica attribuiamo un valore compreso tra $[0, 1]$ come intervallo tra il *falso* e il *vero*.

- $\mathbb{P} = 0$ significa che con certezza assoluta la proposizione è *falsa*.
- $\mathbb{P} = 1$ significa che con certezza assoluta la proposizione è *vera*.
- $\mathbb{P} \in (0, 1)$ significa che la proposizione è probabile, più $\mathbb{P}(A)$ è vicina ad 1 più è probabile che l'evento A avvenga.

Come calcoliamo la probabilità di un evento? Abbiamo due modi di interpretazione

- Approccio *bayesano*: Si prendono tutte le informazioni che abbiamo a disposizione e arriviamo ad una assegnazione iniziale tramite generalmente simmetrie.
- Approccio *frequentista*: Ripetiamo l'esperimento per ottenere un *campione* di dati da analizzare tramite gli strumenti della statistica descrittiva.

$$\mathbb{P}(A) \approx \frac{n \text{ volte che si verifica } A}{n}$$

Generalmente sono pochi i casi in cui si preferisce l'approccio bayesano perchè questo è molto difficile da applicare in problemi dove la simmetria non è ben definita o il problema non è ripetibile. Nella realtà gli esperimenti fisici possono essere ripetuti e l'approccio frequentista è la preferita. In ogni caso però le *inferenze* (conclusioni) vanno validate con gli strumenti della statistica inferenziale.

Possiamo riassumere che

- Che cos'è la probabilità? *Filosofia*
- Come si stima la probabilità? *Statistica*
- Quali assiomi verifica la probabilità? *Matematica*

Per ora concentriamoci su quest'ultimo.

1.1 Teoria degli insiemi

Possiamo definire matematicamente un evento come un insieme.

Dato Ω un insieme e ω un suo elemento, quindi

$$\omega \in \Omega$$

$$\emptyset \in \Omega$$

$$\Omega \in \Omega$$

Definiamo **cardinalità** (numero di elementi) con

$$|\Omega|$$

oppure

$$\#\Omega$$

Definiamo l'insieme delle parti $\mathcal{P}(A)$ ovvero l'insieme di tutti i sottoinsiemi di Ω (insieme di insiemi).

$$\Omega = \{1, 2\}$$

$$\mathcal{P}(\Omega) = \{\emptyset, \Omega, \{1\}, \{2\}\}$$

e la sua cardinalità

$$|\mathcal{P}(\Omega)| = 4$$

Operazioni insiemistiche Ricordiamo unione, intersezione e complementazioni

$$A \cup B = \{\omega \in \Omega : \omega \text{ appartiene ad almeno uno tra } A \text{ o } B\}$$

$$A \cap B = \{\omega \in \Omega : \omega \text{ appartiene sia ad } A \text{ e } B\}$$

$$A^c = \{\omega \in \Omega : \omega \text{ non appartiene ad } A\}$$

$$B \setminus A = \{\omega \in B : \omega \text{ non appartiene ad } A\}$$

Ricordiamo anche le **leggi di De Morgan**:

- per due insiemi

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Ricordiamo le **proprietà distributive**

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Unioni e intersezioni infinite Si dice $A_1, \dots, A_n$ *famiglia numerabile* o *successione* di sottoinsiemi di Ω , definiamo

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ per almeno un } n\}$$

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ per ogni un } n\}$$

Anche per questo vengolo applicate le leggi di De Morgan.

1.2 Modello matematico di un esperimento aleatorio

Un **esperimento aleatorio** (fenomeno aleatorio/prova/situazione d'incertezza) è un esperimento che non conosciamo con certezza il risultato. Un **esito** è un suo ipotetico risultato.

Ora definiamo matematicamente:

Definizione: Un **evento** è una affermazione riguardante l'ipotetico risultato dell'esperimento di cui possiamo dire con certezza se è vero o falso una volta noto l'esito del esperimento. Gli esiti per un evento vero si chiamano *casi favorevoli* gli altri si chiamano casi contari.

Un evento lo definiamo con una lettera maiuscola:

$$A = \text{" esce un numero pari"}$$

Il **modello matematico** di un esperimento aleatorio è una descrizione sintetica dell'esperimento stesso attraverso la teoria degli insiemi.

Definizione: Definiamo **spazio campionario** un insieme che contiene tutti gli ipotetici risultati dell'esperimento. Lo definiamo con Ω . Un suo qualunque esito lo definiamo con ω .

Definizione: Ogni evento (affermazione) è rappresentato da quel sottoinsieme di Ω che contiene i casi favorevoli (esiti per cui evento è sempre vero). Un qualunque sottoinsieme di Ω lo chiameremo ancora evento.

Quindi il termine evento indica sia il sottoinsieme che l'affermazione, utilizzeremo anche lo stesso simbolo (lettera maiuscola). Alcuni eventi hanno nomi specifici:

- *Evento certo* è l'insieme Ω , affermazione sempre vera qualunque sia l'esito.
- *Evento impossibile* è l'insieme $\emptyset$, affermazione sempre falsa qualunque sia l'esito.
- *Evento elementare* è un sottoinsieme di Ω che contiene un solo elemento, corrisponde ad un'affermazione che è vera per un solo esito.

Come abbiamo visto gli eventi sono descritti sia da affermazioni che da insiemi. Sulle affermazioni possiamo eseguire le operazioni date dai *connettivi logici* alle quali corrispondono alle relative *operazioni insiemistiche*.

CONNETTIVI LOGICI	OPERAZIONI/RELAZIONI INSIEMISTICHE
Disgiunzione $A \text{ o } B$	Unione $A \cup B$
Congiunzione $A \text{ e } B$	Intersezione $A \cap B$
Negazione non A	Complementazione A^c
Implicazione $A \Rightarrow B$	Inclusione $A \subset B$
Doppia implicazione $A \Leftrightarrow B$	Uguaglianza $A = B$

1.3 Assiomi della probabilità

Assioma I. A ciascun sottoinsieme (o evento) A di Ω è assegnato un numero $\mathcal{P}(A)$ che verifica

$$0 \leq \mathcal{P}(A) \leq 1$$

Tale numero $\mathcal{P}(A)$ si chiama **probabilità** di A .

Assioma II. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$

Assioma III. Vale la proprietà di **addittività numerabile**: Sia $A_1, A_2, \dots, A_n$ una successione di sottoinsiemi di Ω tra loro disgiunti e sia

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

Allora

$$\mathbb{P}(A) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

Quindi la probabilità $\mathbb{P}$ è una funzione che ad ogni sottoinsieme A di Ω fa corrispondere un numero in $[0, 1]$:

$$A \in \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \mathbb{P}(A) \in [0, 1]$$

dove $\mathcal{P}$ è l'insieme delle parti di Ω ed è il dominio, mentre il codominio è $[0, 1]$:

$$\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$$

Una probabilità $\mathbb{P}$ si dice **discreta** se assume un numero finito di valori.

Definizione: La coppia $(\Omega, \mathbb{P})$ si dice **spazio di probabilità** o modello matematico dell'esperimento aleatorio.

1.4 Conseguenze degli assiomi

Teorema: Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ spazio di probabilità. Dagli assiomi I-II-III ricaviamo:

- $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
- **Addittività finita:** se A e B sono disgiunti allora

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

- $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$
- **Monotonia:** se $A \subset B$, allora $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$

Dimostrazione: 1 - Spazi di probabilità.pdf, pagina 12.

Teorema: Consideriamo un esperimento aleatorio descritto da uno spazio campionario finito

$$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}$$

con esiti equiprobabili

$$\mathbb{P}(\{\omega_1\}) = \dots = \mathbb{P}(\{\omega_N\})$$

In tal caso diciamo che $\mathbb{P}$ è la **probabilità uniforme** e valgono le seguenti proprietà:

- dato un qualunque elemento elementare vale

$$\mathbb{P}(\{\omega_i\}) = \frac{1}{N}$$

- dato un qualunque evento A vale la **formula di Laplace**

$$\mathbb{P}(A) = \frac{n \text{ di eventi elementari che compongono } A}{N} = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi contrari}}$$

Dimostrazione: 1 - Spazi di probabilità.pdf, pagina 16.

Ora possiamo svolgere problemi di calcolo combinatorio!

Teorema: Formula dell'unione di due eventi, Siano A e B due eventi qualunque (non necessariamente disgiunti) allora

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

2 Probabilità codizionata e indipidenza

Consideriamo l'evento A e indichiamo $\mathbb{P}(A)$ la sua probabilità. Veniamo a sapere con un altro evento B avvenga, come calcoliamo la nuova probabilità che tenga conto?

$$\mathbb{P}(A|B)$$

La chiamiamo **probabilità condizionata** di A dato B .

Definizione: La probabilità condizionata di A dato B è

$$\mathbb{P} = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

A parole possiamo dire

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\text{probabilità de casi veri favorevoli}}{\text{probabilità de casi veri possibili}}$$

Non vale quasi mai l'uguaglianza

$$\mathbb{P}(A|B) \neq \mathbb{P}(B|A)$$

Analizziamo ora dei casi un po particolari:

- Caso $B = \Omega$:

$$\mathbb{P}(A|\Omega) = \frac{\mathbb{P}(A \cap \Omega)}{\mathbb{P}(\Omega)} = \mathbb{P}(A)$$

- Caso $A = \Omega$:

$$\mathbb{P}(\Omega|B) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = 1$$

- Caso $B \subset A$:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = 1$$

Teorema: Sia B un evento t.c. $\mathbb{P} > 0$. Allora valgono:

- (Assioma I) Per ciascun evento (sottoinsieme) A di Ω , vale

$$0 \leq \mathbb{P}(A|B) \leq 1$$

- $\mathbb{P}(\Omega|B) = 1$

- (Assioma III) Vale la proprietà di **addittività numerabile**. Sia $A_1, \dots, A_{infy}$ successione di eventi disgiunti e sia

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

Allora vale

$$\mathbb{P}(A|B) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n|B)$$

- $\mathbb{P}(\emptyset|B) = 0$
- **addittività finita:** se A_1 e A_2 sono disgiunti allora

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2|B) = \mathbb{P}(A_1|B) + \mathbb{P}(A_2|B)$$

- $\mathbb{P}(A^c|B) = 1 - \mathbb{P}(A|B)$
- **Monotonia:** se $A_1 \subset A_2$, allora

$$\mathbb{P}(A_1|B) \leq \mathbb{P}(A_2|B)$$

Dimostrazione: 2 - Probabilità condizionata e indipendenza.pdf, pagina 5.

Notiamo come la stessa probabilità condizionata sia anch'essa una probabilità

$$\mathbb{P}(\cdot|B) : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$$

2.1 Regola della catena

Utilizzo della probabilità condizionata:

Alcune volte si utilizza la **regola della catena** (*formula della probabilità composta*)

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B)$$

con $\mathbb{P}(A|B)$ e $\mathbb{P}(A)$ noti.

Teorema: Siano A e B due eventi, $\mathbb{P}(B) > 0$. Vale la regola della catena:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B)$$

In generale (con $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$)

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \mathbb{P}(A_1)$$

Da qui ricaviamo che

$$A_1 \cap \dots \cap A_{n-1} \subset A_1 \cap \dots \cap A_{n-2} \subset \dots \subset A_1$$

Dimostrazione: 2 - Probabilità condizionata e indipendenza.pdf, pagina 6.

Definizione: Si dice che n eventi $B_1, \dots, B_n$ sono una **partizione** di Ω se:

- $B_1, \dots, B_n$ sono disgiunti
- l'unione di $B_1, \dots, B_n$ è Ω

$$\Omega = \bigcup_{i=1}^n B_i$$

2.2 Eventi indipendenti

Un evento indipendente lo possiamo definire quando

$$\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$$

Ovvero che la probabilità che si verifichi A con o senza B è la stessa.

Definizione: Due eventi A e B si dicono **indipendenti** se

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

Scriveremo quindi

$$A \perp\!\!\!\perp B$$

La proprietà di essere indipendenti è ovviamente simmetrica.

Vediamo la simmetria:

- Se $\mathbb{P}(B) > 0$ allora

$$A \perp\!\!\!\perp B \iff \mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$$

- Se $\mathbb{P}(A) > 0$ allora

$$A \perp\!\!\!\perp B \iff \mathbb{P}(B|A) = \mathbb{P}(B)$$

Quindi se $\mathbb{P}(A) > 0$ e $\mathbb{P}(B) > 0$ allora le seguenti cose sono equivalenti:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B), \quad \mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}, \quad \mathbb{P}(B|A) = \mathbb{P}(B)$$

Dimostrazione: 2 - Probabilità condizionata e indipendenza.pdf, pagina 13.

Teorema: Siano A e B due eventi indipendenti. Allora anche A^c e B oppure A e B^c sono indipendenti.

Dimostrazione: 2 - Probabilità condizionata e indipendenza.pdf, pagina 13.

Definizione: Tre eventi A, B, C si dicono **indipendenti** se valgono simultaneamente:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cap B) &= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \\ \mathbb{P}(A \cap C) &= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C) \\ \mathbb{P}(B \cap C) &= \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) \\ \mathbb{P}(A \cap B \cap C) &= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)\end{aligned}$$

2.3 Formula delle probabilità totali

Teorema della formula delle probabilità totali: Sia $B_1, \dots, B_n$ una partizione di Ω allora per ogni evento A vale

$$\underbrace{\mathbb{P}(A)}_{\text{prob. totale di } A} = \sum_{i=1}^n \underbrace{\mathbb{P}(A \cap B_i)}_{\text{prob. parziale di } A}$$

Se inoltre si ha che $\mathbb{P}(B_i) > 0$ per ogni $i = 1, \dots, n$ allora vale

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A|B_i)\mathbb{P}(B_i)$$

Dimostrazione: 2 - Probabilità condizionata e indipendenza.pdf, pagina 18.

2.4 Formula di Bayes

Teorema della formula di Bayes: Siano A e B due eventi t.c. $\mathbb{P}(A) > 0$, $\mathbb{P}(B) > 0$ allora vale

$$\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A)}$$

Dimostrazione: 2 - Probabilità condizionata e indipendenza.pdf, pagina 21.

Molto spesso la utilizziamo insieme alla formula delle probabilità totali:

$$\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B)}{\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A|B_i)\mathbb{P}(B_i)}$$

3 Calcolo combinatorio

Abbiamo detto che dato Ω finito ed esiti equiprobabili allora

$$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}$$
$$\mathbb{P}(\{w_i\}) = \frac{1}{N}$$

e che dato un qualsiasi evento A vale la formula di Laplace

$$\mathbb{P}(A) = \frac{n \text{ di eventi elementari che compongono } A}{N} = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi contrari}}$$

Studieremo ora il calcolo combinatorio che è lo strumento per svolgere questi calcoli anche quando tali numeri sono particolarmente elevati.

3.1 Cardinalità e corrispondenza biunivoca

Possiamo scrivere Laplace come

$$\mathbb{P} = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Definizione: due insiemi A e B si dice A è in corrispondenza biunivoca con B se esiste una funzione biettiva (iniettiva e suriettiva)

$$f : A \rightarrow B$$

ovvero

$$|A| = |B| \iff A \text{ e } B \text{ sono in corrispondenza biunivoca}$$

3.2 Fattoriale e coefficiente binomiale

Ricordiamo che il *coefficiente binomiale* è

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \text{ con } k \leq n$$
$$= \binom{n}{n-k}$$

e anche

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$
$$\binom{n}{1} = 1$$

Per $k < n$ vale la formula di *Stifel*

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Infine vale anche la formula di *Netwon* con $a, b \in \mathbb{R}$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

3.3 Metodo delle scelte successive

Permette di determinare la cardinalità di un insieme una volta caratterizzati univocamente i suoi elementi tramite un numero finito di scelte successive.

Metodo delle scelte successive: Supponiamo che **ciasun** elemento di un insieme A possa essere determinato tramite **una e una sola** sequenza di k scelte successive, in cui ogni scelta viene effettuata tra un numero fissato di possibilità (tale numero di possibilità, qui di seguito indicato con $n_1, \dots, n_k$ non dipende dalle scelte precedenti ma solo da k):

- la prima scelta viene effettuata tra n_1 possibilità
- la seconda scelta viene effettuata tra n_2 possibilità
- ...
- a k -esima scelta viene effettuata tra n_k possibilità

Allora la cardinalità di A è

$$|A| = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$$

3.4 Disposizioni e combinazioni

Definizione disposizioni con ripetizione: Dato insieme E , $|E| = n$ e $k \in \mathbb{N}$. Indichiamo con $DR_{n,k}$, insieme delle disposizioni con k elementi di E , ossia l'insieme di tutte le sequenze ordinate di k di E non necessariamente distinti

$$DR_{n,k} = \{(x_1, \dots, x_k) : x_i \in E\} = \underbrace{E \times \dots \times E}_{k \text{ volte}}$$
$$|DR_{n,k}| = n^k$$

Possiamo notare come $DR_{n,k}$ esprime i modi in cui possiamo disporre in maniera ordinata e ripetuta un numero k di oggetti scelti da un insieme di n oggetti.

Definizione disposizioni semplici: Dato E insieme e $|E| = n$ e $k \leq n$. Indichiamo con $D_{n,k}$ l'insieme delle disposizioni semplici di k elementi di E , ovvero l'insieme che comprende tutte le sequenze ordinate di k elementi distinti di E

$$D_{n,k} = \{(x_1, \dots, x_k) : x_i \in E \text{ distinti}\}$$
$$|D_{n,k}| = n(n-1) \dots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Possiamo notare come $D_{n,k}$ esprime i modi in cui possiamo disporre, in maniera ordinata e non ripetuta, un numero k di oggetti scelti da un insieme di n oggetti.

Definizione permutazioni: Sia E insieme, $|E| = n$. Indichiamo con P_n l'insieme delle permutazioni degli n elementi di E , ossia l'insieme $D_{n,n}$

$$|P_n| = |D_{n,n}| = n!$$

Possiamo notare come P_n esprime i modi in cui possiamo disporre, in maniera ordinata e non ripetuta, n oggetti.

Definizione combinazione: Dato E insieme, $|E| = n$ e $k \leq n$. Indichiamo con $C_{n,k}$ l'insieme delle combinazioni (semplici o senza ripetizioni) di k elementi di E , ossia la famiglia dei sottoinsiemi di E di cardinalità k

$$C_{n,k} = \{A \subset E : |A| = k\}$$
$$|C_{n,k}| = \binom{n}{k}$$

Vale anche la seguente equivalenza

$$\frac{n!}{(n-k)!} = |C_{n,k}| k!$$
$$|D_{n,k}| = |C_{n,k}| |P_k|$$

ORDINE \ RIPETIZIONE	<i>Senza</i> ripetizione	<i>Con</i> ripetizione
	<i>Estrazione senza reimmissione</i>	<i>Estrazione con reimmissione</i>
Si tiene conto dell'ordine	$\Omega = \mathbf{D}_{n,k}$ $ \Omega = \frac{n!}{(n-k)!}$	$\Omega = \mathbf{DR}_{n,k}$ $ \Omega = n^k$
Non si tiene conto dell'ordine	<i>Estrazione simultanea</i> $\Omega = \mathbf{C}_{n,k}$ $ \Omega = \frac{ \mathbf{D}_{n,k} }{k!} = \binom{n}{k}$	—

$$\frac{\text{casi favorevoli in } C_{n,k}}{\text{casi possibili in } C_{n,k}} = \frac{k!(\text{casi favorevoli in } C_{n,k})}{k!(\text{casi possibili in } C_{n,k})} = \frac{\text{casi favorevoli in } D_{n,k}}{\text{casi possibili in } D_{n,k}}$$

3.5 Variabili aleatorie

Definizione: Un evento è una affermazione riguardante l'ipotetico risultato dell'esperimento aleatorio, di cui è possibile dire con certezza se è vera oppure falsa una volta noto l'esito dell'esperimento aleatorio.

Definizione: Ogni evento è rappresentato dal sottoinsieme di Ω costituito dai casi favorevoli. Un qualunque sottoinsieme di Ω lo chiamiamo ancora evento.

Definizione: Una **variabile aleatoria** è una affermazione riguardante l'ipotetico risultato dell'esperimento aleatorio. Tale affermazione identifica uno e un solo numero reale una volta noto l'esito dell'esperimento aleatorio.

In altre parole, mentre per un evento ha senso domandarsi "*è vero oppure no?*", per una variabile aleatoria ha senso chiedersi "*quanto vale?*".

Una variabile aleatoria viene indicata con una lettera maiuscola.

Definizione: Ogni variabile aleatoria è rappresentata dalla funzione Ω in $\mathbb{R}$ il cui valore numerico in corrispondenza di un qualunque esito dell'esperimento aleatorio, coincide con quanto fornito dall'affermazione.

Una qualunque funzione da Ω in $\mathbb{R}$ la chiameremo **variabili aleatoria**.

Il termine *variabile aleatoria* indica sia l'affermazione che la funzione.

3.5.1 Distribuzione di una variabile aleatoria

Definizione: Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una variabile aleatoria. Si dice che $E \subset \Omega$ è un evento associato ad X se esiste un sottoinsieme di B dell'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ t.c.

$$E = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}$$

= "sottoinsieme di Ω costituito da tutti e soli gli esiti ω per cui $X(\omega) \in B$ ".

Viceversa, dato un qualunque $B \subset \mathbb{R}$ il sottoinsieme di Ω dato da

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}$$

si chiama **evento associato ad X** .

Per brevità indicheremo il sottoinsieme

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}$$

nel modo seguente

$$\{X \in B\} \text{ oppure } (X \in B)$$

Ad ogni variabile aleatoria X è associato un oggetto di fondamentale importanza, la distribuzione o legge di X , che verrà indicata con $\mathbb{P}_X$. Essa è una probabilità su $\mathbb{R}$.

Definizione: Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una variabile aleatoria. Si chiama **distribuzione** di X la probabilità

$$\mathbb{P}_X : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, 1]$$

definita da

$$\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X \in B), \quad \forall B \subset \mathbb{R}$$

Per dire che X ha distribuzione $\mathbb{P}_X$ scriveremo

$$X \sim \mathbb{P}_X$$

Variabili aleatorie costanti de delta di Dirac Sia X la variabile aleatoria costante da

$$X(\omega) = a, \quad \forall \omega \in \Omega$$

dove a è un numero reale fissato. Possiamo calcolare esplicitamente la distribuzione di X per ogni $B \subset \mathbb{R}$

$$\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X \in B) = \begin{cases} \mathbb{P}(\Omega), & \text{se } a \in B \\ \mathbb{P}(\emptyset), & \text{se } a \notin B \end{cases} = \begin{cases} 1, & \text{se } a \in B \\ 0, & \text{se } a \notin B \end{cases}$$

Notiamo che $\mathbb{P}_X$ coincide con δ_a (delta di Dirac in a).

Variabili aleatorie indicatrici Siano A un evento e $X = 1_A$, la variabile aleatoria indicatrice relativa all'evento A . Anche in questo caso possiamo calcolare in maniera esplicita la distribuzione di X . Infatti per ogni $B \subset \mathbb{R}$

$$\{X \in B\} = \begin{cases} A, & \text{se } 1 \in B \text{ e } 0 \notin B \\ A^c, & \text{se } 1 \notin B \text{ e } 0 \in B \\ \Omega, & \text{se } 1 \notin B \text{ e } 0 \in B \\ \emptyset, & \text{se } 1 \in B \text{ e } 0 \notin B \end{cases}$$

Quindi

$$\mathbb{P}_X(B) = \begin{cases} \mathbb{P}(A), & \text{se } 1 \in B \text{ e } 0 \notin B \\ 1 - \mathbb{P}(A), & \text{se } 1 \notin B \text{ e } 0 \in B \\ 1, & \text{se } 1 \notin B \text{ e } 0 \in B \\ 0, & \text{se } 1 \in B \text{ e } 0 \notin B \end{cases}$$

In altri termini si ha che $\mathbb{P}_X$ coincide con la seguente combinazione convessa di δ_0 e δ_1 : $(1 - \mathbb{P}(A))\delta_0 + \mathbb{P}(A)\delta_1$. Quindi

$$X \sim (1 - \mathbb{P}(A))\delta_0 + \mathbb{P}(A)\delta_1$$

Infatti per ogni $B \subset \mathbb{R}$

$$(1 - \mathbb{P}(A))\delta_0 + \mathbb{P}(A)\delta_1 = \begin{cases} \mathbb{P}(A), & \text{se } 1 \in B \text{ e } 0 \notin B \\ 1 - \mathbb{P}(A), & \text{se } 1 \notin B \text{ e } 0 \in B \\ 1, & \text{se } 1 \notin B \text{ e } 0 \in B \\ 0, & \text{se } 1 \in B \text{ e } 0 \notin B \end{cases}$$

Questo dimostra che $\mathbb{P}_X = (1 - \mathbb{P}(A))\delta_0 + \mathbb{P}(A)\delta_1$. Tale probabilità si chiama *distribuzione di Bernoulli di parametro $\mathbb{P}(A)$* .

3.5.2 Funzione di ripartizione (CDF)

Definizione: Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità aleatoria. Si chiama **funzione di ripartizione CDF** di X la funzione

$$F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$$

definita da

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}_X((-\infty, x]), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Per dire che X ha funzione di ripartizione F_X scriveremo

$$X \sim F_X$$

Variabili aleatorie costanti Sia a un numero reale e X la variabile aleatoria costante e uguale ad a . Allora

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < a \\ 1, & \text{se } x \geq a \end{cases}$$

Variabili aleatorie indicatrici Sia A un evento e $X = 1_A$. Allora

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - \mathbb{P}(A), & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

Teorema: Sia $(\Omega, \mathbb{R})$ uno spazio di probabilità e $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una variabile aleatoria. La funzione di ripartizione F_X di X verifica le seguenti proprietà:

- F_X è monotona crescente (non necessariamente strettamente)
- F_X è continua a destra: $\lim_{y \rightarrow x+} F_X(y) = F_X(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$

Viceversa se la funzione $G : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ verifica tutte le proprietà, allora esistono uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathbb{P})$ ed una variabile aleatoria X t.c. $G = F_X$.

Dimostrazione: 3.5 - Variabili aleatorie.pdf, pagina 12.

Lemma: Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità. Allora $\mathbb{P}$ verifica le seguenti proprietà di stabilità per i limiti monotoni:

- siano $(A_n)_n$ una successione di eventi con $A_n \subset A_{n+1}$ e $A = \bigcup_n A_n$, allora vale che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A)$$

- siano $(A_n)_n$ una successione di eventi con $A_n \supset A_{n+1}$ e $A = \bigcap_n A_n$, allora vale che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A)$$

Dimostrazione: 3.5 - Variabili aleatorie.pdf, pagina 11.

Teorema probabilità di intervalli in termini di F_X : Valgono le seguenti uguaglianze

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = x) &= F_X(x) - F_X(x-) \\ \mathbb{P}(x < X \leq y) &= F_X(y) - F_X(x) \\ \mathbb{P}(x \leq X \leq y) &= F_X(y) - F_X(x-) \\ \mathbb{P}(x \leq X < y) &= F_X(y-) - F_X(x-) \\ \mathbb{P}(x < X < y) &= F_X(y-) - F_X(x) \end{aligned}$$

4 Variabili aleatorie discrete

La *non definizione* dice: una variabile aleatoria si dice **discreta** se assume un numero finito (o al più un'infinità numerabile) di valori.

Definizione: Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e X una variabile aleatoria. La funzione $p_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ data da

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

si chiama **densità discreta** o **funzione di massa di probabilità** (PMF) di X .

Si noti che $p_X(x)$ è la probabilità che la variabile aleatoria X assuma il valore x . Per tale ragione, $p_X(x)$ verifica necessariamente le disuguaglianze:

$$0 \leq p_X(x) \leq 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

La definizione di variabile aleatoria discreta fa intervenire la funzione p_X .

Definizione: Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e X una variabile aleatoria. Si dice che X è una **variabile aleatoria discreta** (in breve v.a.d.) se esiste un sottoinsieme $\mathcal{S}_X$ di $\mathbb{R}$, finito o al più infinito numerabile, quindi

$$\mathcal{S}_X = \{x_1, \dots, x_n\} \text{ oppure } \mathcal{S}_X = \{x_1, \dots, x_i, \dots\}$$

tale che:

- $p_X(x_i) > 0 \forall x_i \in \mathcal{S}$ (*minimalità* di $\mathcal{S}_X$)
- $\mathbb{P}(X \in \mathcal{S}_X) = \sum_i p_X(x_i) = 1$

L'insieme $\mathcal{S}_X$ si chiama **supporto** di X .

Tabella della densità discreta Nel caso in cui $\mathcal{S}_X$ sia un insieme finito, quindi $\mathcal{S}_X = \{x_1, \dots, x_n\}$

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
p_X	$p_X(x_1)$	$p_X(x_2)$	$\dots$	$p_X(x_n)$

Variabili aleatorie costanti Sia a un numero reale e X la variabile aleatoria costante uguale ad a . Allora X è una variabile aleatoria discreta con supporto $\mathcal{S}_X = \{a\}$ e densità discreta.

X	a
p_X	1

Variabili aleatorie indicatrici Sia A un evento e $X = 1_A$ la variabile aleatoria indicatrice relativa all'evento A . Allora X è una variabile aleatoria discreta con supporto $\mathcal{S}_X = \{0, 1\}$ e densità discreta

X	0	1
p_X	$1 - \mathbb{P}(A)$	$\mathbb{P}(A)$

4.1 Caratterizzazione delle variabili aleatorie discrete

Teorema: Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e X una variabile aleatoria. Le seguenti affermazioni sono equivalenti:

- X è una variabile aleatoria discreta
- F_X è una funzione costante a tratti

$$\begin{aligned}F_X(x_i) - F_X(x_i-) &= p_X(x_i) \\ F_X(x) &= \sum_{x_i \leq x} p_X(x_i) \quad \forall x \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

- $\mathbb{P}_X$ la distribuzione di X è concentrata nei punti $x_1, x_2, \dots$ di $\mathcal{S}_X$

$$\mathbb{P}_X = \sum_i p_X(x_i) \delta_{x_i}$$

Infine vale la formula

$$\mathbb{P}(X \in B) = \sum_{x_i \in B} p_X(x_i) \quad \forall B \subset \mathbb{R}$$

4.2 Indici di sintesi di una distribuzione: μ e σ^2

La distribuzione o legge di una variabile aleatoria può essere descritta in maniera sintetica tramite due quantità numeriche, la **media** (o valore atteso) e la varianza.

La media è un indice di posizione, ovvero indica qual è il valore “centrale” della distribuzione.

$$\mu_{\text{artim}} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

Questa è una *media pesata*, ovvero tutti gli x_i hanno lo stesso peso $\frac{1}{n}$.

La **varianza** è un indice di dispersione, ossia dice quanto la distribuzione si concentra attorno alla media.

$$\begin{aligned}\frac{(x_1 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}{n} \\ = \frac{1}{n} \|x - \mu \mathbf{1}\|^2\end{aligned}$$

4.2.1 Media o valore atteso

Definizione: Sia x una variabile aleatoria discreta con supporto $\mathcal{S}_X = \{x_1, x_2, \dots\}$. La media (o valore atteso) di X è data da:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_i x_i p_X(x_i)$$

La media la indichiamo con μ oppure μ_X .

Il simbolo $\mathbb{E}$ significa *expected value* (valore atteso).

Teorema: Sia X una variabile aleatoria discreta con densita' p_X e supporto $\mathcal{S}_X = \{x_1, x_2, \dots\}$. Inoltre siano $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $Y = h(X)$. Allora

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[h(X)] = \sum_i h(x_i) p_X(x_i)$$

Teorema Linearita' del valore atteso: Sia X una variabile aleatoria discreta. Inoltre siano $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $a, b \in \mathbb{R}$ costanti. Allora

$$\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$$

In generale:

$$\mathbb{E}[ah(X) + bg(X)] = a\mathbb{E}[h(X)] + b\mathbb{E}[g(X)]$$

4.2.2 Varianza

Definizione: Sia X una variabile aleatoria discreta con densita' discreta p_X e supporto $\mathcal{S}_X = \{x_1, x_2, \dots\}$. La varianza di X e' data da:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \sum_i (x_i - \mathbb{E}[X])^2 p_X(x_i)$$

La varianza si indica con σ^2 oppure σ_X^2 .

La radice quadrata della varianza si chiama **deviazione standard** (o scarto quadratico medio o anche scostamento quadratico medio) e si indica con σ oppure σ_X .

Teorema: Sia X una variabile aleatoria discreta con densita' discreta p_X e supporto $\mathcal{S}_X = \{x_1, x_2, \dots\}$. Vale che

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = \sum_i x_i^2 p_X(x_i) - \mathbb{E}[X]^2$$

Teorema Proprieta' della varianza: Siano X una variabile aleatoria discreta e $a, b \in \mathbb{R}$ costanti. Allora

- $\text{Var}(X) \geq 0$
- $\text{Var}(b) = 0$ e viceversa: se $\text{Var}(X) = 0$ allora X e' una variabile aleatoria costante
- $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$

4.3 Distribuzioni discrete notevoli

In questa sezione vediamo le principali distribuzioni discrete.

Distribuzione uniforme discreta Sia $\{x_1, \dots, x_n\}$ un sottoinsieme finito di $\mathbb{R}$. Diciamo che X ha distribuzione uniforme discreta sull'insieme $\{x_1, \dots, x_n\}$ se X e' una variabile aleatoria

discreta con $\mathcal{S}_X = \{x_1, \dots, x_n\}$ e densita' discreta data da

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} X & x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \hline p_X & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \dots & \frac{1}{n} \end{array}$$

In tal caso scriviamo

$$X \sim \text{Unif}(\{x_1, \dots, x_n\})$$

Si noti che

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \mu_{\text{aritm}} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \\ \text{Var}(X) &= \frac{(x_1 - \mathbb{E}[X])^2 + \dots + (x_n - \mathbb{E}[X])^2}{n} \end{aligned}$$

Distribuzione di Bernoulli Sia $0 \leq p \leq 1$. Diciamo che X ha **distribuzione di Bernoulli** (o bernoulliana) di parametro p se X e' una variabile aleatoria discreta con $\mathcal{S}_X = \{0, 1\}$ e densita' discreta data da

$$\begin{array}{c|c|c} X & 0 & 1 \\ \hline p_X & 1-p & p \end{array}$$

In tal caso scriveremo

$$X \sim B(p)$$

Le variabili aleatorie di Bernoulli sono tutte e sole variabili aleatorie indicatrici. Infatti:

$$X = 1_A, \quad \text{con } A = \{X = 1\}$$

Si noti che

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= p \\ \text{Var}(X) &= p(1-p) \end{aligned}$$

Distribuzione binomiale Consideriamo ora una generalizzazione della distribuzione bernoulliana: la *distribuzione binomiale*.

Immaginiamo ora di ripetere n volte l'esperimento aleatorio a cui l'evento A si riferisce, in modo tale che i vari esperimenti siano tra loro "indipendenti". Per ciascun esperimento consideriamo la corrispondente v.a. bernoulliana. Abbiamo dunque n variabili aleatorie bernoulliane:

$$X_1 \sim B(p), \quad X_2 \sim B(p), \quad \dots, \quad X_n \sim B(p)$$

Consideriamo la seguente variabile aleatoria

$$X = \text{"n. di successi negli } n \text{ esperimenti"}$$

dove "*successo*" si intende che l'evento A si sia verificato.

Quindi X e' il numero di volte che A si e' verificato negli n esperimenti. Notiamo che:

$$X = X_1 + \dots + X_n$$

Proposizione: Siano $0 \leq p \leq 1, n \in \mathbb{N}$ e $X \sim B(n, p)$. Allora

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= np \\ \text{Var}(X) &= np(1-p) \end{aligned}$$

Distribuzione di Poisson La distribuzione di Poisson che ora introduciamo e' un "caso limite" della distribuzione binomiale, che si ottiene a partire dalla distribuzione binomiale quando

$$n \rightarrow +\infty, \quad p \rightarrow 0, \quad np \rightarrow \lambda$$

dove $\lambda > 0$ e' un costante fissata.

Anche se in modo impreciso, possiamo dire piu' semplicemente che se $X \sim B(n, p)$, n e' "molto grande" e p e' "molto piccolo", allora X ha approssimativamente distribuzione di Poisson di parametro $\lambda = np$.

Diciamo che X ha distribuzione di Poisson di parametro λ se X e' un variabile aleatoria discreta con $\mathcal{S}_X = \{0, 1, 2, \dots\}$ e densita' discreta data da

$$p_X(k) = \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad \forall k = 0, 1, 2, \dots$$

In tal caso scriviamo

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$$

Si ricprdi che

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x$$

Quindi si verifica che

$$\sum_{k=0}^{+\infty} p_X(k) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} = 1$$

Proposizione Siano $\lambda > 0$ e $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$. Allora

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \lambda \\ \text{Var}(X) &= \lambda \end{aligned}$$

5 Variabili aleatorie continue

Se dobbiamo definire per esempio la vita di un componente X diremo che la sua vita e' maggiore uguale ad zero, ovvero $\mathcal{S}_X = \{0, +\infty\}$.

Innanzitutto, poiche' X puo' assumere un'infinita' continua di valori, l'eventualita' che ne assuma esattamente uno in particolare (ad esempio il numero $x = 3,45362$) e' praticamente impossibile.

$$\begin{aligned} p_X(x) &= \mathbb{P}(X = x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ \mathbb{P}(a \leq X \leq b) &> 0 \quad \text{se } [a, b] \subset [0, +\infty] \end{aligned}$$

In altri termini, la densita' discreta p_X per una variabile aleatoria continua e' sempre identicamente uguale a zero, non gioca dunque alcun ruolo.

5.1 Definizioni di densità continua e v.a. continua

Definizione: Una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si dice **densità** (continua) o **funzione di probabilità** (PDF) se:

- $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

Definizione Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e X una variabile aleatoria. Si dice che X è una variabile aleatoria continua (v.a.c) se esiste una densità continua indicata con f_X t.c:

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x)dx, \quad \forall [a, b] \subset \mathbb{R}$$

$$\mathbb{P}(X \in B) = \int_B f_X(x)dx, \quad \forall B \subset \mathbb{R}$$

Notiamo in particolare che la probabilità che una variabile aleatoria continua X assuma valori in un intervallo non dipende dal fatto che gli estremi dell'intervallo siano inclusi o esclusi, contrariamente a quanto accade per le variabili aleatorie discrete.

Teorema Sia X variabile aleatoria continua con densità f_X

- La densità discreta di X è identicamente uguale ad zero

$$p_X(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- La funzione di ripartizione di X è data da

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(y)dy \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Possiamo dunque riassumere nel seguente schema le differenze principali tra variabili aleatorie discrete e continue:

VARIABILI ALEATORIE DISCRETE	VARIABILI ALEATORIE CONTINUE
densità discreta p_X	densità continua f_X
$\mathbb{P}(X \in B) = \sum_{x_i \in B} p_X(x_i)$	$\mathbb{P}(X \in B) = \int_B f_X(x) dx$
F_X è costante a tratti: $F_X(x) = \sum_{x_i \leq x} p_X(x_i)$	F_X è una funzione integrale o, equivalentemente, è una funzione assolutamente continua: $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(y) dy$

5.1.1 Dalla funzione di ripartizione alla densita' continua

Proposizione Sia X una variabile aleatoria e indichiamo con F_X la sua funzione di ripartizione. Supponiamo di sapere gia' che X e' una variabile aleatoria continua (quindi sappiamo gia' che F_X e' una funzione integrale). Allora, una densita' f_X e' data da

$$f_X(x) := F'_X(x) \quad \forall x \text{ in cui } F_X \text{ e' derivabile}$$

mentre, nei punti in cui F_X non e' derivabile, f_X pue' essere definita in modo arbitrario.

5.1.2 Funzioni di variabili aleatorie continue

Siano $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una qualunque funzione e X una variabile aleatoria continua. Poniamo

$$Y = h(X)$$

Ricordiamo che quando X e' discreta, Y e' necessariamente anch'essa una variabile aleatoria discreta. Al contrario, quando X e' continua, non possiamo dire nulla su Y . In particolare, Y potrebbe essere discreta, continua, mista.

La situazione pie' semplice si ha quando la variabile aleatoria Y e' discreta. Si e' in tale situazione quando Y assume un numero finito o al pie' infinito numerabile di valori. Ad esempio, se $h(x) = 1_{x>10}$ allora:

$$Y = 1_{X>10} = \begin{cases} 1, & \text{se } X > 10 \\ 0, & \text{se } X \leq 10 \end{cases}$$

In tal caso Y e' discreta in quanto assume solo due valori: 0 e 1. In particolare, Y ha distribuzione di Bernoulli di parametro $p = \mathbb{P}(X > 10)$

$$Y \sim B(p)$$

5.2 Indici di sintesi di una distribuzione: μ e σ^2

Come per le variabili aleatorie discrete, definiamo valore atteso e varianza per variabili aleatorie continue.

5.2.1 Media o valore atteso

Definizione: Sia X una variabile aleatoria continua. La **media** (o valore atteso) di X e' data da

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$$

La media si indicia anche con μ oppure μ_X .

Capitera' spesso di dover calcolare il valore atteso di una funzione di X :

$$Y = h(X)$$

Teorema: Sia X una variabile aleatoria continua. Inoltre, siano $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $Y = h(X)$. Allora:

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[h(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} h(x)f_X(x)dx$$

Ricordiamo infine la proprieta' di linearita' del valore atteso, gia' dimostrata nel caso discreto:

Teorema Linearita' del valore atteso: Sia X una variabile aleatoria discreta. Inoltre siano $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $a, b \in \mathbb{R}$ costanti. Allora

$$\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$$

In generale:

$$\mathbb{E}[ah(X) + bg(X)] = a\mathbb{E}[h(X)] + b\mathbb{E}[g(X)]$$

5.2.2 Varianza

Definizione: Sia X una variabile aleatoria continua. La varianza di X e' data da

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mathbb{E}[X])^2 f_X(x)dx$$

La varianza si indica anche con σ^2 oppure σ_X^2 .

La radice quadrata della varianza si chiama deviazione standard (o scarto quadratico medio o anche scostamento quadratico medio) e si indica con σ oppure σ_X .

Teorema: Sia X una variabile aleatoria continua. Vale che

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x)dx - \mathbb{E}[X]^2$$

Ricordiamo infine le seguenti proprieta', gia' dimostrate nel caso discreto:

Teorema Proprieta' della varianza: Siano X una variabile aleatoria discreta e $a, b \in \mathbb{R}$ costanti. Allora

- $\text{Var}(X) > 0$
- $\text{Var}(b) = 0$ e viceversa: se $\text{Var}(X) = 0$ allora X e' una variabile aleatoria costante
- $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$

5.3 Distribuzioni continue notevoli

Distribuzione uniforme (continua) Diciamo che X ha **distribuzione uniforme (continua)** su (a, b) se X e' una variabile aleatoria continua con densita'

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

In tal caso scriveremo

$$X \sim \text{Unif}(a, b)$$

Si noti che

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

Inoltre

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}, \\ \text{Var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{(b-a)^2}{12} \end{aligned}$$

Distribuzione esponenziale Sia $\lambda > 0$. Diciamo che X ha **distribuzione esponenziale di parametro λ** se X e' una variabile aleatoria continua di densita'

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

In tal caso scriveremo

$$X \sim \text{Exp}(\lambda)$$

Si noti che

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

Inoltre

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda} \\ \text{Var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2} \end{aligned}$$

La distribuzione esponenziale si usa ad esempio per descrivere il tempo di vita di un macchinario oppure di un componente.

Distribuzione normale (o gaussiana) Siano $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma > 0$. Diciamo che X ha una **distribuzione normale (o gaussiana) di media μ e varianza σ^2** se X e' una variabile aleatoria continua con densita'

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

In tal caso scriviamo

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

Diciamo inoltre che X ha **distribuzione normale standard** se

$$X \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

ovvero X ha distribuzione normale di media $\mu = 0$ e varianza $\sigma^2 = 1$. In tal caso la densita' di X e' data da

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Lemma (Integrale di Gauss): Vale che

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

Di conseguenza avremo che

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$$

Proposizione: Siano $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$ e $X \in \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

- $\mathbb{E}[X] = \mu$
- $\text{Var}(X) = \sigma^2$

La distribuzione normale standard ha un ruolo fondamentale nello studio della distribuzione normale. Cio' deriva dal fatto che qualunque variabile aleatoria normale diventa, eseguendo un riscalamento e una traslazione (in una parola, *standardizzando*), una variabile aleatoria normale standard.

Proposizione (Standardizzazione) Siano $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$ e $X \in \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Allora

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Proposizione (Proprieta di Φ) Sia

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}y^2} dy, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

La funzione di ripartizione di una variabile aleatoria normale standard. Φ verifica le seguenti proprieta'

- $\Phi(0) = \frac{1}{2}$
- $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x), \quad \forall x \geq 0$

6 Vettori aleatori

6.1 Introduzione

Definizione: Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilit . Una qualunque funzione

$$(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$$

si chiama **vettore aleatorio** (bidimensionale).
Piu' in generale, per qualunque funzione

$$(X_1, \dots, X_n) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$$

si chiama **vettore aleatorio** (o **n-dimensionale**).

6.1.1 Distribuzione o legge di un vettore aleatorio

Come per le variabili aleatorie, possiamo associare ad ogni vettore aleatorio la sua distribuzione o legge. Diamo la definizione solo per il caso bidimensionale.

Definizione: Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilit  e $(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$ un vettore aleatorio. Si chiama **distribuzione** o **legge** di (X, Y) la probabilit 

$$\mathbb{P}_{(X,Y)} : \mathcal{P}(\mathbb{R}^2) \rightarrow [0, 1] \quad (1)$$

definita da

$$\mathbb{P}_{(X,Y)}(B) = \mathbb{P}((X, Y) \in B), \quad \forall B \subset \mathbb{R}^2$$

Per dire che (X, Y) ha distribuzione o legge $\mathbb{P}_{(X,Y)}$ scriveremo

$$(X, Y) \sim \mathbb{P}_{(X,Y)}$$

Funzione di ripartizione congiunta.   possibile estendere al caso multidimensionale il concetto di funzione di ripartizione. Si pu  infatti definire la funzione di ripartizione congiunta di X e Y :

$$\begin{aligned} F_{(X,Y)}(x, y) &= P(\{X \leq x\} \cap \{Y \leq y\}) \\ &= P((X, Y) \in (-\infty, x] \times (-\infty, y]), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2. \end{aligned}$$

dove la seconda uguaglianza discende dall'Osservazione 2 riportata sopra. Equivalentemente, possiamo definire $F_{(X,Y)}$ in termini della distribuzione di (X, Y) :

$$F_{(X,Y)}(x, y) = P_{(X,Y)}((-\infty, x] \times (-\infty, y]), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Nel caso multidimensionale, tuttavia, la funzione di ripartizione non   praticamente utilizzata. Infatti conviene lavorare direttamente con la densit  (discreta o continua).

6.1.2 Indipendenza di variabili aleatorie

Definizione: Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilit . Due variabili aleatorie X e Y si dicono **indipendenti** se

$$\mathbb{P}(X \in B_1, Y \in B_2) = \mathbb{P}(X \in B_1)\mathbb{P}(Y \in B_2)$$

per ogni $B_1, B_2 \subset \mathbb{R}$

$$\mathbb{P}_{(X,Y)}(B_1 \times B_2) = \mathbb{P}_X(B_1)\mathbb{P}_Y(B_2)$$

In tal caso scriviamo

$$X \perp Y$$

Definizione: Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilit , n variabili aleatorie $X_1, \dots, X_n$ si dicono **indipendenti** se

$$\mathbb{P}(X_1 \in B_1, \dots, X_n \in B_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \in B_i)$$

per ogni $B_1, \dots, B_n \subset \mathbb{R}$.

Proposizione: Siano X e Y variabili aleatorie indipendenti. Siano inoltre $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni arbitrarie. Allora anche le variabili aleatorie

$$f(X) \quad \text{e} \quad g(Y)$$

sono **indipendenti**.

6.2 Vettori aleatori discreti

Definizione Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilit  e (X, Y) un vettore aleatorio. Si dice che (X, Y)   un vettore aleatorio discreto se sia X che Y sono variabili aleatorie discrete.

Definizione Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilit  e (X, Y) un vettore aleatorio. La funzione $p_{(X,Y)} : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, 1]$ data da

$$\begin{aligned} p_{(X,Y)} &= \mathbb{P}(X = x, Y = y) \\ &= \mathbb{P}((X, Y) = (x, y)), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \end{aligned}$$

si chiama densit  discreta congiunta di X e Y .

Infine p_X e p_Y si chiamano **densit  discrete marginali** di X e Y , rispettivamente.

Teorema: Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilit  e (X, Y) un vettore aleatorio discreto. Siano inoltre $\mathcal{S}_X$ e $\mathcal{S}_Y$ i supporti di X e Y rispettivamente. Valgono le seguenti propriet :

- $p_{(X,Y)}(x, y) = 0, \quad \forall (x, y) \notin \mathcal{S}_X \times \mathcal{S}_Y$
- $\sum_{x_i \in \mathcal{S}_X} \sum_{y_j \in \mathcal{S}_Y} p_{(X,Y)}(x_i, y_j) = 1$
- Vale la formula

$$\mathbb{P}((X, Y) \in B) = \sum_{(x_i, y_j) \in B} p_{(X,Y)}(x_i, y_j), \quad \forall B \subset \mathbb{R}^2$$

6.2.1 Densit  discreta congiunta e densit  discrete marginali

Teorema: Sia (X, Y) un vettore aleatorio discreto. Allora

$$p_X(x_i) = \sum_j p_{(X,Y)}(x_i, y_j), \quad \forall x_i \in \mathcal{S}_X$$

$$p_Y(y_j) = \sum_i p_{(X,Y)}(x_i, y_j), \quad \forall y_j \in \mathcal{S}_Y$$

Tabella della densit  discreta congiunta Nel caso in cui sia $\mathcal{S}_X$ che $\mathcal{S}_Y$ sono insiemi finiti, quindi

$$\mathcal{S}_X = \{x_1, \dots, x_n\}$$

$$\mathcal{S}_Y = \{y_1, \dots, y_m\}$$

possiamo riportare i valori di $p_{(X,Y)}$ in una tabella:

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_m	p_X
x_1	$p_{X,Y}(x_1, y_1)$	$p_{X,Y}(x_1, y_2)$	$\dots$	$p_{X,Y}(x_1, y_m)$	$p_X(x_1)$
x_2	$p_{X,Y}(x_2, y_1)$	$p_{X,Y}(x_2, y_2)$	$\dots$	$p_{X,Y}(x_2, y_m)$	$p_X(x_2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
x_n	$p_{X,Y}(x_n, y_1)$	$p_{X,Y}(x_n, y_2)$	$\dots$	$p_{X,Y}(x_n, y_m)$	$p_X(x_n)$
p_Y	$p_Y(y_1)$	$p_Y(y_2)$	$\dots$	$p_Y(y_m)$	1

6.2.2 Indipendenza e densit  discreta congiunta

Teorema Siano X e Y variabili aleatorie discrete. Allora X e Y sono indipendenti se e solo se

$$p_{(X,Y)}(x_i, y_j) = p_X(x_i)p_Y(y_j), \quad \forall (x_i, y_j) \in \mathcal{S}_X \times \mathcal{S}_Y$$

6.3 Valore atteso e varianza di una funzione di (X, Y)

Teorema Siano (X, Y) un vettore aleatorio discreto e $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Allora

$$\mathbb{E}[h(X, Y)] = \sum_{i,j} h(x_i, y_j) p_{(X,Y)}(x_i, y_j)$$

e

$$\text{Var}(h(X, Y)) = \mathbb{E}[(h(X, Y) - \mathbb{E}[h(X, Y)])^2] = \sum_{i,j} (h(x_i, y_j) - \mathbb{E}[h(X, Y)])^2 p_{(X,Y)}(x_i, y_j)$$

Vale inoltre la formula

$$\text{Var}(h(X, Y)) = \mathbb{E}[(h(X, Y))^2] - \mathbb{E}[h(X, Y)]^2 = \sum_{i,j} (h(x_i, y_j))^2 p_{(X,Y)}(x_i, y_j) - \mathbb{E}[h(X, Y)]^2$$

Corollario Siano X e Y variabili aleatorie discrete. Siano inoltre a e b due numeri reali fissati. Allora

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y]$$

Corollario Siano X e Y variabili aleatorie discrete. Se X e Y sono indipendenti allora

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$$

6.4 Indici di sintesi della distribuzione di un vettore aleatorio discreto

Definizione Siano X e Y variabili aleatorie discrete. La **covarianza** di X e Y e' data da

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = \sum_{i,j} (x_i - \mathbb{E}[X])(y_j - \mathbb{E}[Y]) p_{(X,Y)}(x_i, y_j)$$

Se $\text{Cov}(X, Y) = 0$ le variabili aleatorie X e Y si dicono **scorrelate**.

Teorema Siano X e Y variabili aleatorie discrete. Vale che

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = \sum_{i,j} x_i y_j p_{(X,Y)}(x_i, y_j) - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$$

Quindi se le variabili aleatorie X e Y sono indipendenti allora sono scorrelate.

Teorema Siano X e Y variabili aleatorie discrete. Vale che

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

Quindi se X e Y sono scorrelate vale che

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

6.5 Statistica descrittiva e teoremi limite

6.5.1 Statistica descrittiva

Branca della statistica che si occupa di descrivere e sintetizzare tramite indici, tabelle e grafici i dati in esame.

Una prima distinzione che e' necessario fare e' tra dati (o caratteri o variabili) quantitativi:

- I **dati quantitativi** sono dati numerici; essi si suddividono a loro volta in:
 - **discreti** se possono assumere solo un numero finito o al piu' un'infinita' numerabile di valori
 - **continui** se possono assumere un'infinita' continua di valori
- I **dati qualitativi** sono tutti gli altri dati

Ci sono meno strumenti a disposizione per trattare dati qualitativi. Inoltre, per riuscire a studiare dati qualitativi in maniera efficace e' utile che tali dati assumano un numero relativamente basso di valori tra loro distinti (come accade ad esempio nel caso in cui si studia il gruppo sanguigno di un insieme di persone oppure lo stato occupazionale dei laureati di un determinato corso di laurea).

6.5.2 Le frequenze: tabelle e grafici

La nozione forse piu' importante della Statistica descrittiva e' quella di **frequenza**, nelle sue varie forme. I valori di tali frequenze sono riportati innanzitutto in tabelle e poi rappresentati anche tramite opportuni grafici.

La frequenza (anche detta **frequenza assoluta**) di un determinato valore e' il numero di volte che quel valore e' stato osservato. A partire dalla frequenza assoluta si ricavano altri tipi di frequenze, in particolare:

- la **frequenza relativa**, data dal rapporto tra frequenza assoluta e numero totale di dati in esame
- la **frequenza percentuale**, che e' la frequenza relativa espressa in termini percentuali
- a **frequenza (percentuale) cumulata**, definita solo nel caso di dati quantitativi, la quale e' la somma delle frequenze percentuali dei valori minori o uguali a quello per cui la si sta calcolando. In modo analogo si definiscono la **frequenza assoluta cumulata** e la **frequenza relativa cumulata**.

6.5.2.1 Classi di frequenza

Nel caso di dati quantitativi giocano un ruolo importante le cosiddette **classi di frequenza**. Quest'ultime sono infatti necessarie nel caso di dati continui e utili nel caso di dati discreti che assumono un numero elevato di valori distinti. Le classi di frequenza sono **intervalli** contigui della retta reale. Stabilire quali debbano essere le classi da adottare non e' una scelta univoca, infatti il numero di classi e la loro ampiezza possono essere scelti in infiniti modi. Troppe classi rendono la tabella poco leggibile; troppo poche classi la rendono poco significativa: il numero giusto va scelto con buon senso. L'importante e' che *ogni dato appartenga ad una e una sola classe*.

Come si costruiscono le classi? Per semplicità noi considereremo solo il caso di classi aventi la stessa ampiezza (un'ampiezza differente può essere utile nel caso di dati con concentrazione molto variabile).

6.5.3 Indici

D'ora in avanti consideriamo solo dati (o variabili o caratteri) quantitativi. Ricordiamo che la Statistica descrittiva cerca di sintetizzare i dati in esame non solo attraverso tabelle e grafici, ma anche tramite singole quantità numeriche, gli **indici**, chiamati anche **statistiche**. Queste sono grandezze calcolate a partire dai dati ed essenzialmente si suddividono in due grandi famiglie:

- **indici di posizione**, che hanno come obiettivo individuare il “centro” dell'insieme dei dati, a cui è dedicata la presente sezione
- **indici di variabilità**, che hanno come obiettivo quantificare la dispersione dei dati attorno ad un determinato “centro”, a cui è dedicata la prossima sezione

Definizione Sia dice **media** (o anche media campionario quando i dati provengono da un campione) di n dati $x_1, \dots, x_n$ e si denota con $\bar{x}$ la quantità

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

6.5.3.1 Indici di dispersione

Gli **indici di dispersione** o variabilità hanno come obiettivo proprio *quantificare* tale concentrazione/dispersione dei dati

Varianza Tra gli indici di variabilità, i più importanti sono quelli che usano come valore centrale la *media*. Fra questi indici il più noto è la **varianza**. Prima di darne la definizione è utile introdurre alcune notazioni. Si chiama scarto (o deviazione) di un dato dalla media la quantità

$$x_i - \bar{x}$$

Si chiamano rispettivamente scarto assoluto (o deviazione assoluta) e scarto quadratico (o deviazione quadratica) le quantità

$$|x_i - \bar{x}| \quad (x_i - \bar{x})^2$$

Gli indici che misurano lo scarto dalla media si ottengono sommando gli scarti (assoluti o quadratici) dalla media stessa

Definizione Si dice **varianza** (o anche varianza campionaria quando i dati provengono da un campione) di n dati $x_1, \dots, x_n$ e si denota con s^2 (o anche s_n^2) la quantità:

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

La radice quadrata della varianza si chiama **deviazione standard** (o **scostamento quadratico medio**):

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Per calcolare la varianza e' spesso preferibile utilizzare la formula seguente:

Teorema: La varianza di un insieme di n dati $x_1, \dots, x_n$ e' data dalla seguente formula alternativa:

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2$$

6.5.4 Dati bivariati: correlazione e regressione

6.5.4.1 Insiemi di dati bivariati e frequenza congiunta

Come nel caso unidimensionale, la nozione fondamentale e' quella di **frequenza**, che ora definiamo nel caso di dati bivariati. Per semplicita', nella presente sezione, supponiamo che i dati siano *quantitativi* e *discreti* e che assumano un numero *finito* di valori distinti.

Per ogni coppia (v_i, w_j) definiamo:

- la **frequenza assoluta congiunta** n_{ij} , data dal numero di volte che la coppia (v_i, w_j) e' stata osservata
- la **frequenza relativa congiunta** $f_{ij} = \frac{n_{ij}}{n}$, data dal rapporto tra frequenza assoluta congiunta e numero totale di dati in esame
- la **frequenza percentuale congiunta** p_{ij} data dalla frequenza relativa congiunta espressa in termini percentuali

Tali frequenze possono essere riportate in forma tabellare tramite una **tabella a doppia entrata**, il cui corpo centrale e' costituito dalla matrice $h \times k$ delle frequenze congiunte.

X	Y	w_1	w_2	$\dots$	w_k	n^X
v_1	n_{11}	n_{12}	$\dots$	n_{1k}	n_1^X	
v_2	n_{21}	n_{22}	$\dots$	n_{2k}	n_2^X	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	
v_h	n_{h1}	n_{h2}	$\dots$	n_{hk}	n_h^X	
n^Y	n_1^Y	n_2^Y	$\dots$	n_k^Y	n	

6.5.5 Coefficiente di correlazione lineare

Per ottenere una misura quantitativa della dipendenza tra due caratteri, introduciamo una nuova statistica: il **coefficiente di correlazione lineare**. Tale indice misura se esista una dipendenza tra i due caratteri e se tale dipendenza possa essere descritta in maniera significativa da una relazione di tipo lineare. Per definire tale indice e' utile introdurre le nozioni di *correlazione positiva* e *negativa*:

- si parla di **correlazione positiva o diretta** quando se uno dei due caratteri assume un valore grande (risp. piccolo) allora anche l'altro carattere assume un valore grande (risp. piccolo)
- si parla di **correlazione negativa o inversa** quando se uno dei due caratteri assume un valore grande (risp. piccolo) allora l'altro carattere assume un valore piccolo (risp. grande).

La definizione di coefficiente di correlazione lineare necessita di alcune notazioni.

Consideriamo un insieme di dati bivariati $\{(x_i, y_i) : i = 1, \dots, n\}$ quantitativi (discreti o continui). Siano $\bar{x}$ e $\bar{y}$ le rispettive medie aritmetiche. Allo scopo di misurare la correlazione positiva/negativa e' naturale considerare il prodotto degli scarti dalla media per ciascuna coppia di dati il prodotto degli *scarti* delle rispettive medie:

$$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

Infatti se x_i e' un valore grande rispetto a quelli tipici significa che $x_i - \bar{x}$ e' positivo, se invece x_i e' un valore piccolo rispetto a quelli tipici significa che $x_i - \bar{x}$ e' negativo. Lo stesso discorso vale per y_i . Di conseguenza, se il prodotto degli scarti dalla media e' positivo allora i dati bivariati mostrano una correlazione positiva, se invece il prodotto degli scarti dalla media e' negativo allora i dati bivariati mostrano una correlazione negativa.

In conclusione, se tra i due caratteri esiste una correlazione positiva/negativa c'e' da aspettarsi che la media aritmetica dei prodotti degli scarti di tutte le coppie

$$\text{covarianza} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

lo percepisca, assumendo di conseguenza un valore positivo/negativo, tanto pi' grande in valore assoluto quanto maggiore e' tale correlazione. Prende il nome di **covarianza**, mentre la sua normalizzazione si chiama *coefficiente di correlazione lineare*.

Definizione Sia dato un insieme di dati bivariati $\{(x_i, y_i) : i = 1, \dots, n\}$ quantitativi (discreti o continui). Siano $\bar{x}$ e $\bar{y}$ le rispettive medie aritmetiche. Siano le deviazioni standard s_x e s_y . Si dice **covarianza** (o anche covarianza campionaria quando i dati provengono da un campione) di x e y la quantità

$$s_{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

Supponiamo ora che s_x e s_y siano entrambi diverse da zero.

Si dice **coefficiente di correlazione lineare** (o anche coefficiente di correlazione campionario quando i dati provengono da un campione) di x e y la quantità

$$\begin{aligned} r_{xy} &= \frac{s_{xy}}{s_x s_y} \\ &= \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \end{aligned}$$

Una formula utile per calcolare la covarianza e' la seguente, che generalizza la formula analoga ottenuta per la varianza.

Teorema: La covarianza di un insieme di n dati bivariati $\{(x_i, y_i) : i = 1, \dots, n\}$ quantitativi (discreti o continui) e' data dalla seguente formula alternativa:

$$s_{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{x} \bar{y}$$

Teorema Il coefficiente di correlazione lineare verifica le seguenti proprietà:

- $-1 \leq r_{xy} \leq 1$
- $r_{xy} = 1$ se e solo se esistono due costanti reali $m \neq 0$ e q t.c.

$$y_i = mx_i + q, \quad \forall i = 1, \dots, n$$

Inoltre il segno di r_{xy} coincide con il segno di m .

6.5.6 Metodo dei minimi quadrati e regressione lineare

7 Catene di Markov