I sintomi commotivi

Cosa sono e come potete aiutare il vostro bambino

In caso di trauma cranico importante il vostro bambino potrebbe presentare dei sintomi commotivi, ovvero segni di affaticamento del cervello come:

- mal di testa che passa con il paracetamolo
- stanchezza eccessiva, irritabilità, cambiamenti di umore
- nausea o scarso appetito
- problemi di memoria o difficoltà a concentrarsi
- disturbi del sonno
- vertigini

Questi disturbi di solito scompaiono nel giro di due settimane, ma se li notate parlatene con il vostro Medico curante che valuterà la necessità di una visita specialistica se i sintomi non dovessero migliorare.

Per favorire la risoluzione dei sintomi commotivi

Attività che richiedono concentrazione

evitate le attività che richiedono concentrazione prolungata (videogiochi e televisione, lettura prolungata, compiti scolastici)

Ritorno a scuola

fate riprendere gradualmente l'attività scolastica al vostro bambino in base all'andamento dei sintomi, chiedete agli insegnanti se possibile di concedere al bambino qualche pausa tra le lezioni

Ripresa dello sport

fate riprendere gradualmente l'attività fisico-sportiva e solo dopo aver controllato che il vostro bambino riesca a sostenere la normale attività scolastica senza disturbi. L'attività fisico-sportiva potrebbe mettere a rischio di ulteriori traumi il vostro bambino, perché richiede coordinazione e riflessi pronti, che dopo un trauma cranico possono non funzionare al meglio

Vi raccomandiamo di mettere in pratica tutte le precauzioni per evitare gli infortuni sempre e soprattutto nei giorni successivi al trauma cranico!

Fonte: PDTA sul trauma cranico pediatrico, Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, 11/04/2017, Allegato 2.
Reimpaginazione: Appunti di Pediatria, 07/10/2026.