Trabajo Datos Faltantes

Tema 1, MITECO

S. E. Elizabet M. R. Nicolás

October 25, 2026

Abstract

Aquí definimos el trabajo realizado en un pequeño resumen.

Contents

Primeros pasos **2**

Diccionario de variables de `diario_as` 2

Primeros pasos

Al cargar los datos y realizar una primera ojeada, vemos que el tipo de las variables de interés `DNN` es `str`, por lo que los transformaremos a `numeric`.

Diccionario de variables de `diario_as`

Algunas columnas vienen del MITECO y otras se crean en el script.

Variable	Descripción
`provincia`	Código INE de la provincia (2 dígitos, p. ej. 15 = A Coruña, 28 = Madrid).
`municipio`	Código INE del municipio dentro de la provincia (3 dígitos). Para identificarlo del todo hay que combinarlo con `provincia`.
`estacion`	Número de la estación de medición dentro del municipio. Una estación es una caseta con varios equipos.
`magnitud`	Código numérico del contaminante. Para el benceno debería ser **30** (comprobar con `distinct(diario_as, magnitud)` y con la documentación del MITECO).
`punto_muestreo`	Identificador del equipo concreto. Suele tener la forma `códigoEstación_magnitud_técnica`: provincia + municipio + estación, el contaminante y un código del método de análisis. Una estación puede tener varios puntos.
`Variables DXX`	Día de la medición, del `D01` al `D31`.
`valor`	Concentración media diaria del benceno. Lo habitual es µg/m^3 (confirmar la unidad en la documentación del MITECO). Los `NA` son días sin dato válido.

Notas

- `provincia`, `municipio` y `estacion` son solo códigos; para obtener nombres y coordenadas hace falta un catálogo aparte.
- La clave de una serie temporal es `punto_muestreo` (o `provincia` + `municipio` + `estacion` + `magnitud`).
- El benceno diario no lleva indicador de validación.