Laboratório: 100 min

IDENTIFICAÇÃO

Nome: **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

Curso: **Professor:** **Encontro:**

Começa na estação: ☐ A ☐ B **Colegas de bancada:**

Estude **escrevendo à mão**, ouvindo música instrumental. Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência*

> *"Quando você pode medir aquilo de que fala, e exprimi-lo em números, você sabe algo sobre isso."* — Lord Kelvin, *Electrical Units of Measurement*, 1883

Hoje você estima antes de medir. Em cada tarefa, a linha 1 se escreve **a caneta** — a sua estimativa antes de tocar no instrumento — e não se apaga. Depois vêm a medida, o cálculo da razão entre a medida e a estimativa e, se a razão sair da faixa de **0,3 a 3**, a estimativa falhou. Errar na estimativa não é erro de conduta; deixar de dizer por quê, é.

1 ESTAÇÃO A — COMPRIMENTO E ÂNGULO

A1 A espessura (e) de uma folha de papel do livro *Física Identidade* — *régua milimetrada · livro*

1. Observe 1 mm na régua. Estime quantas folhas, acumuladas, preenchem 1,0 mm. **A caneta:**

   n = _____ folhas e = 1,0 mm / n = _____ mm

2. Separe um pacote de folhas com 1,0 mm de espessura na régua. Conte as folhas.

   n′ = _____ folhas e' = 1,0 mm / n′ = _____ mm Menor divisão: _____

3. Razão = medido / estimado: e' / e = _____ 4. Na faixa de 0,3 a 3? ☐ sim ☐ não

5. Se falhou, por quê? _____

A2 A espessura (e) e o diâmetro (d) de uma moeda de R$ 1 — *paquímetro digital*

1. Estime a espessura da moeda, em milímetros, e o seu diâmetro, em centímetros. **A caneta:**

   e = _____ mm d = _____ cm

2. Meça com o paquímetro digital a espessura e o diâmetro.

   e' = _____ d' = _____ Menor divisão: _____

3. Razão = medido / estimado: e' / e = _____ d' / d = _____

4. Na faixa de 0,3 a 3? ☐ sim ☐ não

5. Se falhou, por quê? _____

A3 A inclinação (α) da rampa de fórmica — *transferidor*

1. Observe 10° no transferidor. Estime a inclinação da rampa, em graus. **A caneta:**

   α = _____ °

2. Meça a inclinação da rampa com o transferidor.

   α' = _____ ° Menor divisão: _____

3. Razão = medido / estimado: α' / α = _____ 4. Na faixa de 0,3 a 3? ☐ sim ☐ não

5. Se falhou, por quê? _____

Ao fundo — **Figura 1** A caneta sobre a linha 1 do Roteiro de Bancada, antes de qualquer instrumento. · **Figura 10** O olho na perpendicular lê o traço certo; o olho de lado lê o vizinho.

② ESTAÇÃO B — MASSA, FORÇA E TEMPO

B1 A massa (*m*) de um clipe — *balança digital · caixa de clipes · padrão de massa de 10,0 g*

1. Coloque o padrão de massa de 10,0 g na palma de uma mão e, na outra, a quantidade de clipes que, juntos, dão a mesma sensação de 10,0 g. Estime a massa de um clipe, em gramas. **A caneta:**

   m = _____ g

2. Meça na balança a massa do conjunto de clipes (M) e divida pelo número de clipes (n).

   M = _____ g n = _____ $m' = M / n$ = _____ g Menor divisão: _____

3. Razão = medido / estimado: m' / m = _____ 4. Na faixa de 0,3 a 3? ☐ sim ☐ não

5. Se falhou, por quê? _____

B2 A força-peso (*P*) sobre um bloco de madeira — *dinamômetro · massa aferida de 100 g · bloco de madeira*

1. Coloque a massa de 100 g na palma de uma mão: o esforço muscular para sustentá-la é próximo de 1,0 N. Coloque na palma da outra mão o bloco de madeira. Estime o peso do bloco, em newtons. **A caneta:**

   P = _____ N

2. Pendure o bloco de madeira no dinamômetro. No equilíbrio, leia o valor do peso.

   P' = _____ N Menor subdivisão do dinamômetro: _____

3. Razão = medido / estimado: P' / P = _____ 4. Na faixa de 0,3 a 3? ☐ sim ☐ não

5. Se falhou, por quê? _____

B3 O tempo de reação (*t*) — *régua de 30 cm, em queda livre*

1. Mantenha a abertura entre o dedão e o indicador da mão direita próxima de 1,0 cm. Posicione o zero da régua numa linha imaginária perpendicular ao seu olho direito. O seu colega vai pôr o zero da régua no início da abertura entre o dedão e o indicador e soltá-la sem avisar. Estime quantos centímetros a régua vai cair até você segurá-la e calcule a estimativa do seu tempo de reação, $t = \sqrt{(2h/g)}$, com g = 9,8 m/s², com duas casas decimais. **A caneta:**

   h = _____ cm $t = \sqrt{(2h/g)}$ = _____ s

2. Peça ao colega que solte a régua sem avisar. Segure-a e anote a distância de queda h'. Calcule o seu tempo de reação, $t' = \sqrt{(2h'/g)}$, com duas casas decimais.

   h' = _____ cm $t' = \sqrt{(2h'/g)}$ = _____ s

3. Razão = medido / estimado: t' / t = _____ 4. Na faixa de 0,3 a 3? ☐ sim ☐ não

5. Se falhou, por quê? _____

3. Discussão

Em qual das seis tarefas a sua estimativa falhou mais — e por quê?

Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.

O **Relatório Mínimo** *vence em* **1 dia** *(___/___) e o* **Relatório Completo** *em* **6 dias** *(___/___).* **A T0B vale nota:** *este roteiro responde por 40 % da nota da trilha, o Relatório Mínimo por 15 % e o Relatório Completo por 25 %. Leve este roteiro — ele é o dado bruto dos dois.*

Ao fundo — **Figura 5** Estação B, tarefa B1: o padrão de 10,0 g numa mão, os clipes na outra. · **Figura 11** Estação B, tarefa B3: a régua cai, e a mão a segura depois de alguns centímetros. · **Figura 12** O laboratório depois da aula: seis tarefas, seis roteiros preenchidos sobre as bancadas.

IFMG campus Ouro Preto - Coordenadoria da Área de Física (CODAFIS) - Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC) · Primeira edição · 2026