

# Quiz Förväxlingssjukdomar

Testet rättas automatiskt.

Gräns för godkänt: 100%

Antal tillåtna försök: Obegränsat. Du håller på med försök 1.

---

## Fråga 1

Vilken eller vilka av följande risker finns det för en strokedrabbad om hen av misstag eller oaktsamhet bli omhändertagen för fylli enligt LOB och placerad i arresten?

- Personen kan avlida
- Risken är tämligen liten för den drabbade under förutsättning att hen placeras i ett stabilt sidoläge med fri luftväg
- Personen kan få permanenta skador i hjärnan
- Riskerna är tämligen små om arrestpersonalen kontinuerligt gör S-CABCDE undersökning på den drabbade

Maxpoäng: 1

---

## Fråga 2

Du undersöker en person som uppvisar ett avvikande beteende. Din kollega ber dig göra ett AKUT test. Vad står "T" för i AKUT?

- Talbarhet
- Tid
- Transport
- TIA-attack

Maxpoäng: 1

---

### Fråga 3

Du hjälper en person som plötsligt blivit halvsidesförlamad. Vilket av följande tillstånd är troligast?

Stroke

Hjärtinfarkt

Förgiftning

Kärlkramp

Maxpoäng: 1

---

### Fråga 4

Vilka påstående är korrekt gällande förgiftning?

Man kan inte dö eller bli svårt förgiftad av bara stora mängder alkohol

Läkemedel som sömntabletter och smärtstillande ger ofta förgiftningssymptom om de tas i normaldos tillsammans med alkohol

Nästan allt kan vara giftigt i för hög dos

Läkemedel ger garanterat inte förgiftningssymptom om de tas i av läkare ordinerad dos

Maxpoäng: 1

---

### Fråga 5

Vilka av följande symtom är vanliga vid lågt blodsocker hos en diabetiker?

Blek

Förvirring

Aggressivitet

Låg puls

Maxpoäng: 1

---

## Fråga 6

Vad är syftet med att lära sig om förväxlingssjukdomarna?

- För att kunna skilja på onyktra personer som är tänkta att omhändertas enligt LOB och sjuka personer som istället kräver sjukvård.
- För att minska risken att en omhändertagen person avlider i arresten.
- För att bli som polis kunna ta hand om medicinskt sjuka människor och avlasta ambulanssjukvården.

Maxpoäng: 1

---

## Fråga 7

Ni blir kallade till en person som fallit ihop och börjat krampa. Även ambulans är larmade. Ni noterar att personen är medvetslös och har kraftiga generella kramper. En person som säger sig vara bekant med den drabbade tar upp en burk med tabletter och föreslår att ni ska försöka ge den drabbade sin epilepsi medicin. Vilket av följande är ett korrekt handläggande?

- Eftersom det är en anhörig som föreslår och en ur-akut situation så är det rimligt att försöka få den drabbade att svälja en tablett
- Med hänsyn till patientens tillstånd så är det inte rimligt att ge något läkemedel. Dessutom är det inte er uppgift att göra detta

Maxpoäng: 1

---

## Fråga 8

Du och din kollega befinner er vid en busskur och ser en kvinna med ett avvikande beteende. Hon ligger på marken i busskuren. Ni noterar att hon är slö, förvirrad och blek. Hon har ett armband på sig där det står "insulin beroende" och att hon har en insulinpenna som sticker ut från hennes ficka. Vilket av följande alternativ är korrekt?

- Utför initialt ett systematiskt omhändertagande. I och med att ni hittar medicin på henne och att hon har tydlig information om att hon behöver insulin så ger ni henne en dos av insulinpennan
- Utför ett systematiskt omhändertagande. Larmar ambulans och rapporterar era fynd
- I och med att hon har tydlig information på sig om att hon behöver insulin så ger ni en liten dos och avvaktar för att utvärdera effekten. Händer inget ger ni en dos till och larmar ambulans

Maxpoäng: 1

Lämna in test