



Doküman Kodu: HD. RB.94 İlk Yayın Tarihi: 15.11.2019 Rev. Tarihi: 01.07.2023 Rev. No: 02 Sayfa No: 1 / 5

Sayın Hasta /Yasal Temsilcisi;

Sağlık durumunuz / hastanızın sağlık durumu ile ilgili ve size / hastaniza önerilen tıbbi, cerrahi ya da teşhise yönelik her türlü işlemler ve bunların alternatifleri, faydalari, riskleri hatta olabilecek zararları hakkında bilgi sahibi olmak ve tüm bunları/bir kısmını reddetmek, kabul etmek veya yapılacak işlemleri herhangi bir aşamasında durdurmak hakkına sahipsiniz.

Sizden okuyup, anlamınızı istediğimiz bu belge, sizi ürkütmemek ya da yapılacak tıbbi uygulamalardan uzak tutmak için değil, bu uygulamalara rıza gösterip göstermeyeceğinizi belirlemede sizi bilgilendirmek ve onayınızı almak için hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME

ÖN TANI :

PLANLANAN TEDAVİ/İŞLEM :

İŞLEMİ YAPACAK HEKİM ADI/SOYADI :

İŞLEM HAKKINDA BİLGİ:

Girişim genellikle çocuklarda genel anestezi(narkoz) altında yapılır, erişkinlerde lokal anestezi tercih edilebilir. Anesteziyi takiben ameliyat kulak arkasından yapılan bir kesi ile gerçekleştirilir. Kulak kıkırdığı yapılan kesilerle, törpüleme ve çeşitli dikişlerle şekillendirilerek, kulak arkasından ufak bir cilt parçası çıkarılarak kafa kulak arasındaki açı ve mesafe ayarlanır. Kanama kontrolü yapılip kulak arkasındaki kesi kapatıldıktan sonra hafif baskılı bir pansuman ve sargı uygulanarak ameliyata son verilir. Ameliyatın başarı oranı hastanın yaşına, genel durumuna göre değişmektedir.

İŞLEMİN UYGULANMAMASI DURUMUNDA KARSILAŞILABİLECEK SONUÇLAR:

Kepçe kulak tıbbi açıdan hiçbir sorun yaratmamasına rağmen özellikle çocukluk döneminde psikolojik travmaya yol açabilmekte, okulda arkadaşları ile ilişkilerini ve eğitimini kötü yönde etkileyebilmektedir. Çünkü çocuklar kendilerinden farklı görünenlere acımasızca davranışabilmektedirler. Okul öncesi giderilen şekil bozukluğu çocuğun okulda arkadaşları tarafından alay konusu olup psikolojik sorunlar yaşamamasını engelleyecektir.

İŞLEMDEN BEKLENEN FAYDALAR:

Kulakta, doğuştan veya sonradan olmuşmuş, birçok değişik şekil bozuklukları görülebilir. En sık rastlanılan ve estetik görünümü bozan şekil problemi kepçe kulaktır. Kepçe kulak, kulağın kafadan yana doğru aşırı açık olduğu deformiteye verilen addır ve bazı başka faktörler de katkıda bulunsa da en önemli nedeni tıp dilinde 'antheliks' olarak adlandırılan kulak kıvrımının gelişmemiş olmasıdır. Ameliyatta amaç kulağı kafa tabanına yapışık hale getirmek değil göze batmayan, mümkün olduğunda simetrik, doğal görünümlü bir kulak elde etmektir.

VARSA İŞLEMİN ALTERNATİFLERİ:

Kepçe kulak düzeltmesi ameliyatı olmazsanız yaşamınızla ilgili bir risk oluşmaz. Bu bozukluğu Düzeltmenin cerrahi dışında bir alternatif yoktur.

İŞLEMİN RİSKLERİ VE KOMPLİKASYONLARI:

İki kulak arasında mükemmel simetri garantisini yoktur. Cerrahi sonrasında 5-6 gün pansumanlar, 1 - 2 hafta bandaj kullanılacağından özellikle sıcak havalarda rahatsızlık hissi verebilir. Kulakta kıkırdak ile deri arasında kanamaya bağlı birikimler (hematom) oluşabilir. Cerrahiden hemen sonra oluşan kanamalarda, yeni kanamaları önlemek ve pihtıların temizlenmesi için acil cerrahi gerekebilir. Bandaj çıkarıldıkten sonra oluşabilecek bazı travmalarda (çarpma-düşme) kanama



Doküman Kodu: HD. RB.94 İlk Yayın Tarihi: 15.11.2019 Rev. Tarihi: 01.07.2023 Rev. No: 02 Sayfa No: 2 / 5

gelişebilir, şekil bozulabilir ve bu yeni bir cerrahi müdahale gerektirir. Ameliyat sonrası günlerde 10 – 15 güne kadar kulaklar şiş ve mor görünebilir. Kulak cildinde dokunma hissi kaybı ve anormallikleri görülebilir. Bu genellikle birkaç ay içerisinde geri döner. Kalıcı his (duyu) kaybı olabilir. Cerrahi sonrası enfeksiyon oluşabilir. Bu durumda kıkırdak bundan ciddi olarak zarar görerek şekil bozuklukları oluşabilir. Bu durumda yeterli yara iyileşmesi ve yeni bir cerrahi müdahale ile sonuç alınabilir. Yara uygun şekilde iyileşmeyebilir. Kalınlık, kızarıklık, kaşıntı ve şişlik olabilir. Bu durumda ilave tedaviler gerekebilir. Devam eden şekil bozukluğu ve düzensizlikler için ikinci cerrahi müdahale gereklidir. Amaç kulağı daha iyi hale getirmektir, ancak mükemmel sonuç her zaman mümkün değildir. Sonucu iyileştirmek veya komplikasyonları (istenmeyen sonuç) gidermek için ilave cerrahi müdahaleler gerekebilir.

Genel riskler ve komplikasyonlar Erken Dönem:

Kanama: Nadiren ameliyat sonrasında ameliyat bölgesinde bir sızıntı oluşabilir. Kanama miktarı çok fazla olur ve zonklayıcı tarzda bir ağrıya yol açacak olursa, ameliyat bölgesinin yeniden temizlenmesi ve kanama kontrolünün tekrarlanması gerekebilir.

Enfeksiyon: Çok nadirdir. Koruyucu antibiyotik kullanımı ve ameliyatın titizlikle gerçekleştirilmesi enfeksiyon görülme riskini oldukça sınırlar. Ameliyat bölgesinde artan ağrı, kızarıklık, ateş yükselmesi gibi durumlarda hemen doktora haber verilmelidir.

Yara ayrışması: Son derece nadirdir. Erken dönemde alınacak bir travma yada dikişlerin zorlanması yaranın açılmasına yol açabilir. Yara ayrışması sınırlı alanda ise pansumanlarla kapatılabilir geniş bir alanda ise dikiş atılarak onarılması gerekebilir.

Uyuşukluk ve hassasiyet: Ameliyat teknidine bağlı olarak bazen kısa bazen uzun sürebilir.

Geç Dönem:

Ameliyattan sonraki en önemli sorun beklenen neticenin alınamamasıdır. Kulağın geriye yatırılma miktarı, kıvrımın oluşması gibi konulardaki bekleneler doktorunuza birlikte değerlendirilmelidir. Kepçe kulak ameliyatı ana hatlarıyla geçerli ölçüler olmasına rağmen, yine de subjektif yönü olan bir ameliyattır. Kulağın kafa tabanına aşırı yatırılmasının da doğal olmayan bir sonuç yaratacağı bilinmelidir. Kafa tabanından kulak kenarı uzaklığının yaklaşık 18-20 mm. olması beklenir ve ameliyat genellikle bu ölçülere göre planlanır. Ameliyatta amaç kulağı kafa tabanına yapışık hale getirmek değil göze batmayan, mümkün olduğunda simetrik, doğal görünümü bir kulak elde etmektir. Kulaklar arasında hafif asimetri ve duruş farkı olabilir, çok fazla asimetri varsa revizyon adı verilen ilave müdahaleler gerekebilir. Çok nadiren kulak arkasındaki dikiş hattında sertlik ve kalınlaşma gelişebilir, bu durumda bölgeyi yumuşatan kremlerin kullanılması gerekebilir. Bazan kıkırdağa uygulanan dikişler kulak arkasından belli olabilir ve deride küçük yaralara yol açabilirler. Böyle bir problem olursa lokal anestezi altında düğümlerin temizlenmesi gerekebilir. Tüm cerrahi girişimlerde görülebilen damar içinde kan pihtlaşması (tromboz /emboli), yara iltihabı veya kalp dolaşım sistemi reaksiyonları gibi genel tehlikeler, kepçe kulak ameliyatında son derece enderdir.

İŞLEMİN TAHMİNİ SÜRESİ:

Ameliyat, işleme bağlı olarak 1-2 saat sürebilir.

KULLANILACAK İLAÇLARIN MUHTEMEL İSTENMEYEN ETKİLERİ VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Kullandığınız ilaçlar (özellikle de aspirin gibi kanın pihtlaşmasını engelleyici olanlar), mevcut ya da geçirilmiş önemli hastalıklarınız ve ilaç alerji durumunuz hakkında doktorunuza bilgi veriniz. Ameliyat bittikten sonra anestezi ilaçları kesilecek ve yavaş ve sakin bir şekilde uyanmanız sağlanacaktır. Ameliyat sonrası dönemde ağrınızın olmaması için ameliyat sırasında ağrı kesici ilaçlar serum içine konularak verilecektir. Buna rağmen ağrınız olursa yine serum içinden ya da



Doküman Kodu: HD. RB.94 İlk Yayın Tarihi: 15.11.2019 Rev. Tarihi: 01.07.2023 Rev. No: 02 Sayfa No: 3 / 5

intramüsküler (kalçadan) ağrı kesici ilaç verilecektir. Lütfen doktor ve hemşirenizin verdikleri dışında ilaç kullanmayın.

HASTANIN İŞLEM ÖNCESİ VE SONRASI DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

İşlem öncesinde ve sonrasında dikkat etmeniz gereken hususlar konusunda doktorunuz bilgilendirme yapacaktır. Sigara, daha kısa ve daha düşük kaliteli bir yaşam süresine neden olur. Sigara içmek, tedavinin/ameliyatın başarısını kötü yönde etkiler. Sigara içen hastalarda anestezi riskleri daha fazladır, anestezi nedeniyle ölüm daha sık görülür. Sigara içiyorsanız, tedavi/ameliyat başarısının genel başarı ortalamasından daha düşük olacağını bilmelisiniz.

UYMASI GEREKEN HUSUSLARA DİKKAT ETMEMESİ DURMUNDA YAŞANABILECEK SORUNLAR:

Uyulması gereken hususlara dikkat etmemeniz durumunda yaşayabileceğiniz sorunlar hakkında doktorunuz bilgilendirme yapacaktır.

GEREKTİĞİNDE AYNI KONUDA TİBBİ YARDIMA NASIL ULAŞILABILECEĞİ:

Tedavi/ameliyat uygulanmasını kabul etmemek serbest iradenizle vereceğiniz bir karardır. Fikrinizi değiştirdiğiniz takdirde söz konusu tedaviyi/ameliyatı uygulayabilecek hastanemize/hastanelere kişisel olarak yeniden başvurabilirsiniz. **Telefon: 0850 811 3400**

Tıbbi araştırma: Tıbbi çalışma, tıbbi araştırma ve doktor eğitiminin ilerletilmesi için medikal kayıtlarından klinik bilgilerin gözden geçirilmesine; hasta hakları yönetmeliğindeki hasta gizliliği kurallarına bağlı kalınması şartıyla onam veriyorum. Araştırma sonuçlarının hasta gizliliğini koruduğu sürece medikal literatürde yayınlanmasına onam veriyorum. Böyle bir çalışmaya katılmayı reddedebileceğimi ve bu reddin herhangi bir şekilde benim tedavimi olumsuz yönde etkilemeyeceğinin bilincindeyim.



Doküman Kodu: HD. RB.94 İlk Yayın Tarihi: 15.11.2019 Rev. Tarihi: 01.07.2023 Rev. No: 02 Sayfa No: 4 / 5

ONAY

Yukarıda anlatılan bilgileri okudum ve aşağıda imzası olan hekim tarafından bilgilendirildim. Yapılacak olan tedavinin/işlemın amacı, nedenleri ve faydalari, riskleri, komplikasyonları, alternatifleri ve ek tedavi girişimleri açısından bilgi sahibi oldum. Ek başkaca bir açıklamaya gerek duymadan, hiçbir baskı altında kalmadan ve bilinçli olarak bu işlemi onaylıyorum.

Tedavimle ilgili olarak tarafımıza yapılacak girişimlerde herhangi bir şekilde şuurum kayboldduğunda veya onay veremeyecek duruma düşüğümde onay vermek ve tedavimle ilgili her türlü bilgiyi almak üzere isimli kişiyi yetkili kılıyorum (Hastanın yetkili olduğu kişi hastanın vekili/yasal temsilcisi olarak imzalamalıdır).

BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi'nde görülmüş olduğum tedavi neticesinde çıkabilecek hukuki ihtilaflarda Türk Hukukunun uygulanmasını, İstanbul Mahkemelerinin yetkili olmasını kabul ediyorum.

.....(El yazınız ile okuduğumu anladım kabul ediyorum yazınız.)

Hasta

Adı-Soyadı (el yazısı ile)

İmzaRızanın Alındığı Tarih / Saat

...../...../..... :.....

Hasta onay veremeyecek durumda ise:

Hasta / yasal temsilcisiİmzaRızanın Alındığı Tarih / Saat

Adı-Soyadı (el yazısı ile)

...../...../..... :.....

Hastanın onay verememe nedeni (Hekim tarafından dolduracak):
.....
.....

Yukarıda ismi yazılı hastaya/ yasal temsilcisine tarafımdan hastalığı, yapılacak olan tedavi/işlem, bu tedavinin/işlemın amacı, nedeni ve faydalari, tedavi/işlem sonrası gereken bakım, tedavinin/işlem riskleri ve komplikasyonları, tedavinin/işlem alternatifleri, tedavi/işlem için eğer gerekli ise uygulanacak olan anestezî tipi ve anestezîye ait risk ve komplikasyonlar konusunda yeterli ve tatmin edici açıklamalar yapılmıştır. Hasta/ yasal temsilcisi , tedaviye/işleme yönelik yeterince aydınlatıldığına dair kendi rızası ile bu formu imzalayarak onaylamıştır.

Tedaviyi/İşlemi Uygulayacak Hekim

İmza

Tarih / Saat

Adı Soyadı:.....

...../...../..... :.....

Unvanı :



Doküman Kodu: HD. RB.94 İlk Yayın Tarihi: 15.11.2019 Rev. Tarihi: 01.07.2023 Rev. No: 02 Sayfa No: 5 / 5

Hastanın Dil / İletişim Problem var ise;

Hastaya doktor tarafından yapılan açıklamaları tercüme ettim. Görüşüme göre tercüme ettiğim bilgiler hasta tarafından anlaşılmıştır.

Tercüme Yapanın

Adı Soyadı (el yazısı ile) :

İmza

Tarih / Saat

...../...../.....:.....

Tıbbi uygulamalarla ilgili tüm şikayetlerinizde veya degenmek istediğiniz her konuda gündüzleri Hasta Hakları Birimi, geceleri ise Süpervizör/Gece İdari Amirine başvurabilirsiniz.

*Yasal Temsilci: Vesayet altındakiler için vasi, reşit olmayanlar için anne-baba, bunların bulunmadığı durumlarda 1.derece kanuni mirasçılar. Bu rıza (onam) belgesini imzalamak hastanın kanuni haklarını ortadan kaldırır.