



Adı - Soyadı :

TC Kimlik No :

Kurum Adı : ÜCRETLİ

Bölüm Adı : KBB Klinik

Doktor Adı : Uzm. Dr. ibrahim YAGCI

Tanı :

J34.2 Nazal septum deviasyonu

J30.3 Allerjik rinit, diğer

J34.8 Burun ve nazal sinüslerin diğer tanımlanmış bozuklukları

İlaç	Kutu Adet	Kullanım Şekli	Günlük Kullanım Miktarı	1 Defada Alınacak Doz	
1- ARVELES 25 MG.20 FILM TABLET	1(<i>BİR</i>)	Ağızdan(Oral)	3	1	Use for the first 3 days. If there is no pain, do not continue after 3 days.
2- CEFAX 500 MG.14 FILM TABLET	1(<i>BİR</i>)	Ağızdan(Oral)	2	1	1 week, 2 times a day
3- AERIUS 5 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET)	1(<i>BİR</i>)	Ağızdan(Oral)	1	1	10 days, 1 piece per day,
4- THIOCILLINE GOZ POMADI	1(<i>BİR</i>)	Cilt	3	2	It will be applied to the stitched area at the tip of the nose for 2 weeks. (Not to the eyes)
5- OTRIVINE DOZ AYARLI BURUN SPREYİ	1(<i>BİR</i>)	Burun	3	2	
6- Quixx Acute nazal yıkama spreyi.	DIB. S:5x2. (1 ay süre ile)				
7- Nazalnem burun spreyi.	DIB. S:5x2. (1 ay süre ile)				
Açıklamalar :					To be used only for 5 days, while wearing a tampon.

i If you have a penicillin allergy or any other drug allergy, please inform your physician or pharmacist.

i All medications (including sprays) will be used in the morning of the first day after surgery.