

Adı - Soyadı :

TC Kimlik No :

Kurum Adı : ÜCRETLİ

Bölüm Adı : KBB Klinik

Doktor Adı : Uzm. Dr. İbrahim YAGCI

Tanı :

J34.2 Nazal septum deviasyonu

J30.3 Allerjik rinit, diğer

J34.8 Burun ve nazal sinüslerin diğer tanımlanmış bozuklukları

İlaç	Kutu Adet	Kullanım Şekli	Günlük Kullanım Miktarı	1 Defada Alınacak Doz	
1- ARVELES 25 MG.20 FILM TABLET	1( <i>BİR</i> )	Ağızdan(Oral)	3	1	Úselo durante los primeros 3 días. Si no siente dolor, no continúe después de 3 días.
2-1: CİPRO 500 MG 14 TB	2 cajas de				
2-2: CEFAX 500 MG 14 TB	antibiótico	1( <i>BİR</i> )	Ağızdan(Oral)	2	1 semana, 2 veces al día
3- AERIUS 5 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET)	1( <i>BİR</i> )	Ağızdan(Oral)	1	1	10 días, 1 pieza por día,
4- THIOCILLINE GOZ POMADI	1( <i>BİR</i> )	Cilt	3	2	Se aplicará en la zona suturada de la punta de la nariz durante 2 semanas. (No en los ojos).
5- OTRIVINE DOZ AYARLI BURUN SPREYİ	1( <i>BİR</i> )	Burun	3	2	
6- Quixx Acute nazal yıkama. spreyi.	DIB. S:5x2. (1 seguro que lo he probado.)				
7- Nazalnem burun spreyi.	DIB. S:5x2. (1 seguro que lo he probado.)				
Açıklamalar :					Utilizar sólo durante 5 días, llevando puesto un tampón.

**i** Si tiene alergia a la penicilina o a cualquier otro medicamento, informe a su médico o farmacéutico.

**i** Todos los medicamentos (incluidos los aerosoles) se utilizarán por la mañana del primer día después de la cirugía.

(Hay 2 antibióticos en la receta). (Se utilizarán ambos).