

Przestrzenie liniowe

Zbiór $\mathbb{V}$ jest *przestrzenią liniową* nad ciałem $\mathbb{F}$, jeśli:

- określone jest dodawanie:
 - przemienne ($\forall_{\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{V}}. \vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$)
 - łączne ($\forall_{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{V}}. (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$)
- istnieje wektor zerowy $\vec{0}$
- dla każdego elementu $\vec{v} \in \mathbb{V}$ istnieje element przeciwny $-\vec{v}$:

$$(-\vec{v}) + \vec{v} = \vec{0}$$

- zdefiniowane jest lewostronne mnożenie elementów $\mathbb{V}$ przez skalary z $\mathbb{F}$:

- rozdzielność mnożenia względem dodawania:

$$\forall_{\alpha, \beta \in \mathbb{F}} \forall_{\vec{v} \in \mathbb{V}}. (\alpha + \beta) \cdot \vec{v} = \alpha \vec{v} + \beta \vec{v}$$

- rozdzielność dodawania względem mnożenia:

$$\forall_{\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{V}} \forall_{\alpha \in \mathbb{F}}. \alpha \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \alpha \cdot \vec{u} + \alpha \cdot \vec{v}$$

- mnożenie jest łączne:

$$\alpha \cdot (\beta \cdot \vec{v}) = (\alpha\beta) \cdot \vec{v}$$

- mnożenie przez "jedynekę" z ciała zachowuje wektor:

$$1 \cdot \vec{v} = \vec{v}$$

Podprzestrzeń liniowa

Dla przestrzeni liniowej $\mathbb{V}$ jej podzbiór $\mathbb{W} \subseteq \mathbb{V}$ jest *podprzestrzenią liniową*, gdy jest niepusty i jest przestrzenią liniową. Oznaczamy to $\mathbb{W} \leq \mathbb{V}$.

Lemat: Podzbiór $\mathbb{W} \subseteq \mathbb{V}$ jest przestrzenią liniową wtedy i tylko wtedy gdy jest niepusty i zamknięty na działanie dodawania wektorów i mnożenia przez skalary.

Operacje na przestrzeniach liniowych

- Dla $\mathbb{W}, \mathbb{W}' \leq \mathbb{V}$ definiujemy ich *sumę* jako

$$\mathbb{W} + \mathbb{W}' = \{ \vec{w} + \vec{w}' : \vec{w} \in \mathbb{W}, \vec{w}' \in \mathbb{W}' \}$$

- Dla dowolnego zbioru podprzestrzeni liniowych $\{\mathbb{W}_i\}_{i \in I}$, gdzie $\mathbb{W}_i \leq \mathbb{V}$ dla każdego $i \in I$, przecięcie jest zdefiniowane naturalnie jako $\bigcap_{i \in I} \mathbb{W}_i$.
- Dla dowolnego zbioru przestrzeni liniowych $\{\mathbb{V}_i\}_{i \in I}$, nad tym samym ciałem produkt kartezjański $\prod_{i \in I} \mathbb{V}_i$ zdefiniowany jest naturalnie. Działania zdefiniowane są po współrzędnych.

- Suma, przecięcie oraz iloczyn kartezjański przestrzeni liniowych jest przestrzenią liniową.
- Suma przestrzeni liniowych $\mathbb{W} + \mathbb{W}'$ jest najmniejszą przestrzenią liniową zawierającą jednocześnie $\mathbb{W}$ i $\mathbb{W}'$.
- Przekrój przestrzeni liniowych $\bigcap_i \mathbb{W}_i$ jest największą przestrzenią liniową zawartą jednocześnie we wszystkich podprzestrzeniach $\mathbb{W}_i$.

Kombinacja liniowa

Dla wektorów $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k$ ich *kombinacja liniowa* to dowolny wektor postaci

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i \vec{v}_i$$

Otoczka liniowa

Dla zbioru $U \subseteq \mathbb{V}$, gdzie $\mathbb{V}$ – przestrzeń liniowa nad $\mathbb{F}$

$$\text{LIN}(U) = \left\{ \sum_{i=1}^k \alpha_i \vec{v}_i \mid k \in \mathbb{N}, \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}, \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k \in U \right\}$$

Liniowa niezależność wektorów

Układ wektorów U jest *liniowo niezależny*, gdy dla dowolnego $k \geq 1$, dowolnych różnych $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k \in U$ oraz ciągu współczynników $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i \cdot \vec{v}_i = \vec{0}$$

implikuje

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$$

Izometrie

Przekształcenie liniowe $F : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ na przestrzeni liniowej $\mathbb{V}$ z iloczynem skalarnym $\langle \cdot, \cdot \rangle$ nazywamy *izometrią*, jeśli zachowuje iloczyn skalarny, tj. dla każdych dwóch wektorów $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{V}$ zachodzi:

$$\langle F\vec{v}, F\vec{u} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$$

- Przekształcenie F jest izometrią wtedy i tylko wtedy, gdy zachowuje długość, tj. dla każdego $\vec{v} \in \mathbb{V}$ mamy $\|F(\vec{v})\| = \|\vec{v}\|$
- Przekształcenie F jest izometrią wtedy i tylko wtedy, gdy zachowuje iloczyn skalarny elementów z bazy.

Macierze ortogonalne

Macierz kwadratową nazywamy *ortogonalną*, jeśli jej kolumny są parami ortogonalne oraz są długości 1 (w standardowym iloczynie skalarnym).

M jest ortogonalna wtedy i tylko wtedy, gdy $M^{-1} = M^T$

- Macierze ortogonalne są zamknięte na mnożenie, transponowanie i na branie macierzy odwrotnej.

Macierze dodatnio określone

Macierz M wymiaru $n \times n$ jest *dodatnio określona*, jeśli funkcja $\langle \cdot, \cdot \rangle : (\mathbb{R}^n)^2 \rightarrow \mathbb{R}$ określona jako

$$(\vec{u}, \vec{v}) \rightarrow \vec{u}^T M \vec{v}$$

Grupy

Zbiór $(G, \cdot)$, gdzie $\cdot : G \times G \rightarrow G$ jest grupą, jeśli:

- **łączność** działanie $\cdot$ jest łączne $(a \cdot (b \cdot c)) = ((a \cdot b) \cdot c)$,
- **element neutralny** istnieje element neutralny e , taki że dla każdego $g \in G$ mamy $eg = ge = g$,
- **element odwrotny** dla każdego elementu $g \in G$ istnieje element g^{-1} tż. $gg^{-1} = g^{-1}g = e$

Jeżeli działanie $\cdot$ jest przemienne, to mówimy że grupa jest *abelowa* (przemienna).

Obserwacje

- Element odwrotny w grupe G jest jedyny.
- Element prawostronnie odwrotny jest też lewostronnie odwrotny.
- Identyfikacja jest jedyna.
- Równość $ax = b$ oraz $xa = b$ mają dokładnie jedno rozwiązanie.

Półgrupa (monoid)

“Grupa” w której nie zakładamy istnienia elementu odwrotnego.

Homomorfizm, izomorfizm

Operację $\varphi : G \rightarrow H$ nazywamy *homomorfizmem grup*, jeśli zachowuje działanie grupowe, tj. $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$.

φ jest izomorfizmem, jeśli istnieje φ^{-1} które jest przekształceniem odwrotnym i homomorfizmem (φ, φ^{-1} sa bijekcjami).

- Homomorfizm przeprowadza element neutralny (odwrotny) w element neutralny (odwrotny).

Rząd elementu

Potęga elementu a nazywamy dowolny element postaci a^n , gdzie $n \in \mathbb{Z}$. Dla $n = 0$ oznacza on e , dla $n > 1$: $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ razy}}$, dla $n < 0$: $a^n = (a^{-1})^{-n}$.

Rząd elementu to najmniejsza dodatnia potęga n taka, że $a^n = e$. Rząd elementu jest *nieskończony* (nieokreślony), jeśli nie ma takiego skończonego n .

Rząd grupy to ilość jej elementów.

- Rząd a i a^{-1} jest taki sam.

Podgrupy

H jest podgrupą G , co zapisujemy $H \leq G$, jeśli $H \subseteq G$ oraz H jest grupą.

Generowanie

Dla grupy G oraz zbioru $A \subseteq G$ podgrupa generowana przez A , oznaczana jako $\langle A \rangle$, to najmniejsza podgrupa G zawierająca A . W takim wypadku mówimy, że A to *zbiór generatorów* tej podgrupy.

Postać zredukowana

Niech $a_1, \dots, a_k \in G$. O iloczynie $a_1^{l_1} a_2^{l_2} \dots a_k^{l_k}$ mówimy, że jest w *postaci zredukowanej*, jeśli $a_i \notin \{a_{i+1}^{-1}, a_{i+1}\}$ dla każdego możliwego i oraz $l_i \neq 0$ dla każdego i .

Grupa cykliczna

Grupa G jest *grupą cykliczną*, gdy $G = \langle \{a\} \rangle$ dla pewnego $a \in G$, tzn. jest generowana przez jeden element.

- Każda grupa cykliczna jest przemienna.
- Podgrupa grupy cyklicznej jest cykliczna.

Grupa wolna

Niech $\Gamma^{-1} = \{a^{-1} : a \in \Gamma\}$ będzie rozłączne z Γ .

Grupa G o zbiorze generatorów Γ jest *wolna* (wolnie generowana przez Γ) jeśli dla dowolnego słowa $w \in (\Gamma \cup \Gamma^{-1})^*$ w postaci zredukowanej zachodzi

$$w \stackrel{G}{=} e \Rightarrow w = \varepsilon$$

Grupy permutacji

Grupa permutacji S_n to zbiór wszystkich bijekcji ze zbioru $\{1, 2, \dots, n\}$ w siebie; operacją jest składanie funkcji, tj.

$$(\sigma' \cdot \sigma)(i) = \sigma'(\sigma(i))$$

Permutację zapisujemy jako dwuwierszową tabelkę:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Cykle

Cykl σ to taka permutacja, że istnieją elementy $a_1, \dots, a_n$, że $\sigma(a_i) = \sigma(a_{i+1})$ (gdzie $\sigma(a_n) = a_1$), a na innych elementach jest identycznością. Cykl taki zapisujemy, jako $(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

Elementy $\{a_1, \dots, a_n\}$ to *dziedzina cyklu* lub *nośnik cyklu*.

- Długość cyklu $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ to n .
- Cykle są rozłączne, gdy ich nośniki nie mają wspólnego elementu.

Rząd cyklu długości n wynosi n .

Dla cykli rozłącznych $c_1, c_2, \dots, c_k$ rząd permutacji $c_1 \cdot c_2 \cdot \dots \cdot c_k$ to nww rzędów poszczególnych cykli $c_1, c_2, \dots, c_k$.

Parzystość permutacji

Cykl jest **parzysty** kiedy jego długość jest **nieparzysta**.

Cykl nieparzysty jest permutacją nieparzystą.

Parzystość permutacji to parzystość ilości cykli nieparzystych w rozkładzie na cykle rozłączne.

Na przykład:

$$\sigma = \overbrace{\underbrace{(1, 4, 6)}_{\substack{\text{długość nieparzysta} \\ \text{cykl parzysty}}} \underbrace{(2, 3)}_{\substack{\text{długość parzysta} \\ \text{cykl nieparzysty}}}}^{\substack{\text{permutacja nieparzysta} \\ \text{1 cykl nieparzysty}}}$$

Pierścienie

Pierścieniem R oznaczamy zbiór z dwoma działaniami $+$, $\cdot$, spełniającymi warunki:

- $\langle R, \cdot \rangle$ jest podgrupą
- $\langle R, + \rangle$ jest przemienną grupą

Ponadto, zachodzi rozdzielnosc mnożenia względem dodawania:

$$a(b + c) = ab + ac, (b + c)a = ba + ca$$

- Pierścień jest z *jednością*, jeśli ma element neutralny dla mnożenia.
- Pierścień jest *przemienny*, jeśli $ab = ba$ (czyli półgrupa ze względu na mnożenie jest półgrupą przemienną).

Arytmetyka modularna $\mathbb{Z}_m$

a przystaje do b modulo m gdy $m|(a - b)$. Oznaczenie:

$$a \equiv_m b$$

- Reszta z dzielenia przez m :

$$a \bmod m = b \Leftrightarrow a \equiv_m b \wedge b \in \{0, 1, \dots, m - 1\}$$

Kongruencja – relacja $\equiv \subseteq R^2$ na pierścieniu G jest *kongruencją*, jeśli:

relacja równoważności jest relacją równoważności oraz **zachowuje działania** zachowuje działania, tzn. dla każdych $a, a', b, b' \in R$ zachodzi:

$$a \equiv b \wedge a' \equiv b' \Rightarrow a \cdot a' \equiv b \cdot b' \wedge a + a' \equiv b + b'$$

Dla dowolnego $m \in \mathbb{Z}_+$ relacja $\equiv_m$ jest kongruencją

Produkt pierścieni definiujemy standardowo: dla pierścieni R, R' ich produkt $R \times R'$ ma jako zbiór iloczyn kartezjański zbiorów R, R' a działania są po współrzędnych.

- $R \times R$ i $R' \times R'$ są izomorficzne
- produkt kartezjański jest łączny (z dokładnością do izomorfizmu): $R_1 \times (R_2 \times R_3)$ i $(R_1 \times R_2) \times R_3$ są izomorficzne
- Jeśli R_1 jest izomorficzne z R'_1 a R_2 z R'_2 , to $R_1 \times R_2$ jest izomorficzne z $R'_1 \times R'_2$

Chińskie twierdzenie o resztach

Jeśli $m_1, m_2, \dots, m_k$ są parami względnie pierwsze, to naturalny homomorfizm z $\mathbb{Z}_{m_1 m_2 \dots m_k}$ w $\prod_{i=1}^k \mathbb{Z}_{m_i}$, gdzie na i -tej współrzędnej bierzemy *modulo* $\mathbb{Z}_{m_i}$ jest izomorfizmem.